




En quelques mots

- Le cancer est une maladie chronique qui se caractérise par «une croissance désordonnée de cellules anormales et leur propagation dans certaines parties du corps» (Santé Canada, 2012).
- En général, 60 % des personnes atteintes d'un cancer sont toujours en vie cinq ans après avoir reçu leur diagnostic.
- Le tabagisme, le surplus de poids, la mauvaise alimentation et la consommation excessive d'alcool sont les principaux facteurs susceptibles d'augmenter les risques de développer un cancer (Société de recherche sur le cancer, 2017).

Un taux d'incidence stable


- Au Bas-Saint-Laurent, entre 1995 et 2010, le taux d'incidence du cancer varie entre 5,1 et 5,8 pour 1 000 personnes (Graphique 1).
- En général, le taux d'incidence du cancer au Bas-Saint-Laurent et celui dans l'ensemble du Québec sont similaires (Graphique 1).
- Les taux d'incidence pour les années 1999, 2006 et 2007 sont toutefois plus faibles dans la région (Graphique 1).

Graphique 1 : Taux d'incidence¹ du cancer², ensemble de la population, 1995 à 2010, Bas-Saint-Laurent et Québec



Notes
 1 : Incidence ajustée selon la structure par âge.
 2 : Ensemble des cancers sauf ceux de la peau qui ne sont pas des mélanomes.
 (-) Valeur significativement plus faible que celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.
 Source : MSSS, Fichiers des tumeurs, 1995 à 2010.

Graphique 2 : Taux d'incidence du cancer¹ pour la population de 20 ans et plus selon le groupe d'âge, 2008-2010, Bas-Saint-Laurent et Québec




Notes
 1 : Ensemble des cancers sauf ceux de la peau qui ne sont pas des mélanomes.
 (-) Valeur significativement plus faible que celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.
 Source : MSSS, Fichiers des tumeurs, 1995 à 2010.

Les aînés, plus touchés

- Le taux d'incidence des cancers augmente avec l'âge (Graphique 2).
- Au Bas-Saint-Laurent, le taux d'incidence atteint son maximum chez les 80-85 ans, avec la survenue de 30 nouveaux cas pour 1 000 personnes (Graphique 2).
- Au Québec, le taux d'incidence continue d'augmenter chez les personnes âgées de 90 ans et plus (Graphique 2).

Plus de cancers chez les hommes



Au Bas-Saint-Laurent, entre 1995 et 2010, le taux d'incidence du cancer est en moyenne 1,3 fois plus élevé chez les hommes que les femmes.




Des réalités locales semblables

- Entre 2006 et 2010, les MRC du Bas-Saint-Laurent présentent des taux d'incidence assez similaires pour l'ensemble des cancers. En 2010, le taux d'incidence était inférieur au Kamouraska, comparativement à l'ensemble de la région (données non représentées).

Taux de mortalité

- Au Bas-Saint-Laurent et au Québec, le taux de mortalité pour un cancer varie entre 2 et 3 décès pour 1 000 personnes entre les années 2000 et 2012 (Graphique 3).



Notes

1 : Taux de mortalité ajusté selon la structure par âge (1 à 49, 50 à 59, 60 à 69, 70 ans et plus), sexes réunis, de la population de l'ensemble du Québec en 2001.


2 : Ensemble des cancers sauf ceux de la peau qui sont pas des mélanomes.

Source : MSSS, Fichiers des décès, 2000 à 2012.

Certains cancers sont plus fréquents

- Les cancers les plus fréquents sont les suivants (graphique 4) :
 - les cancers des organes génitaux masculins, comme le cancer de la prostate;
 - les cancers de l'appareil digestif, comme le cancer colorectal;
 - et les cancers de l'appareil respiratoire, comme ceux du poumon.
- Entre 2006 et 2010, le taux d'incidence du cancer du sein était plus élevé au Bas-Saint-Laurent qu'au Québec (graphique 4).
- Pour les mêmes années, le taux d'incidence pour les cancers des organes génitaux masculins était plus faible dans la région qu'ailleurs au Québec.

Graphique 4 : Incidence¹ des cancers les plus fréquents, ensemble de la population, 2006-2010, Bas-Saint-Laurent et Québec



Notes

1 : Incidence ajustée selon la structure par âge (1 à 49, 50 à 59, 60 à 69, 70 ans et plus), sexes réunis, de la population de l'ensemble du Québec en 2001.

(+) Valeur significativement plus élevée que celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

Source : MSSS, Fichier des tumeurs, 2011.

Sources : - MSSS, Fichier des tumeurs, 2010.

- MSSS, Fichier des décès, 2013.

Réalisé par l'équipe de Surveillance de la santé

Direction de la santé publique du Bas-Saint-Laurent

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
du Bas-Saint-Laurent

Québec

