


REEMPLACEMENT ARTICULAIRE de la hanche



Récupération améliorée après la chirurgie



Apportez ce livret avec vous
le jour de votre chirurgie

Québec 

Remplacement articulaire de la hanche version avec restrictions

Hôpital régional de Rimouski et hôpital de Matane, Dr. Jalbert
Édition adaptée au programme de récupération améliorée après la chirurgie

Les travaux de ce livret ont été amorcés par les professionnels de physiothérapie du CISSS du Bas-Saint-Laurent, secteur ouest (2022).

Ce livret est inspiré du cheminement clinique élaboré par le groupe de travail sur l'arthroplastie de la hanche et du genou de « Récupération optimisée Canada » et de l'Office d'éducation des patients du Centre universitaire de santé McGill (CUSM).

Rédaction :

- François Levasseur, infirmier clinicien, répondant pour le programme RAAC, DSH, CISSS du Bas-Saint-Laurent

Professionnels du CISSS du Bas-Saint-Laurent qui ont contribué à la rédaction/révision :

- Élisabeth Lavoie, technologue en physiothérapie (Rivière-du-Loup)
- Anne-Christine Cloutier, assistante-chef, physiothérapie (La Matanie)
- Katia Hébert, assistante-chef, physiothérapie (Rimouski-Neigette)
- Mélanie Chénard, infirmière clinicienne, clinique préopératoire (Rivière-du-Loup)
- Manon Caron, infirmière clinicienne, assistante-chef, clinique préopératoire et chirurgie d'un jour (Rimouski-Neigette)
- Mélanie Gauthier, infirmière clinicienne, clinique préopératoire (La Matanie)
- Hélène Thibault, physiothérapeute, chef d'équipe physiothérapie (SERG Rimouski-Neigette)
- Claudie Lebel, physiothérapeute, coordonnatrice clinique (DPSAD/SERG, Rivière-du-Loup et Les Basques)
- Mélissa Lavoie, technicienne en administration (DSPLOSA)

Professionnels du CISSS du Bas-Saint-Laurent qui ont contribué à la validation du contenu :

- Marie-Claude Bourguignon, physiothérapie (Rivière-du-Loup)
- Marie-Claude Daris, infirmière clinicienne, assistante-chef, unité de chirurgie (Rivière-du-Loup)
- Alison Tremblay Wood, technologue en physiothérapie (La Matanie)
- Stéphanie Dallaire, infirmière clinicienne, soutien à domicile (La Mitis)
- Nathalie Leclerc, infirmière clinicienne, soutien à domicile (Rimouski-Neigette)
- Fabienne Saindon, ergothérapeute (Rivière-du-Loup)

Nous exprimons également notre profonde gratitude envers nos partenaires usagers qui ont gracieusement consenti à participer à la validation du contenu.

Dernière mise à jour : juin 2025

DSH-DE-006

Table des matières

Introduction	5
Qu'est-ce qu'une articulation de la hanche?	5
Qu'est-ce qu'une chirurgie de remplacement de la hanche?	5
Avant la chirurgie	6
1- Prioriser de saines habitudes de vie	6
2- Évaluation et enseignement à la clinique préopératoire.....	6
3- Préparation à la chirurgie	7
J'appelle le service du prêt d'équipement de ma région	8
La veille et le jour de votre chirurgie	11
4- Veille de la chirurgie.....	11
Hygiène corporelle :	11
Alimentation (jeûne) :	11
5- Jour de la chirurgie	12
6- Arrivée à l'hôpital	13
Après la chirurgie	13
7- Salle de réveil	13
8- Retour à la chambre.....	15
9- Retour à la maison	16
Déplacements sécuritaires.....	18
Autres conseils pour le retour à la maison	25
Programme d'exercices	28
Sondage	30

Il est possible que vous ayez plusieurs questions :

- En quoi consiste la chirurgie?
- À quel type d'évolution doit-on s'attendre après la chirurgie?

Par ce document, nous allons répondre aux questions les plus souvent posées par les patients.

Les études démontrent que le fait de suivre les recommandations contenues dans ce livret, permet de récupérer plus rapidement. Il s'agit de directives sur l'alimentation, l'exercice physique et le contrôle de la douleur. Elles vous aideront à vous sentir mieux plus rapidement et à rentrer chez vous plus tôt.

Apportez ce livret avec vous le jour de votre opération.

Utilisez-le comme guide à l'hôpital et lorsque vous rentrez chez vous après votre séjour à l'hôpital. Le personnel de l'hôpital pourra le consulter avec vous, durant votre convalescence et avant votre départ de l'hôpital. Nous vous invitons également à visiter le site Precare (<https://precare.ca/fr/>) où vous pourrez regarder des vidéos, afin de vous préparer à votre chirurgie. Cliquez sur « Guides de soins », puis sur « Orthopédie » et « Chirurgie de la hanche », ou balayez le code QR suivant :



Une intervention chirurgicale peut être stressante pour les patients et leur famille. Heureusement, vous n'êtes pas seul. Nous sommes là pour vous aider et vous soutenir tout au long de votre hospitalisation. Si vous avez des questions concernant vos soins, n'hésitez pas à nous les poser.

Signé : Votre équipe de chirurgie du CISSS du Bas-Saint-Laurent

Introduction

Qu'est-ce qu'une articulation de la hanche?

- La hanche est une articulation sphérique.
- Elle comprend des parties de l'os pelvien et du fémur (os de la cuisse).
- La partie supérieure (ou tête) du fémur porte le nom de boule.
- La boule du fémur s'insère dans un espace en forme de coupe dans le pelvis, appelé cavité. Dans le cas de la hanche, cette cavité s'appelle l'acétabulum.




Figure 1. L'articulation de la hanche.

Source : Centre universitaire de santé McGill (2023). Guide pour se préparer à la chirurgie de remplacement de la hanche.

Qu'est-ce qu'une chirurgie de remplacement de la hanche?

Lorsque l'articulation de la hanche est usée ou endommagée, la tête du fémur (boule) et l'acétabulum (cavité) sont remplacés par une prothèse. Votre chirurgien vous expliquera les différents types de prothèses et discutera avec vous de celle qui vous convient le mieux. Cette opération s'appelle un remplacement total de la hanche ou une prothèse totale de la hanche.




Figure 2. L'articulation de la hanche.

Le but de la chirurgie est de réduire votre douleur et d'augmenter votre mobilité.

Avant la chirurgie

1- Prioriser de saines habitudes de vie

Avant la chirurgie, nous vous recommandons fortement d'adopter de saines habitudes de vie selon les recommandations suivantes :



S'hydrater

Boire 6 à 8 verres d'eau par jour



Bien manger

3 repas et 2 collations par jour
Prioriser les repas équilibrés avec protéines, fibres, légumes, fruits et grains entiers.



Être actif

Activités physiques à tous les jours



Cesser de fumer et de vapoter

Au moins 4 semaines avant la chirurgie
Consultez les ressources disponibles (ligne téléphonique J'ARRÊTE et les centres d'abandon du tabac)



Cesser l'alcool

Au moins 24 heures avant la chirurgie

Cesser les drogues

Pour plus d'information concernant ces recommandations et les ressources disponibles, rendez-vous sur le site web <https://www.ciass-bsl.gouv.qc.ca/> ou informez-vous auprès de votre infirmière de la clinique préopératoire.

2- Évaluation et enseignement à la clinique préopératoire

Cette visite ou cet appel téléphonique a pour but de vérifier votre état de santé, de planifier vos soins et de s'assurer que vous êtes prêt pour la chirurgie.

Lors de votre visite ou appel téléphonique à la clinique préopératoire, **vous allez** :

- Rencontrer ou discuter avec une infirmière qui vous expliquera comment vous préparer à la chirurgie et à quoi vous attendre au cours de votre séjour hospitalier ;
- Passer une radiographie de votre hanche ;
- Rencontrer un intervenant en réadaptation qui passera en revue les exercices et vous guidera pour le matériel nécessaire dont vous aurez besoin.

Lors de votre visite à la clinique préopératoire, **vous pourriez** :

- Passer des prises de sang ;
- Passer un électrocardiogramme (ECG) ;
- Rencontrer un anesthésiste (le médecin qui gèrera votre douleur) ;
- Rencontrer un médecin spécialiste qui évaluera votre état de santé et passera en revue votre liste de médicaments.

3- Préparation à la chirurgie



Liste du matériel à acheter dans une pharmacie ou un magasin spécialisé :

- Plusieurs sacs de glace en gel
- Une canne
- Deux (2) éponges de Chlorexidine 4% (Soluprep), pour vous laver la veille de la chirurgie
- Une douche téléphone
- Procurez-vous deux (2) tapis de bain antidérapants de bonne qualité :
 - 1 pour le fond de la douche ou du bain
 - 1 pour le plancher de la salle de bain

- Une pince à long manche



- Un enfile bas



- Une brosse à long manche



- Une cuillère à chaussure à long manche



Organisez votre espace pour le retour à la maison :

- Aménagez votre domicile pour éviter d'utiliser le plus possible les escaliers (Installez un lit au rez-de-chaussée)
- Organisez l'environnement à la maison pour rendre votre matériel accessible en tout temps (vaisselle, chaudrons, vêtements...)
- Prévoir un fauteuil/chaise avec des appuis-bras, idéalement avec une assise ferme et qui ne berce pas
- Vérifier que la hauteur des assises est plus haute que la hauteur de vos genoux (lit, fauteuils, chaises)
- Rangez tous les tapis (surtout ceux qui glissent, comme ceux dans la chambre et la cuisine)
- Libérez l'espace autour du lit, dans les corridors, dans la cuisine et dans la salle de bain pour pouvoir bien circuler avec la marchette
- Retirez les fils électriques qui pourraient vous bloquer le chemin
- J'appelle le service du prêt d'équipement de ma région (voir page suivante)

*Si vous chauffez au bois ou aux granules, prévoyez une méthode alternative ou de l'aide

Voici d'autres suggestions :

- Remplissez votre réfrigérateur et votre congélateur. Achetez des repas surgelés ou préparez des portions individuelles que vous pourrez réchauffer jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux pour cuisiner
- Pratiquez-vous à vous asseoir du côté passager à l'avant du véhicule.
- Pratiquez-vous à entrer et sortir du lit et à faire votre hygiène à la toilette debout ;
- Pratiquez-vous à utiliser les outils d'habillage (pince long manche, brosse, enfile bas...)
- Pratiquez-vous à effectuer les exercices de la montée et de la descente des escaliers, ainsi que les exercices du programme d'exercices du présent document





J'appelle le service du prêt d'équipement de ma région (marchette, surélévation de toilette)

C'est votre responsabilité de vous procurer les équipements requis (au CLSC de votre région ou en pharmacie/magasin spécialisé) :

Une fois que vous aurez la date de votre chirurgie, **vous devez appeler** l'équipe du prêt d'équipement du CLSC de votre région pour aller chercher votre matériel :

- Une marchette à roulettes (pas de déambulateur) ;
- Une surélévation de toilette ;
- Un banc de bain ou de douche (au besoin).

Kamouraska, Rivière-du-Loup et Témiscouata	1-418-899-0214, poste 10192
Rimouski-Neigette et Les Basques	1-418-722-1954, option 6
La Mitis, La Matanie et La Matapédia	1-418-775-7261, poste 30229



Prévoyez de l'aide d'un ami ou de la famille (surtout la première semaine) pour vous aider à :

- Préparer vos repas ;
- Faire le lavage ;
- Faire votre toilette ;
- Faire le ménage ;
- S'occuper de votre animal de compagnie (litière au sol, bols de nourriture, etc.) ;
- Vous conduire à vos rendez-vous de physiothérapie ou au CLSC, car vous ne pourrez plus conduire pour au moins 6 semaines.

*Si le retour à la maison après la chirurgie vous inquiète, parlez-en à votre médecin ou à un autre membre de votre équipe de soins.

Planifiez votre retour à la maison :

Si vous quittez l'hôpital le jour même de l'opération, prenez des dispositions pour que quelqu'un vous ramène à la maison en fin d'après-midi. **Demandez-lui de rester sur place.**

Si vous passez la nuit à l'hôpital, prévoyez qu'on vous ramène à la maison le lendemain en avant-midi.

Si cela est nécessaire, il est possible après la chirurgie, d'aller à l'hôtellerie de votre hôpital ou un hôtel, et de vous assurer que votre accompagnateur demeure avec vous. Pour ce faire, vous devez réserver vous-même avant votre chirurgie selon les ressources disponibles :

- Nous vous recommandons l'Hôtellerie Omer-Brazeau : 418-724-2120
- Vous pouvez prévoir un séjour dans une maison de convalescence si vous pensez ne pas avoir d'aide à domicile, contacter l'AAOR pour connaître les ressources de votre région : 1-833-422-2267

Ajustement de la marchette à roulettes et de la canne

Pour ajuster la hauteur de la marchette :

- Tenez-vous debout, le corps bien droit et relâchez les épaules
- Assurez-vous que les appuie-mains sont à la hauteur du pli du poignet
- Assurez-vous que la marchette est au niveau et que les pieds sont réglés à la même hauteur




Figure 3. Ajustement de la marchette
Source : Familiprix (2023). Aide à la marche. Repéré à : <https://www.familiprix.com/fr/articles/aides-a-la-marche-a0d25c1b-c564-4f9a-b765-757bf3e5a725>

Pour ajuster la hauteur de la canne :

- Tenez-vous debout en portant vos chaussures de tous les jours, étendez les bras le long du corps et détendez les épaules;
- Assurez-vous que la poignée arrive à la hauteur du pli du poignet.
Vous devez utiliser la canne du côté opposé à la jambe qui sera opérée




Figure 4. Ajustement de la canne
Source : Familiprix (2023). Aide à la marche. Repéré à : <https://www.familiprix.com/fr/articles/aides-a-la-marche-8816113a-2965-4e0d-87e2-31607af7db2d>

Élévation de toilette :

Vous aurez besoin d'une élévation de la toilette d'au moins un pouce au-dessus de vos genoux.

Différentes hauteurs sont disponibles (2, 4 et 6 po).



Annulation de votre chirurgie :

Veillez appeler le bon numéro ci-dessous dans les plus brefs délais si vous devez annuler votre chirurgie. Vous devez appeler pour annuler votre chirurgie si :

- Vous êtes malade (fièvre, toux, difficulté à respirer, frissons, diarrhée, vomissements) ;
- Vous avez une infection ;
- Vous êtes enceinte.

Vous devez aviser la clinique au numéro ci-dessous dans les plus brefs délais si :

- Vous constatez des changements dans votre état de santé ;
- Vous prenez une nouvelle médication ;
- Vous souffrez de psoriasis, eczéma, d'une crise d'herpès buccal ou toute affection cutanée dans les jours précédents votre chirurgie ;
- Vous avez une plaie récente près de votre articulation à remplacer ;
- Vous avez reçu une infiltration (injection de Cortisone) il y a moins de trois mois avant la date prévue de votre chirurgie, à l'articulation opérée.

Bureau d'admission de Rimouski : 418-724-3000, poste 8461

Clinique préopératoire de Matane : 418-562-3135 poste 12036

La veille et le jour de votre chirurgie

4- Veille de la chirurgie



La veille de votre chirurgie, si vous n'avez pas été contacté, vous devez téléphoner l'agent administratif du bloc opératoire :

- Pour Rimouski : 418-724-3000 p.8461 (bureau d'admission)
- Pour Matane : 418-562-3135 p.10000 (bureau d'admission-**attendre l'appel en début de soirée**)

Complétez ce tableau pour noter les informations importantes :

Date et heure de la chirurgie :	
Heure à laquelle je dois boire 2 tasses de jus de pomme clair (le matin)	
Heure d'arrivée à l'hôpital	
Où me rendre à l'hôpital	

Hygiène corporelle :

Pour diminuer les risques d'infection, nous vous demandons de prendre un bain ou une douche la veille et le matin de la chirurgie **avec l'éponge de Chlorhexidine 4%**. Vous devez vous laver du cou jusqu'aux orteils avec l'éponge et bien rincer.

*Il est important de **ne pas appliquer** sur le visage et les organes génitaux.

Alimentation (jeûne) :

La veille de votre chirurgie, la tradition voulait que les patients soient à jeun à minuit, avant une chirurgie. Les études ont prouvé que de prendre des liquides clairs sucrés dans les heures avant la chirurgie, permettrait une meilleure récupération après la chirurgie.

C'est pourquoi nous vous demandons de respecter les indications suivantes, qui vous expliqueront quoi manger et quoi ne pas manger la veille et le matin de la chirurgie :



* **Certaines personnes ne doivent pas prendre de liquide après minuit. Votre infirmière vous dira si vous ne devez plus rien boire à partir de minuit.**

La veille de la chirurgie (souper)	<p><u>Pour souper :</u> mangez un repas normal.</p> <p>Vous devez éviter de :</p> <ul style="list-style-type: none">- Manger un trop gros souper- Manger au restaurant ou du <i>fast-food</i>- Manger des aliments très sucrés (Dessert, boissons gazeuses...) <p>Vous avez le droit de manger des aliments solides jusqu'à minuit.</p>
------------------------------------	--

<p>À partir de minuit</p> 	<p><u>Entre minuit et une heure avant l'arrivée à l'hôpital :</u> Ne mangez AUCUN aliment solide Vous avez le droit de boire des liquides clairs, par exemple : - Eau - Jus de pomme clair - Thé glacé - Café noir (sans lait, sans crème) - Boisson avec électrolytes (ex. : Gatorade)</p>
<p>Le matin de la chirurgie Une heure avant l'arrivée à l'hôpital</p> 	<p><u>Une heure avant l'arrivée à l'hôpital :</u> Vous devez boire 2 tasses de jus de pomme clair</p> <p>Par exemple : Si on vous dit que vous devez vous présenter pour 7h00 à l'hôpital, vous devez boire 2 tasses de jus de pomme entre 5h00 et 6h00 le matin.</p> <p>Après avoir bu le jus, vous devez rester à jeun complètement.</p>

5- Jour de la chirurgie

Le matin de la chirurgie, avant d'arriver à l'hôpital, vous devez :

- Enlever : maquillage, vernis à ongles, manucure, bijoux et piercing
- N'apportez pas d'objets de valeur (argent, carte de crédit, bijoux, appareils électroniques ou autres)
- N'appliquez pas de crème hydratante sur votre corps
- Ne rasez pas la région à opérer

Suivez les indications de votre chirurgien ou de l'infirmière de la clinique préopératoire pour la prise ou non de médicaments le matin de la chirurgie.



Liste de choses à apporter à l'hôpital :

- Ce livret
- Carte d'hôpital et d'assurance maladie
- Pantoufles ou souliers antidérapants
- Vêtements amples et confortables
- Produits d'hygiène personnelle (brosse à dents, dentifrice, désodorisant, mouchoirs, serviettes hygiéniques, etc.)

À apporter au besoin :

- Formulaire d'assurance invalidité
- Pompe d'inhalation si vous en prenez à la maison
- Lunettes, verres de contact, prothèses auditives, prothèses dentaires (Apportez leur étui de rangement respectif, étiqueté à votre nom.)
- Appareil pour l'apnée du sommeil

6- Arrivée à l'hôpital

Rendez-vous au service d'admission de l'hôpital ou à l'endroit indiqué, à l'heure que nous vous avons dit. La famille et les amis pourront vous attendre dans la salle d'attente pour les prochaines étapes.

Rencontre avec l'infirmière :

Vous rencontrerez une infirmière qui pourra répondre à vos questions et qui :

- S'assurera que vos effets personnels soient placés dans un endroit sécuritaire ;
- Vous donnera des comprimés à prendre avec un peu d'eau (Ces comprimés aideront à prévenir et à réduire la douleur après la chirurgie).

Dans la salle d'opération :

- Un préposé aux bénéficiaires vous conduira à la salle d'opération ;
- La majorité des chirurgies sont effectuées sous anesthésie régionale ou générale. Avec l'anesthésie régionale, une injection dans le bas de votre dos éliminera toute sensation de douleur au bas du corps et vous serez partiellement endormi ;
- Vous pourrez en discuter avec votre anesthésiste ;
- La chirurgie dure habituellement une heure à une heure et demie ;
- Vous serez positionné sur le dos pour toute la durée de l'opération.

Après la chirurgie

Vous quitterez le jour même de votre chirurgie ou vous resterez à l'hôpital entre 24 et 48 heures.

7- Salle de réveil

Après la chirurgie, l'anesthésiste, l'inhalothérapeute et une infirmière vous ramèneront à la salle de réveil. Vous resterez là aussi longtemps que nécessaire pour surveiller vos signes vitaux et stabiliser votre douleur. L'équipe d'anesthésie et de chirurgie s'assurera de réduire votre douleur au minimum après l'opération.

Dès votre réveil, on vous demandera de débuter les exercices respiratoires et circulatoires. Ces exercices sont très importants pour éviter les complications les plus fréquentes, tels que les thrombophlébites.

Ces exercices devront être faits au moins 10 fois par heure :

1- Exercices circulatoires :




Figure 5. Exercices circulatoires

Source : Centre universitaire de santé McGill (2023). Guide pour se préparer à la chirurgie de remplacement du genou.



2- Exercice respiratoire :

- Placez vos lèvres autour de l'embout buccal.
- Inspirez profondément.
- Tentez de maintenir la balle en hauteur le plus longtemps possible
- Retirez l'embout buccal de votre bouche et expirez.
- Reposez-vous quelques secondes avant de recommencer




Figure 6. Exercices respiratoires

Source : Physiotec : appli d'Exercices et interactions patients (2024). Inspiration et expiration.

Familiarisez-vous avec l'échelle d'intensité de la douleur :

Nous vous demanderons à plusieurs reprises votre niveau de douleur sur une échelle de 0 à 10. 0 signifie aucune douleur et 10 représente la pire douleur que vous puissiez imaginer.

Il est normal de ressentir une certaine douleur suite à une chirurgie de remplacement de la hanche.

Dans ce cas, votre douleur sera contrôlée par l'acétaminophène (Tylenol/Atasol).

Notre but est de maintenir votre niveau de douleur en dessous de 4 sur 10. N'attendez pas que la douleur devienne intolérable pour nous dire que vous avez mal.




Figure 7. Échelle d'intensité de la douleur

Source : Centre universitaire de santé McGill (2023). Guide pour se préparer à la chirurgie de remplacement de la hanche.

Une fois que votre douleur sera contrôlée, vous serez transféré vers votre chambre ou sur l'unité de chirurgie d'un jour sur votre civière.

8- Retour à la chambre

Une fois arrivé à votre chambre, vous pourrez :

- Boire et manger dès que vous aurez reçu l'autorisation ;
- Votre premier lever sera fait rapidement (4 à 6 heures après la chirurgie) ;
- Effectuer les exercices circulatoires et respiratoires ;
- Dès que c'est possible, vous vous lèverez avec l'assistance du personnel.



Un professionnel en réadaptation vous aidera à débiter le programme d'exercice. L'important est de bouger dès que possible avec un membre du personnel. Plus vous fournirez des efforts pour bouger et pour effectuer les exercices, plus vite vous pourrez reprendre vos activités.

Nous vous rappellerons comment vous déplacer seul et de façon sécuritaire en vue de votre retour à la maison.

Gestion de la douleur :

Vous recevrez de la médication contre la douleur régulièrement. Pensez à aviser votre infirmière si votre douleur se retrouve au-dessus de 5 sur 10. Il est primordial que votre douleur soit bien gérée, afin de ne pas restreindre votre mobilité et la réalisation de vos exercices.

Bouger doit être une priorité !

9- Retour à la maison

Au moment de votre congé, votre dossier sera transféré aux intervenants responsables de votre suivi. Nous communiquerons avec vous pour la suite de votre réadaptation.



Symptômes anormaux



Si vous ressentez l'un des symptômes suivants :

- Perte de sensation dans la jambe opérée.
- Incapacité totale de mettre du poids sur votre jambe opérée, lorsque permis.
- Température à plus de 38°C.
- Écoulement à l'extérieur du pansement, sans cesse.
- Vomissements.
- Sensation de brûlure en urinant ou incapacité à uriner.
- Douleur subite et intense à un endroit précis du mollet.
- Essoufflement (souffle court).
- Douleur au thorax.
- Signes d'infection de votre plaie tels que :
 - Rougeur, chaleur, gonflement, douleur qui augmente;
 - Écoulement de pus.

Communiquez avec la clinique d'orthopédie (de jour sur semaine seulement) :

Hôpital régional de Rimouski ou Hôpital de Matane : 418-724-3000 #8561

Ou



Si vous avez des questions ou des inquiétudes, n'hésitez pas à communiquer avec l'infirmière de l'hôpital (de jour sur semaine seulement) : **(418) 551-0753**

Communiquez avec Info-santé 811 (les jours fériés, les soirs et la fin de semaine)

Si vous présentez un ou des symptômes anormaux et que vous ne pouvez pas joindre aucun de ces services, rendez-vous à l'urgence la plus proche.

Symptômes normaux dans les 14 premiers jours

Douleur importante	<ul style="list-style-type: none">• Il est normal de ressentir de la douleur importante à la hanche opérée.• La douleur diminuera en intensité et en fréquence avec le temps.• Prenez la médication selon la prescription.• Appliquez de la glace 10-15 minutes toutes les heures.• La douleur ne doit pas vous empêcher de bouger.
Raideur avec perte de mobilité	<ul style="list-style-type: none">• Les exercices vous aideront à augmenter la souplesse tout en réduisant la douleur et l'enflure.• Il est important de doser les périodes de repos et d'activités.
Signes inflammatoires - Œdème (enflure) - Rougeur - Chaleur importante	<ul style="list-style-type: none">• Il est normal que l'inflammation persiste quelques semaines, elle fait partie du processus de guérison.• La glace, la poursuite de vos exercices de physiothérapie et la marche sont d'excellents moyens pour contrôler l'enflure et la douleur.
Pansement souillé (sang)	<ul style="list-style-type: none">• Il est normal que le pansement soit souillé, mais le saignement ne doit pas couler sans cesse ou déborder du pansement.
Ecchymoses (bleus)	<ul style="list-style-type: none">• Des bleus apparaîtront au niveau de la cuisse. Ils vont se résorber progressivement.

Recommandations importantes pour les 14 premiers jours :

- Appliquez de la glace 10-15 minutes, toutes les heures (enroulée dans un linge humide).
- Utilisez la marchette en tout temps.
- Se lever et marcher toutes les heures.
- Respectez le programme d'exercices et les directives sur les déplacements sécuritaires des prochaines pages.



Déplacements sécuritaires

Les restrictions de mouvements au niveau de la hanche opérée :

Suite à la chirurgie, vous devrez éviter certains mouvements pour une durée de **3 mois**, afin de permettre une bonne guérison des tissus et éviter la luxation de la hanche opérée.

1. Vous devez conserver une flexion de hanche égale ou inférieure à 90 degrés



Figure 8. Restrictions de flexion au niveau de la hanche opérée.
Source: CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal. (2020).

2. Ne pas coller ou croiser les jambes



Figure 9. Ne pas croiser les jambes
Source: CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal. (2020).

3. Pas de rotation interne de la hanche opérée :



Figure 11. Restriction de mouvements
Source : Physiotec : appli d'Exercices et interactions patients (2023).

Faire ces mouvements peut provoquer une luxation de la hanche



Monter et descendre l'escalier avec la canne :

Pour monter :

1. Approchez la canne de la marche.
2. Montez la jambe saine en premier sur la marche.
3. Montez ensuite la canne et la jambe opérée sur la même marche.
4. Répétez cette séquence pour chaque marche.



Pour descendre :

1. Descendez la canne et la jambe opérée en premier.
2. Descendez ensuite la jambe saine sur la même marche.
3. Répétez cette séquence pour chaque marche.



Consignes pour la voiture :

Après votre opération, vous pouvez conduire à nouveau après environ 6 semaines, ou avec l'autorisation de l'orthopédiste. En attendant, vous devriez être assis du côté passager.

Si le siège est trop bas, mettez un coussin dessus. Et si nécessaire, vous pouvez utiliser un sac en plastique pour vous aider à glisser plus facilement.

Voici comment faire :

1. Demandez à quelqu'un de reculer le siège au maximum et de l'incliner complètement vers l'arrière.
2. Asseyez-vous sur le siège avec vos deux jambes à l'extérieur de la voiture.
3. Rentrez une jambe à la fois dans la voiture.
4. Vous pouvez ensuite ajuster la position du dossier et du siège pour votre confort.
5. Pour sortir de la voiture, faites l'inverse : commencez par abaisser le dossier et reculer le siège.



Figure 12. Entrer et sortir de la voiture

Source : Physiotec : appli d'Exercices et interactions patients (2024). Transfert véhicule.

S'asseoir et se lever d'une chaise :

Allongez la jambe opérée le plus possible vers l'avant. Utilisez les appuis-bras de la chaise pour vous aider, plutôt que la marchette.

Asseyez-vous sur des chaises fermes avec appuis-bras. Évitez les fauteuils mous, profonds et bas.



Figure 13. Se lever

Source : Physiotec : appli d'Exercices et interactions patients (2024).

La marche

À titre indicatif, nous vous recommandons de marcher en moyenne le nombre de pas suivant chaque jour :

La 1 ^{re} semaine	Moins de 750 pas par jour
La 2 ^e semaine	Moins de 1200 pas par jour
La 3 ^e semaine	Moins de 2000 pas par jour
La 4 ^e semaine	Moins de 2750 pas par jour
La 5 ^e semaine	Moins de 3500 pas par jour
La 6 ^e semaine	Moins de 4500 pas par jour
Par la suite, augmenter de 1000 pas par jour chaque semaine	

Source : Lalande, J.-F. (2025, 17 avril). *Présentation sommaire du protocole du Dr Andrew B. Wickline : Happy Total Knees (and Hips) – 30+ ways to mitigate post-op swelling and inflammation* [Présentation PowerPoint]. Présentation basée sur le contenu original du Dr Andrew B. Wickline, avec permission écrite obtenue le 17 mars 2025.

Entrer et sortir du lit :

1. Pour sortir du lit : passez d'abord en position assise en prenant appui sur les coudes puis sur les mains.
2. Pivotez sur les fesses en glissant vos jambes une à une sur le bord du lit, tout en maintenant un espace entre les genoux.
 - Faites les étapes inverses pour entrer dans le lit.
 - Nous vous recommandons d'entrer et de sortir du lit du même côté que la jambe opérée.
 - On recommande de dormir sur le dos.
 - Il est permis de dormir sur le côté opéré avec un oreiller entre les jambes, sauf avis contraire de votre médecin



Figure 14. Entrer et sortir du lit

Source : CHUM : Prothèse totale de la hanche : prendre soin de soi après l'opération (2020).

Position pour dormir :

Dormez sur **le dos** ou sur **votre côté opéré** avec un oreiller entre les jambes, pour les 3 mois suivant la chirurgie.



Jambe opérée en dessous

Aller aux toilettes :

Le siège de toilette surélevé est obligatoire

Pour vous essuyer, vous pouvez utiliser l'une des deux techniques suivantes, tout en évitant de vous pencher vers l'avant.

1- Levez-vous et tournez-vous du côté de votre jambe saine

2- Demeurez assis et basculez votre poids du côté opéré



Figure 15. Aller aux toilettes

Source : CHUM : Prothèse totale de la hanche : prendre soin de soi après l'opération (2020).

S'habiller :

- Choisissez des vêtements amples

1) Pantalon

- Assoyez-vous sur une chaise au bord du lit et utilisez une pince à long manche pour enfiler le vêtement au bout du pied.
- Commencez par la jambe opérée.
- Pour vous déshabiller, faites l'inverse en retirant la jambe du côté sain d'abord.



2) Bas

- Utilisez un enfile-bas.
- Pour enlever vos bas, utilisez une pince à long manche en l'insérant sur le bord intérieur du pied.



3) Souliers

- Portez des pantoufles fermées antidérapantes.
- Vous ne pouvez pas vous pencher pour attacher vos souliers.
- Il est préférable de porter un soulier sans attache.
- Si vous devez porter un soulier lacé, utiliser des lacets élastiques.
- Utilisez une cuillère à long manche pour vous aider à glisser le talon dans le soulier.



Se laver :

- Les premiers jours, faites votre toilette au lavabo, assis sur une chaise avec appui-bras.
- Une douche peut être prise après 3 à 4 semaines lorsque votre cicatrice sera bien guérie et sans écoulement. Vous pourrez alors vous laver normalement en évitant de froter la cicatrice (tamponner au lieu de froter).
- Vous ne pourrez pas aller dans le fond du bain tant que les restrictions de mouvements ne seront pas levées (trois mois).
- Placer un tapis antidérapant à l'intérieur et à l'extérieur de la douche.
- Installez des barres d'appui au mur au besoin.
- Utilisez une brosse à long manche pour laver le dos, les jambes et les pieds. Pour essuyer ces régions, enroulez une serviette autour de la brosse ou utilisez un séchoir à cheveux.



1- Entrer dans le bain-douche en position assise (avec la planche ou le banc de transfert)

- Mettez une serviette sur la planche ou le banc de transfert afin de glisser plus facilement.
- Faites demi-tour pour être dos au bain.
- Étendez votre jambe côté opéré.
- Assoyez-vous en appuyant une main sur le banc.
- Une fois assis, tournez-vous lentement pour faire face aux robinets en vous assurant de maintenir un bon alignement de la jambe côté opéré.
- Passez une jambe dans le bain, puis l'autre.
- Pour la jambe côté opéré, il est important de vous assurer que le genou pointe vers le plafond et d'allonger la jambe devant vous, afin d'éviter les mouvements contre-indiqués.
- Procédez à l'inverse pour sortir.



2- Entrer dans le bain-douche en position debout (avec un siège ou une chaise de bain)

- Placez-vous parallèlement à la baignoire, mains appuyées sur la barre d'appui verticale ou la marchette.
- En vous tenant bien sur l'appui, enjambez le rebord en prenant soin de placer le pied au centre de la baignoire.
- Entrez ensuite l'autre jambe. Lorsque vous entrez la jambe côté opéré, pliez le genou avec le pied vers l'arrière.
- Procédez à l'inverse pour sortir.



Avant d'entrer dans la baignoire, ajustez la température de l'eau et placez la douche téléphone à portée de main

Autres conseils pour le retour à la maison

1- Médicaments contre la douleur

À votre sortie de l'hôpital, on vous remettra une prescription que votre accompagnateur pourra aller chercher à votre pharmacie. **Écoutez les consignes de votre pharmacien pour la prise des médicaments.** Ces médicaments vous aideront à contrôler la douleur et prévenir les risques de formation de caillot dans votre jambe (éclaircir le sang). Vous aurez aussi un antidouleur à prendre au besoin (si la douleur n'est pas soulagée par la médication régulière et par l'application de la glace). Pensez à le prendre 1 heure avant d'effectuer vos exercices si vous avez de la douleur.

2 - Si vous avez un pansement et des agrafes sur la cicatrice :

Vous devez laisser le pansement en place. Le pansement et les agrafes seront retirés par une infirmière du CLSC ou aux soins courants environ 14 jours après la chirurgie.

3 - Prévention de la constipation :

Il arrive souvent d'avoir des problèmes de constipation après l'opération, à cause des médicaments contre la douleur qui ralentissent votre digestion. C'est pourquoi nous vous recommandons de :

- Manger des aliments avec beaucoup de fibres
- Boire assez d'eau
- Bouger régulièrement
- Prendre le laxatif doux au besoin (surtout dans les 3 premiers jours après l'opération)

4 - Hygiène

Les consignes concernant l'hygiène peuvent varier selon la façon dont votre plaie a été refermée et selon votre type de pansement. Les consignes générales sont les suivantes :

- La douche est permise
- La région opérée ne doit pas être immergée dans l'eau (Bain, piscine et spa interdit)

5 - Travail

Votre retour au travail sera planifié avec votre chirurgien et se fera en fonction de votre type de travail (habituellement 2 à 4 mois pour un travail sédentaire et 3 à 5 mois pour un travail physique).

6 - Voyage

Si vous faites de la route, prévoir des arrêts chaque heure pour bouger, afin de diminuer les risques de caillots.

N'oubliez pas de vérifier vos assurances avant de planifier un voyage. Vous devez vous assurer d'être couvert pour les problèmes médicaux en période post opératoire.

Si vous prévoyez voyager en avion moins de 3 mois après votre chirurgie, vérifiez avec votre orthopédiste les indications particulières. Il se pourrait qu'on vous prescrive la prise d'aspirine 325 mg, 1 comprimé par jour à débiter 3-4 jours avant le départ, à poursuivre jusqu'au retour.

7 - Sports

La natation, la marche, le vélo stationnaire sont des activités à favoriser :

1. **Natation** : vous pourrez retourner à la piscine 4 à 6 semaines après la chirurgie, pour de la marche dans l'eau ou de la natation douce. Il est important que la plaie soit complètement guérie ;
2. **Vélo (sans cale-pieds), ski de fond, patin, quilles, danse sociale, pétanque, jardinage et golf** : vous pourrez reprendre ces activités 3 à 5 mois après votre chirurgie (selon votre condition) ;
3. **À éviter** :
Pendant les 3 premiers mois, évitez de pratiquer des sports de façon intense. Les activités avec impacts et des pivots répétés sont déconseillés : saut, jogging, volley-ball, soccer, basketball, ski alpin, danse aérobique, hockey, sports de raquettes, course à pied ;
4. **Pour d'autres sports spécifiques, parlez-en avec votre chirurgien.**

8 - Reprise des activités sexuelles :

Vous pourrez reprendre vos activités sexuelles aussitôt que vous vous sentirez à l'aise de le faire. Vous pourriez toutefois avoir certaines restrictions dans vos mouvements.

9 - Rendez-vous de suivi médical :

Le personnel de la centrale de rendez-vous vous appellera pour fixer la date et l'heure de votre rendez-vous de suivi médical (3 à 6 semaines après la chirurgie).

- Apportez votre papier de rendez-vous qui vous a été remis le jour de votre chirurgie
- Vous passerez une radiographie de contrôle
- Assurez-vous d'avoir votre ordonnance d'arrêt de travail ou de congé (si requis)

10 - Documents d'assurance :

Les documents d'assurance salaire, prêt bancaire, emploi, CNESST, SAAQ etc., devront être déposés au secrétariat d'orthopédie lors du rendez-vous de contrôle après la chirurgie. Des frais peuvent s'appliquer.

11 - Si vous avez une bande de colle sur la cicatrice, qui ressemble à ceci :




Figure 16. Pansement Dermabond Prineo
Source : Hospwork (2024).

- Vous devez laisser la bande de colle (qui ressemble à un moustiquaire) en place.
- Elle finira par décoller par elle-même au bout de 2 à 3 semaines.
- Si elle est toujours en place après 3 à 4 semaines, vous ou l'infirmière pourrez la retirer en frottant délicatement avec de la vaseline.

- La douche est permise, le pansement et la région opérée ne doivent pas être immergés dans l'eau. (Bain, piscine et spa non permis).
- Éviter de frotter ou de gratter le pansement.
- Ne pas appliquer d'onguents, de liquide ou d'autres produits sur la bande.
- Ne rien coller directement sur le pansement (par exemple : ruban adhésif)

Si vous présentez un signe de complication tel que :

- Décollement de la bande de colle avant la fin de la cicatrisation (dans les 14 premiers jours).
 - Écoulement nauséabond persistant
 - Ouverture de la plaie
- Communiquez avec Info-santé 811 ou la clinique d'orthopédie (de jour sur semaine seulement)
- Rimouski et Matane : 418-724-3000 #8561



Programme d'exercices

Les exercices doivent être débutés avant la chirurgie et vous devez les poursuivre après la chirurgie :

- Faites vos exercices comme recommandé et respectez les consignes de l'équipe de soins.
- Si la douleur augmente de façon significative, durant et/ou après les exercices, diminuez la fréquence ou l'intensité des exercices pour les effectuer selon vos capacités.
- Appliquez de la glace **10-15 minutes**, toutes les heures (**enroulée dans un linge humide**).
- Utilisez la marchette en tout temps (suivez les indications du professionnel en réadaptation).
- Lorsque vous êtes au lit, gardez la jambe opérée allongée.
- Les exercices seront modifiés et guidés par votre professionnel en réadaptation selon votre progression.

N° 1

Couché sur le dos, pointez le pied, puis tirez le pied vers vous.

Exécutez le mouvement aller-retour rapidement.

Bougez durant une minute, au rythme des secondes, une fois à l'heure.

EXERCICE CIRCULATOIRE



N° 2

Couché sur le dos, tendez le pied vers vous et écrasez le genou de la hanche opérée contre le matelas.

Répétez 10 fois.

Tenir 5 secondes.

Répétez _____ fois par jour

CONTRACTION DU QUADRICEP



N° 3

Couché sur le dos, serrez les fesses le plus possible tout en poussant les talons dans le matelas.

Répétez 10 fois.

Tenir 5 secondes.

Répétez _____ fois par jour

CONTRACTION DES FESSIERS



N° 4

Couché sur le dos, écartez la jambe opérée en la gardant étendue, les orteils pointés vers le plafond.
Ramenez la jambe vers le centre
Répétez 10 fois, lentement.

Répétez _____ fois par jour

ABDUCTION DE LA HANCHE



N° 5

Couché sur le dos ou à demi assis, avec un rouleau ferme sous le genou, jambe saine fléchie pour stabiliser le bassin.
Levez le pied de la jambe opérée pour redresser le plus possible le genou. Éviter de soulever la cuisse.
Répétez 10 fois.
Tenir 5 secondes.

Répétez _____ fois par jour

RENFORCEMENT DU QUADRICEPS



N° 6

Couché sur le dos, les jambes allongées.
Fléchir lentement la jambe opérée en glissant le talon vers la fesse.
Gardez le contact du talon avec le matelas pour respecter le 90° de flexion à la hanche.
Exécutez le mouvement aller-retour lentement.
Répétez 10 fois. Tenir 5 secondes.

Répétez _____ fois par jour

FLEXION DE LA HANCHE ET DU GENOU



N° 7

En position assise, dos en appui.
Levez le pied le plus haut possible tout en gardant la cuisse sur la chaise.
Tenir 5 sec.
Répéter 10 fois.

Répétez _____ fois par jour

EXTENSION DU GENOU EN POSITION ASSIS



Tableau 1. Programme d'exercice postopératoire

Source (illustrations): Physiotec : appli d'Exercices et interactions patients (2024).

Ce guide d'intervention en physiothérapie vise à travailler les problèmes suivants :

- Présence de douleur
- Diminution de l'amplitude articulaire
- Diminution de la force musculaire
- Difficulté lors des transferts
- Patron de marche perturbé
- Présence de signes trophiques

Sondage

Ce questionnaire s'adresse aux personnes ayant reçu une prothèse totale de la hanche au CISSS du Bas-Saint-Laurent. Merci de prendre quelques minutes pour nous faire connaître votre appréciation en complétant ce formulaire ou via le questionnaire web suivant :



https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KP7hBotfdUC_bK4kvhp5knJoVkcWUpIlrpQx7vvxaYIURDBTVFdJVTqWWEY4SkVLQ1FOMVdRU01TWS4u

Pour chacun des énoncés suivants, cochez (✓) votre degré de satisfaction.

Veillez indiquer l'endroit où a eu lieu votre chirurgie :				
<input type="checkbox"/> Centre hospitalier régional du Grand-Portage <input type="checkbox"/> L'Hôpital régional de Rimouski <input type="checkbox"/> L'Hôpital de Matane				
Informations démographiques et autres :				
<input type="checkbox"/> Homme <input type="checkbox"/> Femme <input type="checkbox"/> Autre, précisez :				
<input type="checkbox"/> Moins de 50 ans <input type="checkbox"/> 50-64 ans <input type="checkbox"/> 65-84 ans <input type="checkbox"/> 85 ans et plus				
<input type="checkbox"/> J'ai dormi à l'hôpital une seule nuit <input type="checkbox"/> J'ai dormi à l'hôpital plusieurs nuits				
<input type="checkbox"/> J'ai quitté l'hôpital le jour même de la chirurgie				
S.V.P., cochez la case correspondante à votre réponse				
	Très satisfait	Satisfait	Peu satisfait	Insatisfait
Respect de la personne				
1	Respect de la confidentialité (lors des soins, des traitements, des examens et consultations...)			
2	Accueil, courtoisie et attitude du personnel soignant et des professionnels			
3	Accueil, courtoisie et attitude des médecins			
Quantité et pertinence de l'information reçue <u>AVANT</u> votre chirurgie				
4	Par le(s) médecin(s) (orthopédiste, anesthésiste, etc.)			
5	Par les infirmières			
6	Par les intervenants en réadaptation			
Quantité et pertinence de l'information et des soins reçus <u>LE JOUR</u> de votre chirurgie				
7	L'accueil et l'assistance du personnel le jour de la chirurgie			
8	L'information qui vous a été transmise concernant les étapes à venir après la chirurgie			

Quantité et pertinence de l'information et des soins reçus APRÈS votre chirurgie

9	Les soins après la chirurgie				
10	L'information qui vous a été transmise concernant la gestion de la douleur et le retour à la maison				

Évaluation de l'expérience de réadaptation APRÈS votre chirurgie

11	Dans l'ensemble, comment évaluez-vous votre expérience de réadaptation dans les 3 mois suivant la chirurgie?				
12	Dans l'ensemble, comment évaluez-vous votre expérience de réadaptation dans les 12 mois suivant la chirurgie?				

Le livret *Remplacement articulaire de la hanche*

13	Appréciation générale du livret				
14	Le livret est facile à comprendre	<input type="checkbox"/> Absolument <input type="checkbox"/> Oui, en partie <input type="checkbox"/> Plutôt non <input type="checkbox"/> Non, pas du tout			
15	Le livret m'a permis de bien me préparer en vue de ma chirurgie	<input type="checkbox"/> Absolument <input type="checkbox"/> Oui, en partie <input type="checkbox"/> Plutôt non <input type="checkbox"/> Non, pas du tout			
16	Avez-vous trouvé les informations concernant la préparation à la chirurgie claires et utiles	<input type="checkbox"/> Très claires et utiles <input type="checkbox"/> Claires, mais pas très utiles <input type="checkbox"/> Peu claires, mais utiles <input type="checkbox"/> Pas claires et pas utiles			

17-Comment pouvons-nous contribuer à améliorer l'expérience des personnes qui recevront une prothèse totale du genou au CISSS du Bas-Saint-Laurent?

18-Si vous deviez décider à nouveau d'avoir la même opération, le feriez-vous?

19-Autres commentaires

MERCI de votre collaboration!

Détachez ce questionnaire pour le compléter. S.V.P., Veuillez transmettre les sondages complétés numérisés à l'adresse courriel suivante : francois.levasseur@sante.quebec

**Centre intégré
de santé
et de services sociaux
du Bas-Saint-Laurent**

Québec 