



CONSULTATION EN PNEUMOLOGIE ADULTE

Attention: Consulter les alertes cliniques au verso et favoriser les protocoles de l'Accueil clinique (si disponibles) avant de remplir ce formulaire.

| Nom et pr | énom de l'usager | | | | | | | | |
|------------------------|------------------|--|------------|-------|------|---------|--|--|--|
| N° d'assurance maladie | | | | Année | Mois | | | | |
| | | | Expiration | | | | | | |
| Nom et pr | énom du parent | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Ind.rég. | N° téléphone | | Ind. rég. | N° t | | (autre) | | | |
| | | | | | | | | | |
| Adresse | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Code postal | | | | | | | | | |

| | Raiso | on de consultation | Échelle de priorité cl | nique | : A | ≤ 3 jrs B: ≤ 10 jı | s C:≤28 jrs D | : ≤ 3 mois E : ≤ 12 mo | is | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|--|--|
| 4 | ccueil ble | Hémoptysie persista | persistante | | Toux | Infiltrat persistant ou lentement résolutif (> 1 mois) à la radiographie pulmonnaire malgré traitement | | | С | | |
| Suspicion de néoplasie Utiliser formulaire d'Accueil | ire d'A lisponil | Nodule ou lésion susp sans néoplasie connue | ote | В | Infec | Bronchiect | ☐ Bronchiectasies symptomatiques | | | | |
| | formula ique si d | (Prérequis : rapport TDM) | ☐ 8-15 mm | С | | Toux chror | Toux chronique (> 8 semaines) avec radiographie pulmonaire normale | | | | |
| picion | Utiliser clin | Épanchement pleural nouveau, unilatéral et symptomatique | | В | | Apnée obstruction suspectée ou final ET | uctive du sommeil AVEC métier u traitée à risque | | С | | |
| Sus | Micronodule < 8 mm évolutif à la TDM de suivi | | | D | 4. | hypersomnole | persomnolence diurne sévère (Prérequis : justifier) | | | | |
| Adénopathie médiastinale ou hilaire > 1 cm | | | С | Apnée | EPWORTH¹ ≥ | OU EPWORTH¹ ≥ 15 OU SANS métier | | D | | | |
| Exacerbation aiguë avec échec du plan d'action (corticothérapie | | | ec | В | • | Index de désaturation (IDO) ≥ 30/h | | à risque | | | |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | ale ou antibiothérapie) érequis : détailler traitement) | Asthme | В | | Apnée du s de traiteme | sommeil suspectée ou réévaluation | | | | |
| orale ou antibiotherapie) (Prérequis : détailler traitement) MPOC/Asthme suspecté ou réponse inadéquate au traitement de base (Prérequis : spirométrie si disponible) | | □ мрос | E | | Dyspnée d'effort inexpliquée (non cardiaque, sans anémie avec radiographie pulmonaire normale) | | | Е | | | |
| MPC | | itement de base érequis : spirométrie si disponible) | ☐ Asthme | E | Autres | (Prérequis : justifier dans la section renseignements cliniques) | | | | | |
| Réadaptation respiratoire | | | | E | Maladies pulmonaires interstitielles (ex. : fibrose) (Prérequis : rapport TDM) | | | titielles (ex. : fibrose) | D | | |
| Autre raison de consultation non standardisée au formulaire ou modification d'une priorité clinique (justification OBLIGATOIRE dans la section suivante) : Impression diagnostique et renseignements cliniques obligatoires Si prérequis exigé(s) : Disponible(s) dans DSQ Annexé(s) à la présente demande Prescrit(s) | | | | | | | | | | | |
| Besoins spéciaux : Identification du médecin référent et du point de service Nom du médecin référent N° de permis Estampe | | | | | | | | | | | |
| Ind. rég. N° de téléphone N° de poste Ind. rég. | | | | g. N | N° de télécopieur | | _ | | | | |
| Nom du point de service | | | | | | | | | | | |
| Signature | | | | | Date (année, mois, jour) | | 1 | | | | |
| Médecin de famille : Idem au médecin référent Usager sans médecin de famille | | | | | | | , | ominative (si requis) | ın | | |
| Nom du médecin de famille | | | | | | | point de service en p | référence à un médecin ou à u particulier | 111 | | |
| No | m du p | oint de service | | | | | | | | | |

Légende

Référer à l'échelle de somnolence d'EPWORTH : http://sommeil-mg.net/spip/questionnaires/Echelle%20D'Epworth.pdf

Alertes cliniques (liste non exhaustive)

Diriger l'usager vers l'urgence

- PNEUMONIE: Tableau clinique de pneumonie avec signes de sévérité (désaturation < 90 %, confusion, hypotension, etc.) ou fièvre persistante (> 48 h) sous traitement antibiotique
- MPOC : Détérioration grave AVEC somnolence ou désaturation < 90 %
- HÉMOPTYSIE IMPORTANTE (100 ml ou +) ou répétée (20 ml à quelques reprises dans la même journée)
- ASTHME : Exacerbation d'asthme aiguë sévère ou sans réponse à la corticothérapie orale depuis 24 h
- DYSPNÉE: Au repos, rapidement progressive (< 1semaine)
- SUSPICION D'EMBOLIE PULMONAIRE
- ÉPANCHEMENT PLEURAL significatif AVEC fièvre associée ou suspicion d'infection (empyème) ou désaturation < 90 %