

Professionnels habilités : Infirmière et infirmier clinicien travaillant à l'accueil clinique du CISSS du Bas-Saint-Laurent.
 Clientèle visée : Personne âgée de 18 ans et plus, pour laquelle un diagnostic de saignement sans douleur au premier trimestre de grossesse en phase subaiguë a été posé par le médecin traitant.
 Indications : Personne qui requiert une prise en charge pour une investigation clinique dans un délai de 24 heures.
 Conditions : Répondre aux critères d'admissibilité du service de l'accueil clinique.
 Exclusions : **Saignement après la 14^e semaine de grossesse.** Si présence d'une exclusion : Refuser la demande et aviser le médecin requérant.
 Contre-indications : **Si depuis la réception de la référence médicale : Anémie sévère : Hb < ou égale à 80 g/L; Saignement vaginal abondant (> 1 serviette sanitaire à l'heure); Douleur peu importe l'intensité; Température buccale plus grande ou égale à 38 °C; Instabilité hémodynamique : pouls > 100/min, tension artérielle < 90/50 mmHg.** Si présence de contre-indications, diriger la personne à l'urgence et aviser le médecin traitant.
 Activités réservées : Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance.

