

Professionnels habilités : Infirmière clinicienne travaillant à l'accueil clinique de l'hôpital régional du CSSS de Rimouski-Neigette  
Clientèle visée : Usager ≥ 18 ans, pour lequel un diagnostic de thrombophlébite profonde (TPP) est soupçonné par le médecin traitant  
Indications : Usager qui requiert une prise en charge pour une investigation clinique dans un délai de 24 heures.

Conditions : Répondre aux critères d'admissibilité du service de l'accueil clinique et être référé par le médecin généraliste traitant.

Si présence de contre-indications : Diriger le patient à l'urgence et aviser médecin traitant.

Contre-indications : Antécédent de thrombocytopénie induite à l'héparine(HIT); Allergie à l'héparine de faible poids moléculaire;

Si depuis la réception de la référence médicale : - T°B ≥ 38,5°C; - Dyspnée; - Tirage; - F.C. ≥ 100/min; - TA > 180/120; R.R. ≥ 22/min; - SpO<sub>2</sub> ≤ 92%; - Douleur thoracique subite; - Douleur thoracique augmentée à l'inspiration.

Activités réservées : -Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance.

Le médecin traitant doit :

- CALCULER le Score de Wells.
- L'INSCRIRE sur la demande d'inscription.

Le médecin traitant doit PRESCRIRE :


- HFPM S.C.
- Warfarine P.O.
- À Débuter dès que TPP confirmée

N.B. : SI CANCER ACTIF :  
POURSUITE DU FRAGMIN S.C.  
SANS COUMADIN,  
À MOYEN ET LONG TERME.

Le médecin traitant doit préciser la fréquence des :

- INR
- FSC
- Visites médicales

### Thrombophlébite profonde (TPP)



#### Accueil clinique

- Enseignement sur les anticoagulants
- Administration de la dose d'HFPM S.C. selon ordonnance et poids réel.
- Remise de l'ordonnance de Coumadin et précision de la dose du jour avec le carnet registre.
- Remise de l'ordonnance pour INR et FSC de Contrôle avec intervalles déterminés et fréquence des visites médicales.
- Référence aux soins courants et/ou Médecine de jour pour prise en charge le lendemain et/ou les jours suivants.

Expert interne : Dr André Blais, Hématologue - Oncologue

Durée estimée de l'épisode de soins : 72 h