

ÉCHELLE DE COMA DE GLASGOW - RÉSUMÉ

- Évalue les fonctions neurologiques **centrales**;
- Trois sphères sont évaluées :
 - Ouverture des yeux (4 points);
 - Réponse verbale (5 points);
 - Réponse motrice (6 points).
- L'appréciation se fait en 4 étapes :
 - Vérifier (facteurs extrinsèques);
 - Observer;
 - Stimuler (au besoin);
 - Évaluer (noter).

OUVERTURE DES YEUX (Y) :

- SPONTANÉE : 4
- À LA VOIX («V») : 3
- À LA PRESSION (DOULEUR) : 2
- ABSENTE : 1
- NON EVALUABLE NE

REPONSE VERBALE (V)

- ORIENTÉE : 5
- CONFUSE : 4
- MOTS (INAPPROPRIÉS) : 3
- SONS (INCOMPREHENSIBLES) : 2
- ABSENTE : 1
- NON EVALUABLE NE

MEILLEURE REPONSE MOTRICE (M)

- ORDRES SIMPLES : 6
- LOCALISE : 5
- FLEXION NORMALE (RETRAIT) A LA DOULEUR : 4
- FLEXION ANORMALE A LA DOULEUR : 3
- EXTENSION A LA DOULEUR : 2
- ABSENTE : 1
- NON EVALUABLE NE

- Dans la sphère motrice, noter la meilleure réponse (ex. : entre les 2 côtés);
- Le stimulus de pression doit être fait progressivement sur 10 secondes, distal puis central;
- Le score total minimal est de 3; maximal est de 15;
- Le résultat se documente sur chaque sphère séparée + le total : Ex. : Y4; V5; M6 = 15;



POUR L'EQTPT, UN SCORE DE 13 OU MOINS, IDENTIFIE LE PATIENT POSITIF DANS L'ÉTAPE 1.

IDENTIFICATION RAPIDE DU PATIENT AVEC GLASGOW 13 ET MOINS

« U »

« P »

« V » + confus

« A » + mots inappropriés

« A » + confus + ne répond pas aux ordres simples

SITUATIONS SPÉCIALES :

LE SCORE DE GLASGOW LE PLUS RÉCENT (AVANT LE DÉPART) DOIT ÊTRE UTILISÉ POUR L'EQTPT.

**LE PATIENT CONNU AVEC DÉMENCE/CONFUSION ET QUE LA CONFUSION EST STABLE NE DOIT PAS SE VOIR
RETIRER UN POINT POUR L'APPLICATION DE L'EQTPT.**

**LE PATIENT DONT UNE DES SPHÈRES EST NON ÉVALUABLE (NE), ET EST NON «INTERPRÉTABLE» COMME ÉTANT
14 OU 15 DOIT ÊTRE TRAITÉ COMME SI LE SCORE DE GLASGOW EST DE 13 ET MOINS DANS L'APPLICATION DE
L'EQTPT.**