

6


TRAUMATISMES NON INTENTIONNELS (TNI)

1 CONTEXTE

Les traumatismes non intentionnels (TNI), tels que les accidents d'automobiles, les noyades ou les chutes, représentent la deuxième cause de décès chez les jeunes de moins de 17 ans au Bas-Saint-Laurent. Que ce soit sur la route, à la maison ou lors de la pratique d'activités récréatives, leur caractère accidentel les différencie des traumatismes intentionnels (violence commise par autrui ou par soi-même). Si la grande majorité des TNI ne sont pas mortels, ils peuvent entraîner des conséquences, telles que des hospitalisations ou des incapacités temporaires ou à long terme. Les TNI sont ciblés comme des problèmes de santé évitables, c'est-à-dire que des efforts peuvent être mis en place pour en réduire le nombre. La sensibilisation auprès des jeunes sur les comportements dangereux au volant est un exemple de ce qui peut être fait pour limiter le nombre de TNI dans la région, comme au Québec.

Graphique 1

Taux de mortalité par traumatisme non intentionnel chez les jeunes de 0 à 17 ans, 2002-2006 à 2007-2011, Bas-Saint-Laurent et Québec




Source : MSSS, Fichier des décès, 2002-2006 et 2007-2011.

(+) : Valeur significativement supérieure à celle du Québec.

Graphique 2

Taux d'hospitalisation pour traumatisme non intentionnel chez les jeunes de 0 à 14 ans et de 15 à 19 ans selon le sexe, 2009-2014, Bas-Saint-Laurent



Source : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO, 2009-2014.

2 FAITS SAILLANTS

Mortalité par TNI chez les jeunes de 0 à 17 ans (Graphique 1)


- ♦ Au Bas-Saint-Laurent, le taux de mortalité causé par un traumatisme non intentionnel est plus élevé qu'au Québec tant pour la période 2002-2006 que pour la période 2007-2011 (graphique 1).
- ♦ Entre 2007 et 2011, chez les jeunes de 0 à 17 ans, en moyenne quatre décès par année sont causés par des TNI au Bas-Saint-Laurent (données non représentées).
- ♦ Le taux de mortalité par accident de véhicule à moteur est aussi plus élevé au Bas-Saint-Laurent qu'au Québec pour tous les groupes d'âge, notamment pour les 0 à 17 ans (données non représentées).

Hospitalisations pour TNI chez les jeunes de 0 à 17 ans (Graphiques 2 et 3)

- ♦ De 2009 à 2014, le taux d'hospitalisation pour un TNI est de 29 sur 10 000 personnes au Bas-Saint-Laurent comme au Québec (données non représentées).
- ♦ Les garçons sont, en proportion, plus nombreux que les filles à être hospitalisés pour un TNI (graphique 2).
- ♦ Bien qu'il ait tendance à diminuer au fil des ans, le taux d'hospitalisation causée par une chute connaît plusieurs variations à travers les années. Ces variations sont plus accentuées dans la région qu'au Québec (graphique 3).
- ♦ Au Bas-Saint-Laurent, le taux d'hospitalisation causée par une chute passe de 19 sur 10 000 en 2006-2007 à 10 sur 10 000 en 2011-2012. Il était de 13,5 sur 10 000 pour l'année 2013-2014 (graphique 3).
- ♦ D'un point de vue statistique, les données du Bas-Saint-Laurent ne se démarquent pas de celles de l'ensemble du Québec. (graphique 3).

Graphique 3

Taux d'hospitalisation pour chutes et chutes présumées chez les jeunes de 0 à 17 ans, 2006-2007 à 2013-2014, Bas-Saint-Laurent et Québec



Source : MSSS, Fichiers des hospitalisations MED-ÉCHO, 2006-2007 à 2013-2014.

2 FAITS SAILLANTS (SUITE)

Principales causes d'hospitalisation pour TNI

(Graphique 4)

Au Bas-Saint-Laurent, les principales causes d'hospitalisation pour traumatisme non intentionnel varient selon les groupes d'âges.

Chez les 0 à 4 ans :

- ◆ Les chutes et les chutes présumées sont responsables de 27 % des hospitalisations pour TNI.
- ◆ Les blessures d'origine récréative et sportive sont la cause de 10 % des hospitalisations pour TNI.
- ◆ Il est à noter qu'une importante part des hospitalisations a été classée sous le groupe général de «cause externe de traumatisme» (26 %) et plusieurs autres appartiennent à la catégorie «autres» qui incluent, notamment, les intoxications (8 % chez les 0 à 4 ans) et les suffocations (5 %).

Chez les 5 à 11 ans :


- ◆ Les chutes et les chutes présumées sont les principales causes d'hospitalisation pour un TNI (27 %).
- ◆ Les traumatismes d'origine récréative et sportive sont plus nombreux que chez les 0 à 4 ans, représentant près du quart (22 %) des hospitalisations.

Chez les 12 à 17 ans :

- ◆ Les traumatismes d'origine récréative et sportive sont les traumatismes les plus fréquents (27 %).
- ◆ L'importance de la part des hospitalisations pour chutes (15 %) a diminué dans ce groupe d'âge par rapport aux plus jeunes.
- ◆ Les accidents de véhicule à moteur prennent une place plus importante (7 %) que pour les autres catégories d'âge. Il en est de même pour les accidents liés à d'autres modes de transport.

Graphique 4

Répartition des hospitalisations spécifiques à une lésion traumatique non intentionnelle selon la cause et le groupe d'âge, population de 0 à 17 ans, Bas-Saint-Laurent, 2013-2014 à 2015-2016



Note : Dans la catégorie "Autres", nous retrouvons : Accident impliquant un cycliste, accident impliquant un piéton, intoxication, traumatisme non intentionnel avec corps étranger, suffocation, instrument tranchant et/ou perforant, courant électrique, brûlures et/ou incendie, machinerie, noyade, projectile d'arme à feu, explosif, froid excessif, cause non précisée de fractures par chutes présumées, autre non classé, non précisé.

Source : MSSS, MED-ECHO, 2013-2014 à 2015-2016.

Évolution de la situation depuis les années 2000

Il est difficile de déterminer si la situation en matière de TNI a évolué depuis le *Portrait jeunesse de 2002*. Toutefois, les TNI continuent de toucher davantage les garçons que les filles au Bas-Saint-Laurent. Le taux de mortalité par TNI demeure plus élevé dans la région qu'au Québec chez les jeunes de 0 à 17 ans.

3 CONSTATS

- ◆ Bien que plutôt faible, le taux de mortalité dû à un TNI en 2007-2011 est plus élevé au Bas-Saint-Laurent qu'au Québec. Le même constat s'applique au taux de mortalité pour accident de véhicule à moteur.
- ◆ Plus de garçons que de filles sont hospitalisés pour un TNI.
- ◆ Malgré plusieurs variations, le taux d'hospitalisation pour chute chez les 0 à 17 ans a tendance à diminuer au Bas-Saint-Laurent. Il demeure stable au Québec.
- ◆ Au Bas-Saint-Laurent, les causes d'hospitalisation pour TNI varient selon l'âge. Chez les catégories d'âge plus jeunes (0 à 4 ans et 5 à 11 ans), les chutes arrivent au premier rang des causes d'hospitalisation sur TNI.
- ◆ Pour les 12 à 17 ans, ce sont les activités sportives et récréatives qui sont à l'origine du plus grand nombre d'hospitalisations pour TNI.