



DT0760.20

Région Rimouski

**PROCÉDURE D'ADMINISTRATION ET DE SUIVI INFIRMIER
TAXOL® (Paclitaxel)**

Clinique d'hémato-oncologie

Date : _____

Durée approximative du 1^{er} tx : 5 h

Tx subséquents : 4 h

Vérifier auprès de l'usager s'il a pris ses deux doses de comprimés de Decadron®; soit 20 mg à 21 h la veille du traitement et à 3 h la nuit précédant le traitement

Si oui, aviser la pharmacie que l'usager est apte à recevoir son traitement

Intervention	Heure	Init.
1) Installer un soluté NaCl 0,9 % 500 ml avec un « three way » à 30 ml/h 2) Benadryl ® _____ mg + Zantac ® _____ mg (compléter à 20 ml avec NaCl 0,9%) IV sur la voie B de la pompe volumétrique 30 minutes avant le début de la perfusion de Taxol ® 3) Administrer en mode « simultané »		
ALERTE <ul style="list-style-type: none"> Placer le coffret de médication d'urgence au chevet S'assurer de la présence d'un médecin dans l'aire médicale S'assurer de la présence d'une infirmière au chevet les 15 premières minutes du début du Taxol® 		
Pouls : _____ TA : _____ / _____ Sat O ₂ : _____ %		
1) Connecter la tubulure du Taxol ® à la 2 ^e voie du « three way » 2) Retirer la tubulure du NaCl 0,9 % de la pompe et la remplacer par celle du Taxol ® 3) Clamper la tubulure du NaCl 0,9 % 4) Ouvrir la voie du « three way » du côté du Taxol ® Perfuser Taxol ® _____ mg dans 500 ml de Dextrose 5 % à 170 ml/h		
Pouls : _____ TA : _____ / _____ 15 minutes après le début du Taxol ®		
Pouls : _____ TA : _____ / _____ 1 heure après le début du Taxol ®		
Pouls : _____ TA : _____ / _____ 2 heures après le début du Taxol ®		
Pouls : _____ TA : _____ / _____ À la fin de la perfusion du Taxol ®		



