

ORDONNANCES-MÉDICAMENTS

Pharmacie - Clinique d'hémo-oncologie - Rimouski

Poids réel : _____ (kg) Poids maigre : _____ (kg) Poids de dosage : _____ (kg) Taille : _____ (cm)

Diagnostic : _____

Allergies : _____

Renseignements cliniques : _____

PROTOCOLE DE CHIMIOTHÉRAPIE

PACLITAXEL lié à l'albumine (Abraxane®) – régime q 3 semaines (Cancer métastatique du **sein** chez les patientes intolérantes au docetaxel et/ou paclitaxel)

Durée approximative : **0,5 h**

Hospitalisée

Fréquence d'administration : **q 3 sem.**

Externe

Cycle : _____ à débiter le : _____

Surface corporelle : _____ m²

A. ANTIÉMÉTIQUES PRÉCHIMIOTHÉRAPIE ET PRÉMÉDICATION (concernant l'hypersensibilité)

- **AUCUN traitement n'est requis D'EMBLÉE.**

B. CHIMIOTHÉRAPIE

- **Paclitaxel lié à l'albumine (Abraxane®) _____ mg (260 mg/m²) dans un sac vide de PVC IV à _____ ml/h (en 0,5 h).**

C. ANTIÉMÉTIQUES POSTCHIMIOTHÉRAPIE

- **Stemetil® 10 à 20 mg PO ou IR q 4-6 h si nausées ou vomissements.**

D. AUTRES

- Neupogen® _____ ug SC id X _____ jours, à débiter au Jour _____.**

SIGNATURE MÉDECIN : _____ DATE : _____

SIGNATURE PHARMACIEN : _____ DATE : _____