



PROTOCOLE DE CHIMIOTHÉRAPIE - RITUXIMAB SC

Poids réel : _____ kg Poids maigre : _____ kg Poids dosage : _____ kg Taille : _____ cm
Surface corporelle : _____ m² Diagnostic : _____
Allergies et intolérances : _____

**PROTOCOLE DE CHIMIOTHÉRAPIE
RITUXIMAB SC (2^e cycle et suivants si perfusion intraveineuse tolérée)**

- INDICATIONS**
- Lymphome non hodgkinien à grandes cellules B, CD20 positif, en association avec un protocole de chimiothérapie CHOP.
 - Lymphome non hodgkinien de type B, CD20 positif, folliculaire ou de bas grade en association avec un protocole de chimiothérapie COP.
 - Traitement d'entretien d'un lymphome non hodgkinien de bas grade ayant répondu à un traitement d'induction suite à une chimiothérapie de type CHOP ou COP.

DURÉE APPROXIMATIVE : 1,5 h

FRÉQUENCE D'ADMINISTRATION : q 3 sem (associé à CHOP ou COP) x 8 cycles maximum (incluant IV)
 q 2 mois X 12 cycles (entretien)

- PRÉCAUTIONS**
- Le Rituximab SC ne doit être utilisé que si la perfusion de Rituximab IV a pu être administrée au complet au cycle précédent.
 - Les injections doivent se faire uniquement dans la paroi abdominale.
 - L'administration des autres médicaments en sous-cutané doit se faire à un endroit différent du Rituximab SC.
 - Si une injection est interrompue, elle peut être reprise au même point ou à un point différent.

- PRÉMÉDICATION**
- Prévention des réactions reliées à l'administration du Rituximab**
- Acétaminophène (**Atasol^{MC}**) 650 mg PO 60 minutes avant le Rituximab
 - Diphenhydramine (**Bénadryl^{MC}**) 50 mg PO 60 minutes avant le Rituximab
 - Lorsque associé à CHOP ou COP : Prednisone PO 60 minutes avant le Rituximab (cette dose représente le Jour 1 de la Prednisone du CHOP ou du COP). Omettre si le Rituximab est donné en entretien.
- À considérer si donné en entretien (si antécédent de réaction sévère)**
- Dexaméthasone (**Décadron^{MC}**) 8 mg PO 60 minutes avant le Rituximab

Nom et prénom :	No de dossier
-----------------	---------------

THÉRAPIE CIBLÉE

Cycle : _____ (Incluant le Rituximab IV) le : _____

- Rituximab (**Rituxan^{MC}**) 1400 mg SC x 1 dose. Administrer en 5 minutes dans la paroi abdominale.

SURVEILLANCE DE L'INFIRMIÈRE APRÈS L'ADMINISTRATION DU RITUXIMAB SC

- **Garder au chevet** : une fiole de Diphenhydramine (Benadryl^{MC}), de Dexaméthasone (Decadron^{MC}) et une ampoule d'Adrénaline 1:1000 (1 mg/ml) pendant l'administration du Rituximab.
- Pouls et TA avant de débiter le Rituximab et à la fin de l'administration.
- Aviser le médecin si pouls inférieur à 60 ou diminution significative de la TA.
- **Si réaction allergique** : Cesser l'administration et aviser le médecin.
- **Garder l'usager sous observation** pendant 15 minutes après chaque administration SC.
- Si une chimiothérapie IV suit le Rituximab, seuls les antinauséux IV peuvent être administrés pendant la période d'observation

SIGNATURE MÉDECIN : _____ DATE (A-M-J) : _____

SIGNATURE PHARMACIEN : _____ DATE (A-M-J) : _____