

ORDONNANCES-MÉDICAMENTS

Pharmacie - Clinique d'hémato-oncologie - Rimouski

Poids réel : _____ (kg) Poids maigre : _____ (kg) Poids de dosage : _____ (kg) Taille : _____ (cm)

Diagnostic : _____

Allergies : _____

Renseignements cliniques : _____

PROTOCOLE DE CHIMIOTHÉRAPIE

TAC

(Traitement **néo-adjuvant** et **adjuvant** du cancer du sein)

Durée approximative : **2,5 h**

Hospitalisé

Externe

Fréquence d'administration : **q 3 sem. X 6 cycles**

Cycle : _____ à débiter le : _____

Surface corporelle : _____ m²

A. PROPHYLAXIE À LA DEXAMÉTHASONE (concernant le traitement de docetaxel)

- **Decadron**[®] 8 mg PO bid X par 3 doses, à débiter le jour précédant le docetaxel (Taxotere[®]), selon l'horaire suivant :

* la veille du traitement : au souper;

* le jour du traitement (Jour 1) : au déjeuner et au souper.

B. ANTIÉMÉTIQUES PRÉCHIMIOTHÉRAPIE

- **Emend**[®] 125 mg PO 60 minutes avant le début de la chimiothérapie (**Jour 1**).

- **Kytril**[®] 1 mg IV en 15 min, 30 min avant le début de la chimiothérapie.

Ativan[®] _____ mg SL avant la chimiothérapie.

C. CHIMIOTHÉRAPIE

1) **Doxorubicine** (Adriamycin[®]) _____ mg (50 mg/m²) IV lentement par la tubulure.

Remarque : jusqu'à ce jour inclusivement,

dose cumulative de doxorubicine reçue = _____ mg, i. e. _____ mg/m²

soit _____ % de la dose maximale totale (DMT) de _____ mg calculée à

_____ mg/m².

Suite au verso...

C. CHIMIOTHÉRAPIE (suite)

2) **Cyclophosphamide** (Procytox[®]) _____ mg (500 mg/m²) dans 250 ml NaCl 0,9 % IV à 500 ml/h (en 0,5 h).

Le docetaxel est administré à la clinique d'hémato-oncologie

3) **Docetaxel** (Taxotere[®]) _____ mg (75 mg/m²) dans 250 ml D5 % EXCEL IV à 250 ml/h (en 1 h), à **débuter 1 heure après la fin de la doxorubicine.**

* *Si hypersensibilité, administrer selon le débit suivant :* _____

D. SURVEILLANCE INFIRMIÈRE (concernant le traitement de **docetaxel**)

- **Garder au chevet** : une fiole de Benadryl[®], de Decadron[®] et une ampoule d'adrénaline 1 : 1000 (1 mg/ml) pendant l'administration du docetaxel (Taxotere[®]).
- Pouls et T.A. avant de débiter le docetaxel, et répéter au besoin par la suite.
- Aviser le médecin si pouls < 60 et/ou ↓ T.A. significative.
- **Si réaction allergique** :
 - Cesser la perfusion
 - Aviser le médecin
- **Garder le(la) patient(e) sous observation**, pendant une heure après la fin du premier traitement et au besoin lors des traitements subséquents s'il y a eu réaction au premier traitement.

E. ANTIÉMÉTIQUES POSTCHIMIOTHÉRAPIE

- **Emend[®]** 80 mg PO die au Jour 2 et au Jour 3.
- **Decadron[®]** 4 mg PO bid x _____ jours, à débiter au Jour 2 (à poursuivre pour un minimum de 2 jours vu l'administration de docetaxel)
- **Stemetil[®]** 10 à 20 mg PO ou IR q 4-6 h si nausées.

Autres (pour ajustement du traitement antinauséux) :

Gravelé[®] 50 mg PO ou 100 mg IR q 6 h si nausées.

Kytril[®] _____ mg PO id q 24 h X _____ jours, à débiter au Jour _____.

F. AUTRES

- **Neupogen[®]** _____ mcg SC id X _____ jours, à débiter au Jour 2.

SIGNATURE MÉDECIN : _____

DATE : _____

SIGNATURE PHARMACIEN : _____

DATE : _____