



DT0760.21

Région Rimouski

**PROCÉDURE D'ADMINISTRATION ET DE SUIVI INFIRMIER  
TCF (Taxotère® - Cisplatine - 5-FU)**

Clinique d'héмато-oncologie

Date : \_\_\_\_\_

Durée approximative : 2 h 30

Intervention	Heure	Init.
<p><b>S'assurer que l'utilisateur s'est bien hydraté selon la feuille d'hydratation et qu'il a pris ses comprimés de Decadron® soit 8 mg la veille au souper et 8 mg le matin au déjeuner</b></p> <p><b>Si oui, aviser la pharmacie que l'utilisateur est apte à recevoir son Taxotère®</b></p> <p><b>Faire uriner l'utilisateur à son arrivée</b></p> <p><b>Poursuivre le bilan ingesta excréta pour la durée du traitement</b></p> <p><b>Ce protocole s'administre avec 2 pompes volumétriques</b></p>		
<p>Installer un soluté Dextrose 5 % - NaCl 0,45 % 1 000 ml avec un « three way » à 500 ml/h</p>		
<p>Pouls : _____ TA : _____ / _____ Resp. : _____ T° : _____</p> <p>Sat O<sub>2</sub> : _____ % <b>Si 1<sup>er</sup> Taxotère® et au besoin</b></p>		
<p>Demander à l'utilisateur de mettre une paire de gants et de placer ses doigts dans un bassin de glace recouvert d'une serviette. Déposer des sacs glacés sur les orteils « Ice pack »</p>		
<p><b>ALERTE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Placer le coffret de médication d'urgence au chevet</b></li> <li>• <b>S'assurer de la présence d'un médecin dans l'aire médicale</b></li> <li>• <b>S'assurer de la présence d'une infirmière au chevet de l'utilisateur les 15 premières minutes du début du Taxotère®</b></li> </ul>		
<p>1) Placer le <b>Taxotère®</b> _____ mg sur la 2<sup>e</sup> voie du « three way »</p> <p>2) Ouvrir la voie du côté du <b>Taxotère®</b></p> <p>3) Diminuer la vitesse d'administration du Dextrose 5% - NaCl 0,45 % à 250 ml/h</p> <p>4) Administrer simultanément :</p> <p><b>Taxotère®</b> _____ mg à 250 ml/h</p> <p>Dextrose 5 % - NaCl 0,45 % à 250 ml/h</p>		
<p>1) S'assurer que le soluté et la tubulure du <b>Taxotère®</b> sont complètement vides</p> <p>2) Fermer la voie du « three-way » du côté du <b>Taxotère®</b></p> <p>3) Augmenter la vitesse d'administration du Dextrose 5 % - NaCl 0,45 % à 500 ml/h et poursuivre pour un total 1 500 ml d'hydratation, <b>Taxotère®</b> inclus</p> <p>Pouls : _____ TA : _____ / _____</p> <p>Sat O<sub>2</sub> : _____ % <b>si besoin</b></p> <p>4) Retirer les enveloppements glacés</p> <p>Pouls : _____ TA : _____ / _____</p> <p>Sat O<sub>2</sub> : _____ % <b>si besoin</b></p>		



Nom et prénom : \_\_\_\_\_

Numéro de dossier : \_\_\_\_\_

Intervention	Heure	Init.
1) <b>Emend</b> 125 mg PO 60 min avant le début de la perfusion de <b>Cisplatine</b> 2) <b>Kytril</b> ® _____ mg avec <b>Decadron</b> ® _____ mg (compléter à 20 ml avec NaCl 0,9 %) IV sur la voie B de la pompe 30 minutes avant le début du <b>Cisplatine</b> 3) Administrer en mode « simultané »		
<b>S'assurer d'un débit urinaire plus grand ou égal 100 ml/h avant de poursuivre, si non, aviser le médecin</b>		
1) Connecter <b>Cisplatine</b> _____ mg + <b>Mannitol</b> _____ g dans 1 000 ml de NaCl 0,9 % sur la voie B de la pompe à 500 ml/h 2) Administrer en mode « alterné »		
1) Terminer l'hydratation avec Dextrose 5 % NaCl - 0,45 % à 500 ml/h X 1 h puis enlever le soluté		
1) Peser l'infuseur _____ g 2) <b>Si PAC :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier la présence du retour sanguin :    <input type="checkbox"/> Oui            <input type="checkbox"/> Non</li> <li>• Irriguer avec 20 ml de NaCl 0,9 % puis brancher l'infuseur</li> </ul> <b>SI CCIVP :</b> Irriguer avec 10 ml de NaCl 0,9 % Brancher l'infuseur directement sur le cathéter 3) Fixer l'infuseur X 5 jours		
Faire uriner l'usager avant le départ		

**NOTES EN SOINS INFIRMIERS**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Complété par :				
DATE	HEURE	NOM EN LETTRES MOULÉES	SIGNATURE	INITIALES