



**PROTOCOLE DE CHIMIOTHÉRAPIE - TRASTUZUMAB  
HEBDOMADAIRE**

Poids réel : \_\_\_\_\_ kg Poids maigre : \_\_\_\_\_ kg Poids dosage : \_\_\_\_\_ kg Taille : \_\_\_\_\_ cm  
Surface corporelle : \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> Diagnostic : \_\_\_\_\_  
Allergies et intolérances : \_\_\_\_\_

**PROTOCOLE DE CHIMIOTHÉRAPIE  
TRASTUZUMAB hebdomadaire**

**INDICATIONS**

Cancer du sein métastatique

**DURÉE APPROXIMATIVE :** 0,5 h à 3,5 h

**FRÉQUENCE D'ADMINISTRATION :** q 1 sem

**PRÉCAUTIONS**

- Au cycle 1 : Si associé à une nouvelle chimiothérapie, administrer le Trastuzumab au Jour 0 et la chimiothérapie au Jour 1.
- Au cycle 1 : Si associé à une chimiothérapie déjà en cours, administrer les deux médicaments la même journée.
- **Si retard d'administration :** Dose de charge requise si retard de plus d'une semaine par rapport à la date prévue.

**PRÉMÉDICATION**

**Prévention des réactions liées à la perfusion de Trastuzumab si réaction à la perfusion précédente**

- Acétaminophène (**Atasol<sup>MC</sup>**) 650 mg PO 60 min avant le Trastuzumab.
- Diphenhydramine (**Bénadryl<sup>MC</sup>**) 25 mg IV en 15 min, 30 min avant le Trastuzumab.

**Antiémétiques pré chimiothérapie**

- Aucun n'est requis d'emblée.

**THÉRAPIE CIBLÉE****Dose de charge**

Semaine 1 à débiter le : \_\_\_\_\_

- Trastuzumab (**Herceptin<sup>MC</sup>**) : \_\_\_\_\_ mg (4 mg/kg) dans 250 ml NaCl 0.9 % IV en 1,5 heure.

**Doses d'entretien**

Semaine : \_\_\_\_\_ à débiter le : \_\_\_\_\_

- Trastuzumab (**Herceptin<sup>MC</sup>**) : \_\_\_\_\_ mg (2 mg/kg) dans 250 ml NaCl 0.9 % IV en 30 minutes.

Semaine : \_\_\_\_\_ à débiter le : \_\_\_\_\_

- Trastuzumab (**Herceptin<sup>MC</sup>**) : \_\_\_\_\_ mg (2 mg/kg) dans 250 ml NaCl 0.9 % IV en 30 minutes.

Semaine : \_\_\_\_\_ à débiter le : \_\_\_\_\_

- Trastuzumab (**Herceptin<sup>MC</sup>**) : \_\_\_\_\_ mg (2 mg/kg) dans 250 ml NaCl 0.9 % IV en 30 minutes.

**SURVEILLANCE DE L'INFIRMIÈRE POUR LA PERFUSION DE TRASTUZUMAB**

- **Garder au chevet** : une fiole de Diphenhydramine (Benadryl<sup>MC</sup>), d'Hydrocortisone (Solu-Cortef<sup>MC</sup>) et une ampoule d'Adrénaline 1 : 1000 (1 mg/ml) pendant l'administration du Trastuzumab.
- Pouls et TA avant de débiter le Trastuzumab, aux 15 minutes pour le premier traitement et au besoin par la suite.
- **Si réaction allergique** : Cesser la perfusion et aviser le médecin.
- **Garder l'usager sous observation** pendant une heure après la fin du premier traitement et au besoin lors des traitements subséquents s'il y a eu réaction au premier traitement.

SIGNATURE MÉDECIN : \_\_\_\_\_ DATE (A-M-J) : \_\_\_\_\_

SIGNATURE PHARMACIEN : \_\_\_\_\_ DATE (A-M-J) : \_\_\_\_\_