

Tableaux des doses pour la clientèle pédiatrique

Cet outil a été conçu pour sécuriser l'administration de doses de médicaments à la clientèle pédiatrique et donner une idée des doses usuelles recommandées. La clientèle visée regroupe les patients âgés de plus de 44 semaines d'âge post-conceptionnel.

Les doses ont été mises en tableau pour permettre de visualiser la posologie usuelle en mg pour un poids spécifique. Ces doses ont par la suite été transposées en quantités (ml) pour permettre de valider la quantité de médicament à administrer à l'enfant.

Les pages dont les tableaux sont vert, orange et jaune correspondent aux médicaments per os alors que les tableaux violet, blanc et bleu correspondent aux médicaments injectables. Les tableaux sont classés par ordre alphabétique du nom générique.

Il est très important de valider que le titre du tableau consulté corresponde au format et à la concentration du médicament disponible, car il peut en exister plusieurs pour un même médicament. Cet outil est complémentaire aux autres outils disponibles au personnel infirmier. La feuille d'administration des médicaments (FADM) ou l'étiquette de médicament fournie par la pharmacie reste la première source de référence lorsqu'elle est disponible. La consultation de PandaWebRx permet de retrouver les informations suivantes : comment dissoudre la fiole de médication, la concentration finale obtenue, comment rediluer le médication et son temps d'administration.

Le département de pharmacie du CISSS du Bas-St-Laurent

INDEX GLOBAL NOM GÉNÉRIQUE

NOM GÉNÉRIQUE	NOM COMMERCIAL
Acétaminophène 80 mg/ml PO	Atasol [®] , Tylenol [®]
Acétaminophène 120 mg, 160 mg, 325 mg, 650 mg IR	Atasol [®] , Tylenol [®]
Acyclovir 50 mg/ml injectable IV	Zovirax [®]
Amoxicilline 50 mg/ml PO	Amoxil [®]
Amoxicilline + Acide Clavulanique 80 mg/ml PO	Clavulin [®] bid
Ampicilline 250 mg/fiole (dilué à 100 mg/ml) injectable IV	Penbritin [®]
Ampicilline 1 000 ou 2000 mg/fiole (dilué à 250 mg/ml) injectable IV ainsi que 250, 1000 et 2000 mg/fiole (dilué à 250 mg/ml) injectable IM	Penbritin [®]
Azithromycine 40 mg/ml PO	Zithromax [®]
Cefazoline 1 000 mg/fiole (dilué 100 mg/ml) injectable IV	Ancef [®]
Cefazoline 1 000 mg/fiole (dilué 334 mg/ml) injectable IM	Ancef [®]
Cefixime 20 mg/ml PO	Suprax [®]
Cefotaxime 1 000 mg/fiole (dilué 100 mg/ml) injectable IV	Claforan [®]
Cefotaxime 1 000 mg/fiole (dilué 300 mg/ml) injectable IM	Claforan [®]
Cefoxitine 1 000 mg/fiole (dilué 100 mg/ml) injectable IV	Mefoxin [®]
Cefprozil 50 mg/ml PO	Cefzil [®]
Ceftazidime 1 000 mg et 2 000 mg/fiole (dilué 100 mg/ml) injectable IV	Fortaz [®]
Ceftazidime 1 000 mg et 2 000 mg/fiole (dilué 280 mg/ml) injectable IM	Fortaz [®]
Ceftriaxone 1 000 mg et 2000 mg (dilué 100 mg/ml) injectable IV	Rocephin [®]
Ceftriaxone 1 000 mg et 2000 mg (dilué 350 mg/ml) injectable IM	Rocephin [®]
Cefuroxime 750 mg (dilué 90 mg/ml) injectable IV	Zinacef [®]
Cefuroxime 750 mg (dilué 220 mg/ml) injectable IM	Zinacef [®]
Cephalexine 50 mg/ml PO	Keflex [®]
Clarithromycine 25 mg/ml PO	Biaxin [®]
Clindamycine 15 mg/ml PO	Dalacin [®]
Clindamycine fioles 600 mg/4 ml et 900 mg/6ml (150 mg/ml) injectable IV	Dalacin [®]
Clindamycine soluté 600 mg/50 ml (12 mg/ml) injectable IV	Dalacin [®]
Clindamycine soluté 900 mg/50 ml (18 mg/ml) injectable IV	Dalacin [®]
Cloxacilline 25 mg/ml PO	Orbenin [®]
Cloxacilline 2000 mg/fiole (100 mg/ml) injectable IV	Orbenin [®]
Cloxacilline 2000 mg/fiole (250 mg/ml) injectable IM	Orbenin [®]

INDEX GLOBAL NOM GÉNÉRIQUE

NOM GÉNÉRIQUE	NOM COMMERCIAL
Codéine sirop 5 mg/ml PO	Codéine®
Dexamethasone 1 mg/ml PO	Decadron®
Dexamethasone 4 mg/ml fiole injectable pour usage PO	Decadron®
Dimenhydrinate 50 mg/co et 25 mg/supp. IR	Gravol®
Dimenhydrinate 50 mg/ml injectable IV/IM	Gravol®
Diphenhydramine 1,25 mg/ml PO	Benadryl® sirop
Diphenhydramine 50 mg/ml injectable IV/IM	Benadryl®
Ertapenem 1000mg (dilué à 100 mg/ml) injectable IV	Invanz®
Ertapenem 1000mg (dilué à 280 mg/ml) injectable IM	Invanz®
Famotidine 10 mg/ml injectable IV	Pepcid®
Gentamicine 40 mg/ml injectable IV	Garamycine®
Hydrate de Chloral 100 mg/ml PO	Noctec®
Hydrocortisone 100mg/fiole (dilué à 50mg/ml) injectable IV	Solucortef®
Hydrocortisone 250mg/fiole (dilué à 125mg/ml) injectable IV	Solucortef®
Hydroxyzine 2 mg/ml PO	Atarax® sirop
Ibuprofen 20 mg/ml PO	Motrin®, Advil®
Ibuprofen 40 mg/ml PO	Motrin®, Advil®
Imipenem-cilastatine 500 mg/fiole (dilué 50 mg/ml) injectable IV	Primaxin®
Ketamine 50 mg/ml fiole injectable pour usage PO	Ketalar®
Ketamine 10 mg/ml injectable IV	Ketalar®
Ketamine 50 mg/ml injectable IM/SC	Ketalar®
Lorazepam 4 mg/ml injectable IV	Ativan®
Meropenem 500 mg et 1 000 mg/fiole (dilué 50 mg/ml) injectable IV	Merrem®
Methylprednisolone-succinate-sodique 40 mg/fiole (dilué 40mg/ml) inj. IV	Solu-Medrol®
Methylprednisolone-succinate-sodique 125 mg/fiole (dilué 62,5 mg/ml) inj. IV	Solu-Medrol®
Methylprednisolone-succinate-sodique 500+1000 mg/fiole (dilué 125 mg/ml) inj. IV	Solu-Medrol®
Midazolam 5 mg/ml fiole injectable pour usage PO	Versed®
Midazolam 1 mg/ml injectable IV/IM/SC	Versed®
Midazolam 5 mg/ml injectable IM/SC	Versed®
Morphine 1 mg/ml PO	Morphine® sirop
Morphine 10 mg/ml injectable SC/IM/IV	Morphine® inj.
Ondansetron 2 mg/ml fiole injectable pour usage PO	Zofran®

INDEX GLOBAL NOM GÉNÉRIQUE

NOM GÉNÉRIQUE	NOM COMMERCIAL
Ondansetron 2 mg/ml injectable IV	Zofran [®]
Oseltamivir 6 mg/ml PO	Tamiflu [®]
Phenobarbital 30 mg/ml injectable IV- Dose de charge	Phenobarbital [®]
Phenobarbital 120 mg/ml injectable IV- Dose de charge	Phenobarbital [®]
Phenytoin 50 mg/ml injectable IV- Dose de charge	Dilantin [®]
Phenytoin 50 mg/ml injectable IV- Dose d'entretien	Dilantin [®]
Piperacilline (P)-Tazobactam (T) 2000, 3000 et 4000 mg/fiole (dilué 172 mg/ml) injectable IV	Tazocin [®]
Prednisolone 1 mg/ml PO	Pediapred [®]
Ranitidine 15 mg/ml PO	Zantac [®]
Tobramycine * 40 mg/ml * injectable IV/IM	Nebcin [®]
Trimethoprim + Sulfaméthoxazole 8mgT/40mgS/ml PO	Bactrim [®] , Septra [®]
Vancomycine 1000 mg/fiole (dilué 50 mg/ml) injectable IV	Vancocin [®]

Doses d'acétaminophène PO en fonction du poids

Acétaminophène 80 mg/ml PO

Atasol[®], Tylenol[®]

Dose usuelle et dose maximale = 15 mg/kg/dose

Se référer à l'ordonnance collective en vigueur 2018-OC-INF-42

Département de pharmacie

Révisé Septembre 2019

Doses d'acétaminophène en suppositoire en fonction du poids

Acétaminophène suppositoires de 120 mg, 160 mg, 325 mg, 650 mg

Atasol[®], Tylenol[®]

Doses usuelles : environ 15 mg/kg/dose. (Dose max 20 mg/kg/dose)

Poids	mg/dose usuelle	Suppositoire	Poids	mg/dose usuelle	Suppositoire	Fréquence d'administration
1 kg	Ø*	Ø*	23 kg	345 mg	1 x 325 mg + 1 x 120 mg	q 4h max 5 doses/24 h
2 kg	Ø*	Ø*	24 kg	360 mg	1 x 325 mg + 1 x 120 mg	
3 kg	Ø*	Ø*	25 kg	375 mg	1 x 325 mg + 1 x 120 mg	
4 kg	60 mg	½ x 120 mg	26 kg	390 mg	1 x 325 mg + 1 x 120 mg	
5 kg	75 mg	½ x 120 mg	27 kg	405 mg	1 x 325 mg + 1 x 120 mg	
6 kg	90 mg	½ x 160 mg	28 kg	420 mg	1 x 325 mg + 1 x 120 mg	
7 kg	105 mg	½ X 160 mg	29 kg	435 mg	1 x 325 mg + 1 x 120 mg	
8 kg	120 mg	1 x 120 mg	30 kg	450 mg	1 x 325 mg + 1 x 160 mg	
9 kg	135 mg	1 x 120 mg	31 kg	465 mg	1 x 325 mg + 1 x 160 mg	
10 kg	150 mg	1 x 160 mg	32 kg	480 mg	1 x 325 mg + 1 x 160 mg	
11 kg	165 mg	1 x 160 mg	33 kg	495 mg	1 x 650 mg	
12 kg	180 mg	2 x 120 mg	34 kg	510 mg	1 x 650 mg	
13 kg	195 mg	2 x 120 mg	35 kg	525 mg	1 x 650 mg	
14 kg	210 mg	2 x 120 mg	36 kg	540 mg	1 x 650 mg	
15 kg	225 mg	2 x 120 mg	37 kg	555 mg	1 x 650 mg	
16 kg	240 mg	2 x 120 mg	38 kg	570 mg	1 x 650 mg	
17 kg	255 mg	1 x 325 mg	39 kg	585 mg	1 x 650 mg	
18 kg	270 mg	1 x 325 mg	40 kg	600 mg	1 x 650 mg	
19 kg	285 mg	1 x 325 mg	41 kg	615 mg	1 x 650 mg	
20 kg	300 mg	1 x 325 mg	42 kg	630 mg	1 x 650 mg	
21 kg	315 mg	1 x 325 mg	43 kg	645 mg	1 x 650 mg	
22 kg	330 mg	1 x 325 mg	44 kg	660 mg	1 x 650 mg	

* Dose à valider avec le pédiatre

Acyclovir 50 mg/ml injectable IV

Zovirax®

Dose usuelle 7,5 à 45 mg/kg/j

max. 60 mg/kg/j

Poids	mg/dose usuelle	ml/dose usuelle	mg/dose maximale	ml/dose maximale	Fréquence d'administration
2 kg	5 mg à 30 mg	0,1 ml à 0,6 ml	40 mg	0,8 ml	q8h
3 kg	7,5 mg à 45 mg	0,2 ml à 0,9 ml	60 mg	1,2 ml	
4 kg	10 mg à 60 mg	0,2 ml à 1,2 ml	80 mg	1,6 ml	
5 kg	12,5 mg à 75 mg	0,3 ml à 1,5 ml	100 mg	2 ml	
6 kg	15 mg à 90 mg	0,3 ml à 1,8 ml	120 mg	2,4 ml	
7 kg	17,5 mg à 105 mg	0,4 ml à 2,1 ml	140 mg	2,8 ml	
8 kg	20 mg à 120 mg	0,4 ml à 2,4 ml	160 mg	3,2 ml	
9 kg	22,5 mg à 135 mg	0,5 ml à 2,7 ml	180 mg	3,6 ml	
10 kg	25 mg à 150 mg	0,5 ml à 3 ml	200 mg	4 ml	
11 kg	27,5 mg à 165 mg	0,6 ml à 3,3 ml	220 mg	4,4 ml	
12 kg	30 mg à 180 mg	0,6 ml à 3,6 ml	240 mg	4,8 ml	
13 kg	32,5 mg à 195 mg	0,7 ml à 3,9 ml	260 mg	5,2 ml	
14 kg	35 mg à 210 mg	0,7 ml à 4,2 ml	280 mg	5,6 ml	
15 kg	37,5 mg à 225 mg	0,8 ml à 4,5 ml	300 mg	6 ml	
16 kg	40 mg à 240 mg	0,8 ml à 4,8 ml	320 mg	6,4 ml	
17 kg	42,5 mg à 255 mg	0,9 ml à 5,1 ml	340 mg	6,8 ml	
18 kg	45 mg à 270 mg	0,9 ml à 5,4 ml	360 mg	7,2 ml	
19 kg	47,5 mg à 285 mg	1 ml à 5,7 ml	380 mg	7,6 ml	
20 kg	50 mg à 300 mg	1 ml à 6 ml	400 mg	8 ml	
21 kg	52,5 mg à 315 mg	1,1 ml à 6,3 ml	420 mg	8,4 ml	
22 kg	55 mg à 330 mg	1,1 ml à 6,6 ml	440 mg	8,8 ml	
23 kg	57,5 mg à 345 mg	1,2 ml à 6,9 ml	460 mg	9,2 ml	
24 kg	60 mg à 360 mg	1,2 ml à 7,2 ml	480 mg	9,6 ml	
25 kg	62,5 mg à 375 mg	1,3 ml à 7,5 ml	500 mg	10 ml	
26 kg	65 mg à 390 mg	1,3 ml à 7,8 ml	520 mg	10,4 ml	
27 kg	67,5 mg à 405 mg	1,4 ml à 8,1 ml	540 mg	10,8 ml	
28 kg	70 mg à 420 mg	1,4 ml à 8,4 ml	560 mg	11,2 ml	
29 kg	72,5 mg à 435 mg	1,5 ml à 8,7 ml	580 mg	11,6 ml	
30 kg	75 mg à 450 mg	1,5 ml à 9 ml	600 mg	12 ml	

Amoxicilline 50 mg/ml PO

Amoxil®

Dose usuelle 25 à 90 mg/kg/j

max. 100 mg/kg/j

Poids	mg/dose usuelle	ml/dose usuelle	mg/dose maximale	ml/dose maximale	Fréquence d'administration
2 kg	25 mg à 90 mg	0,5 ml à 1,8 ml	100 mg	2 ml	q 12 h (ou q 8h avec ajustement des doses en conséquence) max. 4 000 mg/j
3 kg	38 mg à 135 mg	0,8 ml à 2,7 ml	150 mg	3 ml	
4 kg	50 mg à 180 mg	1 ml à 3,6 ml	200 mg	4 ml	
5 kg	63 mg à 225 mg	1,3 ml à 4,5 ml	250 mg	5 ml	
6 kg	75 mg à 270 mg	1,5 ml à 5,4 ml	300 mg	6 ml	
7 kg	88 mg à 315 mg	1,8 ml à 6,3 ml	350 mg	7 ml	
8 kg	100 mg à 360 mg	2 ml à 7,2 ml	400 mg	8 ml	
9 kg	113 mg à 405 mg	2,3 ml à 8,1 ml	450 mg	9 ml	
10 kg	125 mg à 450 mg	2,5 ml à 9 ml	500 mg	10 ml	
11 kg	138 mg à 495 mg	2,8 ml à 9,9 ml	550 mg	11 ml	
12 kg	150 mg à 540 mg	3 ml à 10,8 ml	600 mg	12 ml	
13 kg	163 mg à 585 mg	3,3 ml à 11,7 ml	650 mg	13 ml	
14 kg	175 mg à 630 mg	3,5 ml à 12,6 ml	700 mg	14 ml	
15 kg	188 mg à 675 mg	3,8 ml à 13,5 ml	750 mg	15 ml	
16 kg	200 mg à 720 mg	4 ml à 14,4 ml	800 mg	16 ml	
17 kg	213 mg à 765 mg	4,3 ml à 15,3 ml	850 mg	17 ml	
18 kg	225 mg à 810 mg	4,5 ml à 16,2 ml	900 mg	18 ml	
19 kg	238 mg à 855 mg	4,8 ml à 17,1 ml	950 mg	19 ml	
20 kg	250 mg à 900 mg	5 ml à 18 ml	1000 mg	20 ml	
21 kg	263 mg à 945 mg	5,3 ml à 18,9 ml	1050 mg	21 ml	
22 kg	275 mg à 990 mg	5,5 ml à 19,8 ml	1100 mg	22 ml	
23 kg	288 mg à 1035 mg	5,8 ml à 20,7 ml	1150 mg	23 ml	
24 kg	300 mg à 1080 mg	6 ml à 21,6 ml	1200 mg	24 ml	
25 kg	313 mg à 1125 mg	6,3 ml à 22,5 ml	1250 mg	25 ml	
26 kg	325 mg à 1170 mg	6,5 ml à 23,4 ml	1300 mg	26 ml	
27 kg	338 mg à 1215 mg	6,8 ml à 24,3 ml	1350 mg	27 ml	
28 kg	350 mg à 1260 mg	7 ml à 25,2 ml	1400 mg	28 ml	
29 kg	363 mg à 1305 mg	7,3 ml à 26,1 ml	1450 mg	29 ml	
30 kg	375 mg à 1350 mg	7,5 ml à 27 ml	1500 mg	30 ml	

Amoxicilline + Acide Clavulanique 80 mg/ml PO

Clavulin® bid

Dose usuelle 25 à 90 mg/kg/j

max. 90 mg/kg/j

Poids	mg/dose usuelle	ml/dose usuelle	mg/dose maximale	ml/dose maximale	Fréquence d'administration
2 kg	25 mg à 90 mg	0,3 ml à 1,1 ml	90 mg	1,1 ml	q 12 h (ou q 8h avec ajustement des doses en conséquence) max. 3 000 mg/j
3 kg	38 mg à 135 mg	0,5 ml à 1,7 ml	135 mg	1,7 ml	
4 kg	50 mg à 180 mg	0,6 ml à 2,3 ml	180 mg	2,3 ml	
5 kg	63 mg à 225 mg	0,8 ml à 2,8 ml	225 mg	2,8 ml	
6 kg	75 mg à 270 mg	0,9 ml à 3,4 ml	270 mg	3,4 ml	
7 kg	88 mg à 315 mg	1,1 ml à 3,9 ml	315 mg	3,9 ml	
8 kg	100 mg à 360 mg	1,3 ml à 4,5 ml	360 mg	4,5 ml	
9 kg	113 mg à 405 mg	1,4 ml à 5,1 ml	405 mg	5,1 ml	
10 kg	125 mg à 450 mg	1,6 ml à 5,6 ml	450 mg	5,6 ml	
11 kg	138 mg à 495 mg	1,7 ml à 6,2 ml	495 mg	6,2 ml	
12 kg	150 mg à 540 mg	1,9 ml à 6,8 ml	540 mg	6,8 ml	
13 kg	163 mg à 585 mg	2 ml à 7,3 ml	585 mg	7,3 ml	
14 kg	175 mg à 630 mg	2,2 ml à 7,9 ml	630 mg	7,9 ml	
15 kg	188 mg à 675 mg	2,3 ml à 8,4 ml	675 mg	8,4 ml	
16 kg	200 mg à 720 mg	2,5 ml à 9 ml	720 mg	9 ml	
17 kg	213 mg à 765 mg	2,7 ml à 9,6 ml	765 mg	9,6 ml	
18 kg	225 mg à 810 mg	2,8 ml à 10,1 ml	810 mg	10,1 ml	
19 kg	238 mg à 855 mg	3 ml à 10,7 ml	855 mg	10,7 ml	
20 kg	250 mg à 900 mg	3,1 ml à 11,3 ml	900 mg	11,3 ml	
21 kg	263 mg à 945 mg	3,3 ml à 11,8 ml	945 mg	11,8 ml	
22 kg	275 mg à 990 mg	3,4 ml à 12,4 ml	990 mg	12,4 ml	
23 kg	288 mg à 1035 mg	3,6 ml à 12,9 ml	1035 mg	12,9 ml	
24 kg	300 mg à 1080 mg	3,8 ml à 13,5 ml	1080 mg	13,5 ml	
25 kg	313 mg à 1125 mg	3,9 ml à 14,1 ml	1125 mg	14,1 ml	
26 kg	325 mg à 1170 mg	4,1 ml à 14,6 ml	1170 mg	14,6 ml	
27 kg	338 mg à 1215 mg	4,2 ml à 15,2 ml	1215 mg	15,2 ml	
28 kg	350 mg à 1260 mg	4,4 ml à 15,8 ml	1260 mg	15,8 ml	
29 kg	363 mg à 1305 mg	4,5 ml à 16,3 ml	1305 mg	16,3 ml	
30 kg	375 mg à 1350 mg	4,7 ml à 16,9 ml	1350 mg	16,9 ml	

Ampicilline 250 mg/ fiole (dilué à 100 mg/ml) injectable IV

Penbritin®

Dose usuelle 100-200 mg/kg/j

max. 400 mg/kg/j

Poids	mg/dose usuelle	ml/dose usuelle	mg/dose maximale	ml/dose maximale	Fréquence d'administration
2 kg	50 mg* à 100 mg*	0,5 ml à 1 ml	200 mg*	2 ml	q 6 h max. 12 g/24 h
3 kg	75 mg* à 150 mg*	0,8 ml à 1,5 ml	300 mg	3 ml	
4 kg	100 mg* à 200 mg*	1 ml à 2 ml	400 mg	4 ml	
5 kg	125 mg* à 250 mg*	1,3 ml à 2,5 ml	500 mg	5 ml	
6 kg	150 mg* à 300 mg	1,5 ml à 3 ml	600 mg	6 ml	
7 kg	175 mg* à 350 mg	1,8 ml à 3,5 ml	700 mg	7 ml	
8 kg	200 mg* à 400 mg	2 ml à 4 ml	800 mg	8 ml	
9 kg	225 mg* à 450 mg	2,3 ml à 4,5 ml	900 mg	9 ml	
10 kg	250 mg* à 500 mg	2,5 ml à 5 ml	1000 mg	10 ml	
11 kg	275 mg à 550 mg	2,8 ml à 5,5 ml	1100 mg	11 ml	
12 kg	300 mg à 600 mg	3,0 ml à 6 ml	1200 mg	12 ml	
13 kg	325 mg à 650 mg	3,3 ml à 6,5 ml	1300 mg	13 ml	
14 kg	350 mg à 700 mg	3,5 ml à 7 ml	1400 mg	14 ml	
15 kg	375 mg à 750 mg	3,8 ml à 7,5 ml	1500 mg	15 ml	
16 kg	400 mg à 800 mg	4 ml à 8 ml	1600 mg	16 ml	
17 kg	425 mg à 850 mg	4,3 ml à 8,5 ml	1700 mg	17 ml	
18 kg	450 mg à 900 mg	4,5 ml à 9 ml	1800 mg	18 ml	
19 kg	475 mg à 950 mg	4,8 ml à 9,5 ml	1900 mg	19 ml	
20 kg	500 mg à 1000 mg	5 ml à 10 ml	2000 mg	20 ml	
21 kg	525 mg à 1050 mg	5,3 ml à 10,5 ml	2100 mg	21 ml	
22 kg	550 mg à 1100 mg	5,5 ml à 11 ml	2200 mg	22 ml	
23 kg	575 mg à 1150 mg	5,8 ml à 11,5 ml	2300 mg	23 ml	
24 kg	600 mg à 1200 mg	6 ml à 12 ml	2400 mg	24 ml	
25 kg	625 mg à 1250 mg	6,3 ml à 12,5 ml	2500 mg	25 ml	
26 kg	650 mg à 1300 mg	6,5 ml à 13 ml	2600 mg	26 ml	
27 kg	675 mg à 1350 mg	6,8 ml à 13,5 ml	2700 mg	27 ml	
28 kg	700 mg à 1400 mg	7 ml à 14 ml	2800 mg	28 ml	
29 kg	725 mg à 1450 mg	7,3 ml à 14,5 ml	2900 mg	29 ml	
30 kg	750 mg à 1500 mg	7,5 ml à 15 ml	3000 mg	30 ml	

* Pour doses de plus de 250 mg, utiliser préférablement les fioles de 1000 ou 2000 mg

Ampicilline 1000 et 2000 mg/ fiole (dilué à 250 mg/ml) injectable IV
ainsi que 250, 1000 et 2000 mg/ fiole (dilué à 250 mg/ml) injectable IM

Penbritin®

Dose usuelle 100-200 mg/kg/j

max. 400 mg/kg/j

Poids	mg/dose usuelle	ml/dose usuelle	mg/dose maximale	ml/dose maximale	Fréquence d'administration
2 kg	50 mg* à 100 mg*	0,2 ml à 0,4 ml	200 mg*	0,8 ml	q 6 h max. 12 g/24 h
3 kg	75 mg* à 150 mg*	0,3 ml à 0,6 ml	300 mg	1,2 ml	
4 kg	100 mg* à 200 mg*	0,4 ml à 0,8 ml	400 mg	1,6 ml	
5 kg	125 mg* à 250 mg*	0,5 ml à 1 ml	500 mg	2 ml	
6 kg	150 mg* à 300 mg	0,6 ml à 1,2 ml	600 mg	2,4 ml	
7 kg	175 mg* à 350 mg	0,7 ml à 1,4 ml	700 mg	2,8 ml	
8 kg	200 mg* à 400 mg	0,8 ml à 1,6 ml	800 mg	3,2 ml	
9 kg	225 mg* à 450 mg	0,9 ml à 1,8 ml	900 mg	3,6 ml	
10 kg	250 mg* à 500 mg	1 ml à 2 ml	1000 mg	4 ml	
11 kg	275 mg à 550 mg	1,1 ml à 2,2 ml	1100 mg	4,4 ml	
12 kg	300 mg à 600 mg	1,2 ml à 2,4 ml	1200 mg	4,8 ml	
13 kg	325 mg à 650 mg	1,3 ml à 2,6 ml	1300 mg	5,2 ml	
14 kg	350 mg à 700 mg	1,4 ml à 2,8 ml	1400 mg	5,6 ml	
15 kg	375 mg à 750 mg	1,5 ml à 3 ml	1500 mg	6 ml	
16 kg	400 mg à 800 mg	1,6 ml à 3,2 ml	1600 mg	6,4 ml	
17 kg	425 mg à 850 mg	1,7 ml à 3,4 ml	1700 mg	6,8 ml	
18 kg	450 mg à 900 mg	1,8 ml à 3,6 ml	1800 mg	7,2 ml	
19 kg	475 mg à 950 mg	1,9 ml à 3,8 ml	1900 mg	7,6 ml	
20 kg	500 mg à 1000 mg	2 ml à 4 ml	2000 mg	8 ml	
21 kg	525 mg à 1050 mg	2,1 ml à 4,2 ml	2100 mg	8,4 ml	
22 kg	550 mg à 1100 mg	2,2 ml à 4,4 ml	2200 mg	8,8 ml	
23 kg	575 mg à 1150 mg	2,3 ml à 4,6 ml	2300 mg	9,2 ml	
24 kg	600 mg à 1200 mg	2,4 ml à 4,8 ml	2400 mg	9,6 ml	
25 kg	625 mg à 1250 mg	2,5 ml à 5 ml	2500 mg	10 ml	
26 kg	650 mg à 1300 mg	2,6 ml à 5,2 ml	2600 mg	10,4 ml	
27 kg	675 mg à 1350 mg	2,7 ml à 5,4 ml	2700 mg	10,8 ml	
28 kg	700 mg à 1400 mg	2,8 ml à 5,6 ml	2800 mg	11,2 ml	
29 kg	725 mg à 1450 mg	2,9 ml à 5,8 ml	2900 mg	11,6 ml	
30 kg	750 mg à 1500 mg	3 ml à 6 ml	3000 mg	12 ml	

* Pour doses de 250 mg et moins, utiliser préférentiellement les fioles de 250 mg

Azithromycine 40 mg/ml PO

Zithromax®

Dose usuelle 5 à 12 mg/kg/j

max. 30 mg/kg/j

Dose unique pour

otite moyenne aigue seulement

Poids	mg/dose usuelle	ml/dose usuelle	mg/dose maximale	ml/dose maximale	Fréquence d'administration
2 kg	10 mg à 24 mg	0,3 ml à 0,6 ml	60 mg	1,5 ml	q 24 h
3 kg	15 mg à 36 mg	0,4 ml à 0,9 ml	90 mg	2,3 ml	
4 kg	20 mg à 48 mg	0,5 ml à 1,2 ml	120 mg	3 ml	
5 kg	25 mg à 60 mg	0,6 ml à 1,5 ml	150 mg	3,8 ml	
6 kg	30 mg à 72 mg	0,8 ml à 1,8 ml	180 mg	4,5 ml	
7 kg	35 mg à 84 mg	0,9 ml à 2,1 ml	210 mg	5,3 ml	
8 kg	40 mg à 96 mg	1 ml à 2,4 ml	240 mg	6 ml	
9 kg	45 mg à 108 mg	1,1 ml à 2,7 ml	270 mg	6,8 ml	
10 kg	50 mg à 120 mg	1,3 ml à 3 ml	300 mg	7,5 ml	
11 kg	55 mg à 132 mg	1,4 ml à 3,3 ml	330 mg	8,3 ml	
12 kg	60 mg à 144 mg	1,5 ml à 3,6 ml	360 mg	9 ml	
13 kg	65 mg à 156 mg	1,6 ml à 3,9 ml	390 mg	9,8 ml	
14 kg	70 mg à 168 mg	1,8 ml à 4,2 ml	420 mg	10,5 ml	
15 kg	75 mg à 180 mg	1,9 ml à 4,5 ml	450 mg	11,3 ml	
16 kg	80 mg à 192 mg	2 ml à 4,8 ml	480 mg	12 ml	
17 kg	85 mg à 204 mg	2,1 ml à 5,1 ml	510 mg	12,8 ml	
18 kg	90 mg à 216 mg	2,3 ml à 5,4 ml	540 mg	13,5 ml	
19 kg	95 mg à 228 mg	2,4 ml à 5,7 ml	570 mg	14,3 ml	
20 kg	100 mg à 240 mg	2,5 ml à 6 ml	600 mg	15 ml	
21 kg	105 mg à 252 mg	2,6 ml à 6,3 ml	630 mg	15,8 ml	
22 kg	110 mg à 264 mg	2,8 ml à 6,6 ml	660 mg	16,5 ml	
23 kg	115 mg à 276 mg	2,9 ml à 6,9 ml	690 mg	17,3 ml	
24 kg	120 mg à 288 mg	3 ml à 7,2 ml	720 mg	18 ml	
25 kg	125 mg à 300 mg	3,1 ml à 7,5 ml	750 mg	18,8 ml	
26 kg	130 mg à 312 mg	3,3 ml à 7,8 ml	780 mg	19,5 ml	
27 kg	135 mg à 324 mg	3,4 ml à 8,1 ml	810 mg	20,3 ml	
28 kg	140 mg à 336 mg	3,5 ml à 8,4 ml	840 mg	21 ml	
29 kg	145 mg à 348 mg	3,6 ml à 8,7 ml	870 mg	21,8 ml	
30 kg	150 mg à 360 mg	3,8 ml à 9 ml	900 mg	22,5 ml	

Commentaires : Dose la plus courante = Jour 1 = 10 mg/kg X 1 dose
Jours 2-5 = 5 mg/kg q 24 h

Cefazoline 1000 mg/fiole (dilué 100 mg/ml) injectable IV

Ancef®

Dose usuelle 50 à 100 mg/kg/j

max. 150 mg/kg/j

Poids	mg/dose usuelle	ml/dose usuelle	mg/dose maximale	ml/dose maximale	Fréquence d'administration
2 kg	33 mg à 67 mg	0,3 ml à 0,7 ml	100 mg	1 ml	q 8 h max. 6 g/j
3 kg	50 mg à 100 mg	0,5 ml à 1 ml	150 mg	1,5 ml	
4 kg	67 mg à 133 mg	0,7 ml à 1,3 ml	200 mg	2 ml	
5 kg	83 mg à 167 mg	0,8 ml à 1,7 ml	250 mg	2,5 ml	
6 kg	100 mg à 200 mg	1 ml à 2 ml	300 mg	3 ml	
7 kg	117 mg à 233 mg	1,2 ml à 2,3 ml	350 mg	3,5 ml	
8 kg	133 mg à 267 mg	1,3 ml à 2,7 ml	400 mg	4 ml	
9 kg	150 mg à 300 mg	1,5 ml à 3 ml	450 mg	4,5 ml	
10 kg	167 mg à 333 mg	1,7 ml à 3,3 ml	500 mg	5 ml	
11 kg	183 mg à 367 mg	1,8 ml à 3,7 ml	550 mg	5,5 ml	
12 kg	200 mg à 400 mg	2 ml à 4 ml	600 mg	6 ml	
13 kg	217 mg à 433 mg	2,2 ml à 4,3 ml	650 mg	6,5 ml	
14 kg	233 mg à 467 mg	2,3 ml à 4,7 ml	700 mg	7 ml	
15 kg	250 mg à 500 mg	2,5 ml à 5 ml	750 mg	7,5 ml	
16 kg	267 mg à 533 mg	2,7 ml à 5,3 ml	800 mg	8 ml	
17 kg	283 mg à 567 mg	2,8 ml à 5,7 ml	850 mg	8,5 ml	
18 kg	300 mg à 600 mg	3 ml à 6 ml	900 mg	9 ml	
19 kg	317 mg à 633 mg	3,2 ml à 6,3 ml	950 mg	9,5 ml	
20 kg	333 mg à 667 mg	3,3 ml à 6,7 ml	1000 mg	10 ml	
21 kg	350 mg à 700 mg	3,5 ml à 7 ml	1050 mg	10,5 ml	
22 kg	367 mg à 733 mg	3,7 ml à 7,3 ml	1100 mg	11 ml	
23 kg	383 mg à 767 mg	3,8 ml à 7,7 ml	1150 mg	11,5 ml	
24 kg	400 mg à 800 mg	4 ml à 8 ml	1200 mg	12 ml	
25 kg	417 mg à 833 mg	4,2 ml à 8,3 ml	1250 mg	12,5 ml	
26 kg	433 mg à 867 mg	4,3 ml à 8,7 ml	1300 mg	13 ml	
27 kg	450 mg à 900 mg	4,5 ml à 9 ml	1350 mg	13,5 ml	
28 kg	467 mg à 933 mg	4,7 ml à 9,3 ml	1400 mg	14 ml	
29 kg	483 mg à 967 mg	4,8 ml à 9,7 ml	1450 mg	14,5 ml	
30 kg	500 mg à 1000 mg	5 ml à 10 ml	1500 mg	15 ml	

Cefazoline 1000 mg/ fiole (dilué 334 mg/ml) injectable IM

Ancef®

Dose usuelle 50 à 100 mg/kg/j

max. 150 mg/kg/j

Poids	mg/dose usuelle	ml/dose usuelle	mg/dose maximale	ml/dose maximale	Fréquence d'administration
2 kg	33 mg à 67 mg	0,1 ml à 0,2 ml	100 mg	0,3 ml	q 8 h max. 6 g/j
3 kg	50 mg à 100 mg	0,15 ml à 0,3 ml	150 mg	0,45 ml	
4 kg	67 mg à 133 mg	0,2 ml à 0,4 ml	200 mg	0,6 ml	
5 kg	83 mg à 167 mg	0,25 ml à 0,5 ml	250 mg	0,75 ml	
6 kg	100 mg à 200 mg	0,3 ml à 0,6 ml	300 mg	0,9 ml	
7 kg	117 mg à 233 mg	0,35 ml à 0,7 ml	350 mg	1 ml	
8 kg	133 mg à 267 mg	0,4 ml à 0,8 ml	400 mg	1,2 ml	
9 kg	150 mg à 300 mg	0,45 ml à 0,9 ml	450 mg	1,3 ml	
10 kg	167 mg à 333 mg	0,5 ml à 1 ml	500 mg	1,5 ml	
11 kg	183 mg à 367 mg	0,55 ml à 1,1 ml	550 mg	1,6 ml	
12 kg	200 mg à 400 mg	0,6 ml à 1,2 ml	600 mg	1,8 ml	
13 kg	217 mg à 433 mg	0,65 ml à 1,3 ml	650 mg	1,9 ml	
14 kg	233 mg à 467 mg	0,7 ml à 1,4 ml	700 mg	2,1 ml	
15 kg	250 mg à 500 mg	0,75 ml à 1,5 ml	750 mg	2,2 ml	
16 kg	267 mg à 533 mg	0,8 ml à 1,6 ml	800 mg	2,4 ml	
17 kg	283 mg à 567 mg	0,85 ml à 1,7 ml	850 mg	2,5 ml	
18 kg	300 mg à 600 mg	0,9 ml à 1,8 ml	900 mg	2,7 ml	
19 kg	317 mg à 633 mg	0,95 ml à 1,9 ml	950 mg	2,8 ml	
20 kg	333 mg à 667 mg	1 ml à 2 ml	1000 mg	3 ml	
21 kg	350 mg à 700 mg	1,05 ml à 2,1 ml	1050 mg	3,1 ml	
22 kg	367 mg à 733 mg	1,1 ml à 2,2 ml	1100 mg	3,3 ml	
23 kg	383 mg à 767 mg	1,15 ml à 2,3 ml	1150 mg	3,4 ml	
24 kg	400 mg à 800 mg	1,2 ml à 2,4 ml	1200 mg	3,6 ml	
25 kg	417 mg à 833 mg	1,25 ml à 2,5 ml	1250 mg	3,7 ml	
26 kg	433 mg à 867 mg	1,3 ml à 2,6 ml	1300 mg	3,9 ml	
27 kg	450 mg à 900 mg	1,35 ml à 2,7 ml	1350 mg	4 ml	
28 kg	467 mg à 933 mg	1,4 ml à 2,8 ml	1400 mg	4,2 ml	
29 kg	483 mg à 967 mg	1,45 ml à 2,9 ml	1450 mg	4,3 ml	
30 kg	500 mg à 1000 mg	1,5 ml à 3 ml	1500 mg	4,5 ml	

Cefixime 20 mg/ml PO

Suprax[®]

Dose de charge :

Dose usuelle 8 mg/kg/j

à débiter après la dose de charge

16 mg/kg/j divisée en 2 doses x 1 jour

↳ Infection urinaire aiguë seulement

Poids	mg/dose usuelle	ml/dose usuelle	Fréquence d'administration
2 kg	16 mg	0,8 ml	q 24 h max. 400 mg/jour
3 kg	24 mg	1,2 ml	
4 kg	32 mg	1,6 ml	
5 kg	40 mg	2 ml	
6 kg	48 mg	2,4 ml	
7 kg	56 mg	2,8 ml	
8 kg	64 mg	3,2 ml	
9 kg	72 mg	3,6 ml	
10 kg	80 mg	4 ml	
11 kg	88 mg	4,4 ml	
12 kg	96 mg	4,8 ml	
13 kg	104 mg	5,2 ml	
14 kg	112 mg	5,6 ml	
15 kg	120 mg	6 ml	
16 kg	128 mg	6,4 ml	
17 kg	136 mg	6,8 ml	
18 kg	144 mg	7,2 ml	
19 kg	152 mg	7,6 ml	
20 kg	160 mg	8 ml	
21 kg	168 mg	8,4 ml	
22 kg	176 mg	8,8 ml	
23 kg	184 mg	9,2 ml	
24 kg	192 mg	9,6 ml	
25 kg	200 mg	10 ml	
26 kg	208 mg	10,4 ml	
27 kg	216 mg	10,8 ml	
28 kg	224 mg	11,2 ml	
29 kg	232 mg	11,6 ml	
30 kg	240 mg	12 ml	

mg/dose maximale	ml/dose maximale	Fréquence d'administration
16 mg	0,8 ml	q 12 h max. 400 mg/jour
24 mg	1,2 ml	
32 mg	1,6 ml	
40 mg	2 ml	
48 mg	2,4 ml	
56 mg	2,8 ml	
64 mg	3,2 ml	
72 mg	3,6 ml	
80 mg	4 ml	
88 mg	4,4 ml	
96 mg	4,8 ml	
104 mg	5,2 ml	
112 mg	5,6 ml	
120 mg	6 ml	
128 mg	6,4 ml	
136 mg	6,8 ml	
144 mg	7,2 ml	
152 mg	7,6 ml	
160 mg	8 ml	
168 mg	8,4 ml	
176 mg	8,8 ml	
184 mg	9,2 ml	
192 mg	9,6 ml	
200 mg	10 ml	
200 mg	10 ml	
200 mg	10 ml	
200 mg	10 ml	
200 mg	10 ml	
200 mg	10 ml	

Cefotaxime 1000 mg/fiole (dilué à 100 mg/ml) injectable IV

Claforan[®]

Dose usuelle 100 mg à 200 mg/kg/j

max. 300 mg/kg/j

Poids	mg/dose usuelle	ml/dose usuelle	mg/dose maximale	ml/dose maximale	Fréquence d'administration
2 kg	67 mg à 133 mg	0,7 ml à 1,3 ml	200 mg	2 ml	q 8 h max. 12 g/j
3 kg	100 mg à 200 mg	1 ml à 2 ml	300 mg	3 ml	
4 kg	133 mg à 267 mg	1,3 ml à 2,7 ml	400 mg	4 ml	
5 kg	167 mg à 333 mg	1,7 ml à 3,3 ml	500 mg	5 ml	
6 kg	200 mg à 400 mg	2 ml à 4 ml	600 mg	6 ml	
7 kg	233 mg à 467 mg	2,3 ml à 4,7 ml	700 mg	7 ml	
8 kg	267 mg à 533 mg	2,7 ml à 5,3 ml	800 mg	8 ml	
9 kg	300 mg à 600 mg	3 ml à 6 ml	900 mg	9 ml	
10 kg	333 mg à 667 mg	3,3 ml à 6,7 ml	1000 mg	10 ml	
11 kg	367 mg à 733 mg	3,7 ml à 7,3 ml	1100 mg	11 ml	
12 kg	400 mg à 800 mg	4 ml à 8 ml	1200 mg	12 ml	
13 kg	433 mg à 867 mg	4,3 ml à 8,7 ml	1300 mg	13 ml	
14 kg	467 mg à 933 mg	4,7 ml à 9,3 ml	1400 mg	14 ml	
15 kg	500 mg à 1000 mg	5 ml à 10 ml	1500 mg	15 ml	
16 kg	533 mg à 1067 mg	5,3 ml à 10,7 ml	1600 mg	16 ml	
17 kg	567 mg à 1133 mg	5,7 ml à 11,3 ml	1700 mg	17 ml	
18 kg	600 mg à 1200 mg	6 ml à 12 ml	1800 mg	18 ml	
19 kg	633 mg à 1267 mg	6,3 ml à 12,7 ml	1900 mg	19 ml	
20 kg	667 mg à 1333 mg	6,7 ml à 13,3 ml	2000 mg	20 ml	
21 kg	700 mg à 1400 mg	7 ml à 14 ml	2100 mg	21 ml	
22 kg	733 mg à 1467 mg	7,3 ml à 14,7 ml	2200 mg	22 ml	
23 kg	767 mg à 1533 mg	7,7 ml à 15,3 ml	2300 mg	23 ml	
24 kg	800 mg à 1600 mg	8 ml à 16 ml	2400 mg	24 ml	
25 kg	833 mg à 1667 mg	8,3 ml à 16,7 ml	2500 mg	25 ml	
26 kg	867 mg à 1733 mg	8,7 ml à 17,3 ml	2600 mg	26 ml	
27 kg	900 mg à 1800 mg	9 ml à 18 ml	2700 mg	27 ml	
28 kg	933 mg à 1867 mg	9,3 ml à 18,7 ml	2800 mg	28 ml	
29 kg	967 mg à 1933 mg	9,7 ml à 19,3 ml	2900 mg	29 ml	
30 kg	1000 mg à 2000 mg	10 ml à 20 ml	3000 mg	30 ml	

Cefotaxime 1000 mg/fiole (dilué à 300 mg/ml) injectable IM

Claforan[®]

Dose usuelle 100 mg à 200 mg/kg/j

max. 300 mg/kg/j

Poids	mg/dose usuelle	ml/dose usuelle	mg/dose maximale	ml/dose maximale	Fréquence d'administration
2 kg	67 mg à 133 mg	0,22 ml à 0,44 ml	200 mg	0,7 ml	q 8 h max. 12 g/j
3 kg	100 mg à 200 mg	0,33 ml à 0,67 ml	300 mg	1 ml	
4 kg	133 mg à 267 mg	0,44 ml à 0,89 ml	400 mg	1,3 ml	
5 kg	167 mg à 333 mg	0,56 ml à 1,1 ml	500 mg	1,7 ml	
6 kg	200 mg à 400 mg	0,67 ml à 1,3 ml	600 mg	2 ml	
7 kg	233 mg à 467 mg	0,78 ml à 1,6 ml	700 mg	2,3 ml	
8 kg	267 mg à 533 mg	0,89 ml à 1,8 ml	800 mg	2,7 ml	
9 kg	300 mg à 600 mg	1 ml à 2 ml	900 mg	3 ml	
10 kg	333 mg à 667 mg	1,1 ml à 2,2 ml	1000 mg	3,3 ml	
11 kg	367 mg à 733 mg	1,2 ml à 2,4 ml	1100 mg	3,7 ml	
12 kg	400 mg à 800 mg	1,3 ml à 2,7 ml	1200 mg	4 ml	
13 kg	433 mg à 867 mg	1,4 ml à 2,9 ml	1300 mg	4,3 ml	
14 kg	467 mg à 933 mg	1,6 ml à 3,1 ml	1400 mg	4,7 ml	
15 kg	500 mg à 1000 mg	1,7 ml à 3,3 ml	1500 mg	5 ml	
16 kg	533 mg à 1067 mg	1,8 ml à 3,6 ml	1600 mg	5,3 ml	
17 kg	567 mg à 1133 mg	1,9 ml à 3,8 ml	1700 mg	5,7 ml	
18 kg	600 mg à 1200 mg	2 ml à 4 ml	1800 mg	6 ml	
19 kg	633 mg à 1267 mg	2,1 ml à 4,2 ml	1900 mg	6,3 ml	
20 kg	667 mg à 1333 mg	2,2 ml à 4,4 ml	2000 mg	6,7 ml	
21 kg	700 mg à 1400 mg	2,3 ml à 4,7 ml	2100 mg	7 ml	
22 kg	733 mg à 1467 mg	2,4 ml à 4,9 ml	2200 mg	7,3 ml	
23 kg	767 mg à 1533 mg	2,6 ml à 5,1 ml	2300 mg	7,7 ml	
24 kg	800 mg à 1600 mg	2,7 ml à 5,3 ml	2400 mg	8 ml	
25 kg	833 mg à 1667 mg	2,8 ml à 5,6 ml	2500 mg	8,3 ml	
26 kg	867 mg à 1733 mg	2,9 ml à 5,8 ml	2600 mg	8,7 ml	
27 kg	900 mg à 1800 mg	3 ml à 6 ml	2700 mg	9 ml	
28 kg	933 mg à 1867 mg	3,1 ml à 6,2 ml	2800 mg	9,3 ml	
29 kg	967 mg à 1933 mg	3,2 ml à 6,4 ml	2900 mg	9,7 ml	
30 kg	1000 mg à 2000 mg	3,3 ml à 6,7 ml	3000 mg	10 ml	

Cefoxitine 1000 mg/fiole (dilué 100 mg/ml) injectable IV

Mefoxin[®]

Dose usuelle 80 à 100 mg/kg/j

max. 160 mg/kg/j

Poids	mg/dose usuelle	ml/dose usuelle	mg/dose maximale	ml/dose maximale	Fréquence d'administration
2 kg	40 mg à 50 mg	0,4 ml à 0,5 ml	80 mg	0,8 ml	q 6 h max. 12 g/j
3 kg	60 mg à 75 mg	0,6 ml à 0,8 ml	120 mg	1,2 ml	
4 kg	80 mg à 100 mg	0,8 ml à 1 ml	160 mg	1,6 ml	
5 kg	100 mg à 125 mg	1 ml à 1,3 ml	200 mg	2 ml	
6 kg	120 mg à 150 mg	1,2 ml à 1,5 ml	240 mg	2,4 ml	
7 kg	140 mg à 175 mg	1,4 ml à 1,8 ml	280 mg	2,8 ml	
8 kg	160 mg à 200 mg	1,6 ml à 2 ml	320 mg	3,2 ml	
9 kg	180 mg à 225 mg	1,8 ml à 2,3 ml	360 mg	3,6 ml	
10 kg	200 mg à 250 mg	2 ml à 2,5 ml	400 mg	4 ml	
11 kg	220 mg à 275 mg	2,2 ml à 2,8 ml	440 mg	4,4 ml	
12 kg	240 mg à 300 mg	2,4 ml à 3 ml	480 mg	4,8 ml	
13 kg	260 mg à 325 mg	2,6 ml à 3,3 ml	520 mg	5,2 ml	
14 kg	280 mg à 350 mg	2,8 ml à 3,5 ml	560 mg	5,6 ml	
15 kg	300 mg à 375 mg	3 ml à 3,8 ml	600 mg	6 ml	
16 kg	320 mg à 400 mg	3,2 ml à 4 ml	640 mg	6,4 ml	
17 kg	340 mg à 425 mg	3,4 ml à 4,3 ml	680 mg	6,8 ml	
18 kg	360 mg à 450 mg	3,6 ml à 4,5 ml	720 mg	7,2 ml	
19 kg	380 mg à 475 mg	3,8 ml à 4,8 ml	760 mg	7,6 ml	
20 kg	400 mg à 500 mg	4 ml à 5 ml	800 mg	8 ml	
21 kg	420 mg à 525 mg	4,2 ml à 5,3 ml	840 mg	8,4 ml	
22 kg	440 mg à 550 mg	4,4 ml à 5,5 ml	880 mg	8,8 ml	
23 kg	460 mg à 575 mg	4,6 ml à 5,8 ml	920 mg	9,2 ml	
24 kg	480 mg à 600 mg	4,8 ml à 6 ml	960 mg	9,6 ml	
25 kg	500 mg à 625 mg	5 ml à 6,3 ml	1000 mg	10 ml	
26 kg	520 mg à 650 mg	5,2 ml à 6,5 ml	1040 mg	10,4 ml	
27 kg	540 mg à 675 mg	5,4 ml à 6,8 ml	1080 mg	10,8 ml	
28 kg	560 mg à 700 mg	5,6 ml à 7 ml	1120 mg	11,2 ml	
29 kg	580 mg à 725 mg	5,8 ml à 7,3 ml	1160 mg	11,6 ml	
30 kg	600 mg à 750 mg	6 ml à 7,5 ml	1200 mg	12 ml	

Cefprozil 50 mg/ml PO

Cefzil®

Dose usuelle 15 à 30 mg/kg/j

max. 30 mg/kg/j

Poids	mg/dose usuelle	ml/dose usuelle	mg/dose maximale	ml/dose maximale	Fréquence d'administration
2 kg	15 mg à 30 mg	0,3 ml à 0,6 ml	30 mg	0,6 ml	q 12 h max. 1 000 mg/j
3 kg	23 mg à 45 mg	0,5 ml à 0,9 ml	45 mg	0,9 ml	
4 kg	30 mg à 60 mg	0,6 ml à 1,2 ml	60 mg	1,2 ml	
5 kg	38 mg à 75 mg	0,8 ml à 1,5 ml	75 mg	1,5 ml	
6 kg	45 mg à 90 mg	0,9 ml à 1,8 ml	90 mg	1,8 ml	
7 kg	53 mg à 105 mg	1,1 ml à 2,1 ml	105 mg	2,1 ml	
8 kg	60 mg à 120 mg	1,2 ml à 2,4 ml	120 mg	2,4 ml	
9 kg	68 mg à 135 mg	1,4 ml à 2,7 ml	135 mg	2,7 ml	
10 kg	75 mg à 150 mg	1,5 ml à 3 ml	150 mg	3 ml	
11 kg	83 mg à 165 mg	1,7 ml à 3,3 ml	165 mg	3,3 ml	
12 kg	90 mg à 180 mg	1,8 ml à 3,6 ml	180 mg	3,6 ml	
13 kg	98 mg à 195 mg	2 ml à 3,9 ml	195 mg	3,9 ml	
14 kg	105 mg à 210 mg	2,1 ml à 4,2 ml	210 mg	4,2 ml	
15 kg	113 mg à 225 mg	2,3 ml à 4,5 ml	225 mg	4,5 ml	
16 kg	120 mg à 240 mg	2,4 ml à 4,8 ml	240 mg	4,8 ml	
17 kg	128 mg à 255 mg	2,6 ml à 5,1 ml	255 mg	5,1 ml	
18 kg	135 mg à 270 mg	2,7 ml à 5,4 ml	270 mg	5,4 ml	
19 kg	143 mg à 285 mg	2,9 ml à 5,7 ml	285 mg	5,7 ml	
20 kg	150 mg à 300 mg	3 ml à 6 ml	300 mg	6 ml	
21 kg	158 mg à 315 mg	3,2 ml à 6,3 ml	315 mg	6,3 ml	
22 kg	165 mg à 330 mg	3,3 ml à 6,6 ml	330 mg	6,6 ml	
23 kg	173 mg à 345 mg	3,5 ml à 6,9 ml	345 mg	6,9 ml	
24 kg	180 mg à 360 mg	3,6 ml à 7,2 ml	360 mg	7,2 ml	
25 kg	188 mg à 375 mg	3,8 ml à 7,5 ml	375 mg	7,5 ml	
26 kg	195 mg à 390 mg	3,9 ml à 7,8 ml	390 mg	7,8 ml	
27 kg	203 mg à 405 mg	4,1 ml à 8,1 ml	405 mg	8,1 ml	
28 kg	210 mg à 420 mg	4,2 ml à 8,4 ml	420 mg	8,4 ml	
29 kg	218 mg à 435 mg	4,4 ml à 8,7 ml	435 mg	8,7 ml	
30 kg	225 mg à 450 mg	4,5 ml à 9 ml	450 mg	9 ml	

Ceftazidime 1000 mg et 2000 mg/ fiole (dilué 100 mg/ml) injectable IV

Fortaz[®]

Dose usuelle 100 à 150 mg/kg/j

max. 300 mg/kg/j

Poids	mg/dose usuelle	ml/dose usuelle	mg/dose maximale	ml/dose maximale	Fréquence d'administration
2 kg	67 mg à 100 mg	0,7 ml à 1 ml	200 mg	2 ml	q 8 h dose max 6 g/j ad 12 g/j si infection sévère
3 kg	100 mg à 150 mg	1 ml à 1,5 ml	300 mg	3 ml	
4 kg	133 mg à 200 mg	1,3 ml à 2 ml	400 mg	4 ml	
5 kg	167 mg à 250 mg	1,7 ml à 2,5 ml	500 mg	5 ml	
6 kg	200 mg à 300 mg	2 ml à 3 ml	600 mg	6 ml	
7 kg	233 mg à 350 mg	2,3 ml à 3,5 ml	700 mg	7 ml	
8 kg	267 mg à 400 mg	2,7 ml à 4 ml	800 mg	8 ml	
9 kg	300 mg à 450 mg	3 ml à 4,5 ml	900 mg	9 ml	
10 kg	333 mg à 500 mg	3,3 ml à 5 ml	1000 mg	10 ml	
11 kg	367 mg à 550 mg	3,7 ml à 5,5 ml	1100 mg	11 ml	
12 kg	400 mg à 600 mg	4 ml à 6 ml	1200 mg	12 ml	
13 kg	433 mg à 650 mg	4,3 ml à 6,5 ml	1300 mg	13 ml	
14 kg	467 mg à 700 mg	4,7 ml à 7 ml	1400 mg	14 ml	
15 kg	500 mg à 750 mg	5 ml à 7,5 ml	1500 mg	15 ml	
16 kg	533 mg à 800 mg	5,3 ml à 8 ml	1600 mg	16 ml	
17 kg	567 mg à 850 mg	5,7 ml à 8,5 ml	1700 mg	17 ml	
18 kg	600 mg à 900 mg	6 ml à 9 ml	1800 mg	18 ml	
19 kg	633 mg à 950 mg	6,3 ml à 9,5 ml	1900 mg	19 ml	
20 kg	667 mg à 1000 mg	6,7 ml à 10 ml	2000 mg	20 ml	
21 kg	700 mg à 1050 mg	7 ml à 10,5 ml	2100 mg	21 ml	
22 kg	733 mg à 1100 mg	7,3 ml à 11 ml	2200 mg	22 ml	
23 kg	767 mg à 1150 mg	7,7 ml à 11,5 ml	2300 mg	23 ml	
24 kg	800 mg à 1200 mg	8 ml à 12 ml	2400 mg	24 ml	
25 kg	833 mg à 1250 mg	8,3 ml à 12,5 ml	2500 mg	25 ml	
26 kg	867 mg à 1300 mg	8,7 ml à 13 ml	2600 mg	26 ml	
27 kg	900 mg à 1350 mg	9 ml à 13,5 ml	2700 mg	27 ml	
28 kg	933 mg à 1400 mg	9,3 ml à 14 ml	2800 mg	28 ml	
29 kg	967 mg à 1450 mg	9,7 ml à 14,5 ml	2900 mg	29 ml	
30 kg	1000 mg à 1500 mg	10 ml à 15 ml	3000 mg	30 ml	

Ceftazidime 1000 mg et 2000 mg/fiole (dilué 280 mg/ml) injectable IM

Fortaz[®]

Dose usuelle 100 à 150 mg/kg/j

max. 300 mg/kg/j

Poids	mg/dose usuelle	ml/dose usuelle	mg/dose maximale	ml/dose maximale	Fréquence d'administration
2 kg	67 mg à 100 mg	0,24 ml à 0,36 ml	200 mg	0,71 ml	q 8 h dose max 6 g/j ad 12 g/j si infection sévère
3 kg	100 mg à 150 mg	0,36 ml à 0,54 ml	300 mg	1,1 ml	
4 kg	133 mg à 200 mg	0,48 ml à 0,71 ml	400 mg	1,4 ml	
5 kg	167 mg à 250 mg	0,6 ml à 0,89 ml	500 mg	1,8 ml	
6 kg	200 mg à 300 mg	0,71 ml à 1,1 ml	600 mg	2,1 ml	
7 kg	233 mg à 350 mg	0,83 ml à 1,3 ml	700 mg	2,5 ml	
8 kg	267 mg à 400 mg	0,95 ml à 1,4 ml	800 mg	2,9 ml	
9 kg	300 mg à 450 mg	1,1 ml à 1,6 ml	900 mg	3,2 ml	
10 kg	333 mg à 500 mg	1,2 ml à 1,8 ml	1000 mg	3,6 ml	
11 kg	367 mg à 550 mg	1,3 ml à 2 ml	1100 mg	3,9 ml	
12 kg	400 mg à 600 mg	1,4 ml à 2,1 ml	1200 mg	4,3 ml	
13 kg	433 mg à 650 mg	1,5 ml à 2,3 ml	1300 mg	4,6 ml	
14 kg	467 mg à 700 mg	1,7 ml à 2,5 ml	1400 mg	5 ml	
15 kg	500 mg à 750 mg	1,8 ml à 2,7 ml	1500 mg	5,4 ml	
16 kg	533 mg à 800 mg	1,9 ml à 2,9 ml	1600 mg	5,7 ml	
17 kg	567 mg à 850 mg	2 ml à 3 ml	1700 mg	6,1 ml	
18 kg	600 mg à 900 mg	2,1 ml à 3,2 ml	1800 mg	6,4 ml	
19 kg	633 mg à 950 mg	2,3 ml à 3,4 ml	1900 mg	6,8 ml	
20 kg	667 mg à 1000 mg	2,4 ml à 3,6 ml	2000 mg	7,1 ml	
21 kg	700 mg à 1050 mg	2,5 ml à 3,8 ml	2100 mg	7,5 ml	
22 kg	733 mg à 1100 mg	2,6 ml à 3,9 ml	2200 mg	7,9 ml	
23 kg	767 mg à 1150 mg	2,7 ml à 4,1 ml	2300 mg	8,2 ml	
24 kg	800 mg à 1200 mg	2,9 ml à 4,3 ml	2400 mg	8,6 ml	
25 kg	833 mg à 1250 mg	3 ml à 4,5 ml	2500 mg	8,9 ml	
26 kg	867 mg à 1300 mg	3,1 ml à 4,6 ml	2600 mg	9,3 ml	
27 kg	900 mg à 1350 mg	3,2 ml à 4,8 ml	2700 mg	9,6 ml	
28 kg	933 mg à 1400 mg	3,3 ml à 5 ml	2800 mg	10 ml	
29 kg	967 mg à 1450 mg	3,5 ml à 5,2 ml	2900 mg	10,4 ml	
30 kg	1000 mg à 1500 mg	3,6 ml à 5,4 ml	3000 mg	10,7 ml	

Ceftriaxone 1000 mg et 2000 mg/fiole (dilué 100 mg/ml) injectable IV

Rocephin®

Dose usuelle 50 à 75 mg/kg/j

max. 100 mg/kg/j

Poids	mg/dose usuelle	ml/dose usuelle	mg/dose maximale	ml/dose maximale	Fréquence d'administration
2 kg	50 mg à 75 mg	0,5 ml à 0,8 ml	100 mg	1 ml	q 12 h max. 4 g/j
3 kg	75 mg à 113 mg	0,8 ml à 1,1 ml	150 mg	1,5 ml	
4 kg	100 mg à 150 mg	1 ml à 1,5 ml	200 mg	2 ml	
5 kg	125 mg à 188 mg	1,3 ml à 1,9 ml	250 mg	2,5 ml	
6 kg	150 mg à 225 mg	1,5 ml à 2,3 ml	300 mg	3 ml	
7 kg	175 mg à 263 mg	1,8 ml à 2,6 ml	350 mg	3,5 ml	
8 kg	200 mg à 300 mg	2 ml à 3 ml	400 mg	4 ml	
9 kg	225 mg à 338 mg	2,3 ml à 3,4 ml	450 mg	4,5 ml	
10 kg	250 mg à 375 mg	2,5 ml à 3,8 ml	500 mg	5 ml	
11 kg	275 mg à 413 mg	2,8 ml à 4,1 ml	550 mg	5,5 ml	
12 kg	300 mg à 450 mg	3 ml à 4,5 ml	600 mg	6 ml	
13 kg	325 mg à 488 mg	3,3 ml à 4,9 ml	650 mg	6,5 ml	
14 kg	350 mg à 525 mg	3,5 ml à 5,3 ml	700 mg	7 ml	
15 kg	375 mg à 563 mg	3,8 ml à 5,6 ml	750 mg	7,5 ml	
16 kg	400 mg à 600 mg	4 ml à 6 ml	800 mg	8 ml	
17 kg	425 mg à 638 mg	4,3 ml à 6,4 ml	850 mg	8,5 ml	
18 kg	450 mg à 675 mg	4,5 ml à 6,8 ml	900 mg	9 ml	
19 kg	475 mg à 713 mg	4,8 ml à 7,1 ml	950 mg	9,5 ml	
20 kg	500 mg à 750 mg	5 ml à 7,5 ml	1000 mg	10 ml	
21 kg	525 mg à 788 mg	5,3 ml à 7,9 ml	1050 mg	10,5 ml	
22 kg	550 mg à 825 mg	5,5 ml à 8,3 ml	1100 mg	11 ml	
23 kg	575 mg à 863 mg	5,8 ml à 8,6 ml	1150 mg	11,5 ml	
24 kg	600 mg à 900 mg	6 ml à 9 ml	1200 mg	12 ml	
25 kg	625 mg à 938 mg	6,3 ml à 9,4 ml	1250 mg	12,5 ml	
26 kg	650 mg à 975 mg	6,5 ml à 9,8 ml	1300 mg	13 ml	
27 kg	675 mg à 1013 mg	6,8 ml à 10,1 ml	1350 mg	13,5 ml	
28 kg	700 mg à 1050 mg	7 ml à 10,5 ml	1400 mg	14 ml	
29 kg	725 mg à 1088 mg	7,3 ml à 10,9 ml	1450 mg	14,5 ml	
30 kg	750 mg à 1125 mg	7,5 ml à 11,3 ml	1500 mg	15 ml	

Ceftriaxone 1000 mg et 2000 mg/ fiole (dilué 350 mg/ml) injection IM

Rocephin®

Dose usuelle 50 à 75 mg/kg/j

max. 75 mg/kg/j

Poids	mg/dose usuelle	ml/dose usuelle	mg/dose maximale	ml/dose maximale	Fréquence d'administration
2 kg	100 mg à 150 mg	0,3 ml à 0,4 ml	150 mg	0,4 ml	q 24 h max. 2 g/j
3 kg	150 mg à 225 mg	0,4 ml à 0,6 ml	225 mg	0,6 ml	
4 kg	200 mg à 300 mg	0,6 ml à 0,9 ml	300 mg	0,9 ml	
5 kg	250 mg à 375 mg	0,7 ml à 1,1 ml	375 mg	1,1 ml	
6 kg	300 mg à 450 mg	0,9 ml à 1,3 ml	450 mg	1,3 ml	
7 kg	350 mg à 525 mg	1 ml à 1,5 ml	525 mg	1,5 ml	
8 kg	400 mg à 600 mg	1,1 ml à 1,7 ml	600 mg	1,7 ml	
9 kg	450 mg à 675 mg	1,3 ml à 1,9 ml	675 mg	1,9 ml	
10 kg	500 mg à 750 mg	1,4 ml à 2,1 ml	750 mg	2,1 ml	
11 kg	550 mg à 825 mg	1,6 ml à 2,4 ml	825 mg	2,4 ml	
12 kg	600 mg à 900 mg	1,7 ml à 2,6 ml	900 mg	2,6 ml	
13 kg	650 mg à 975 mg	1,9 ml à 2,8 ml	975 mg	2,8 ml	
14 kg	700 mg à 1050 mg	2 ml à 3 ml	1050 mg	3 ml	
15 kg	750 mg à 1125 mg	2,1 ml à 3,2 ml	1125 mg	3,2 ml	
16 kg	800 mg à 1200 mg	2,3 ml à 3,4 ml	1200 mg	3,4 ml	
17 kg	850 mg à 1275 mg	2,4 ml à 3,6 ml	1275 mg	3,6 ml	
18 kg	900 mg à 1350 mg	2,6 ml à 3,9 ml	1350 mg	3,9 ml	
19 kg	950 mg à 1425 mg	2,7 ml à 4,1 ml	1425 mg	4,1 ml	
20 kg	1000 mg à 1500 mg	2,9 ml à 4,3 ml	1500 mg	4,3 ml	
21 kg	1050 mg à 1575 mg	3 ml à 4,5 ml	1575 mg	4,5 ml	
22 kg	1100 mg à 1650 mg	3,1 ml à 4,7 ml	1650 mg	4,7 ml	
23 kg	1150 mg à 1725 mg	3,3 ml à 4,9 ml	1725 mg	4,9 ml	
24 kg	1200 mg à 1800 mg	3,4 ml à 5,1 ml	1800 mg	5,1 ml	
25 kg	1250 mg à 1875 mg	3,6 ml à 5,4 ml	1875 mg	5,4 ml	
26 kg	1300 mg à 1950 mg	3,7 ml à 5,6 ml	1950 mg	5,6 ml	
27 kg	1350 mg à 2000 mg	3,9 ml à 5,7 ml	2000 mg	5,7 ml	
28 kg	1400 mg à 2000 mg	4 ml à 5,7 ml	2000 mg	5,7 ml	
29 kg	1450 mg à 2000 mg	4,1 ml à 5,7 ml	2000 mg	5,7 ml	
30 kg	1500 mg à 2000 mg	4,3 ml à 5,7 ml	2000 mg	5,7 ml	

Cefuroxime 750 mg/fiole (dilué 90 mg/ml) injectable IV

Zinacef®

Dose usuelle 75 à 150 mg/kg/j

max. 150 mg/kg/j

Poids	mg/dose usuelle	ml/dose usuelle	mg/dose maximale	ml/dose maximale	Fréquence d'administration
2 kg	50 mg à 100 mg	0,6 ml à 1,1 ml	100 mg	1,1 ml	q 8 h max. 6 g/j
3 kg	75 mg à 150 mg	0,8 ml à 1,7 ml	150 mg	1,7 ml	
4 kg	100 mg à 200 mg	1,1 ml à 2,2 ml	200 mg	2,2 ml	
5 kg	125 mg à 250 mg	1,4 ml à 2,8 ml	250 mg	2,8 ml	
6 kg	150 mg à 300 mg	1,7 ml à 3,3 ml	300 mg	3,3 ml	
7 kg	175 mg à 350 mg	1,9 ml à 3,9 ml	350 mg	3,9 ml	
8 kg	200 mg à 400 mg	2,2 ml à 4,4 ml	400 mg	4,4 ml	
9 kg	225 mg à 450 mg	2,5 ml à 5 ml	450 mg	5 ml	
10 kg	250 mg à 500 mg	2,8 ml à 5,6 ml	500 mg	5,6 ml	
11 kg	275 mg à 550 mg	3,1 ml à 6,1 ml	550 mg	6,1 ml	
12 kg	300 mg à 600 mg	3,3 ml à 6,7 ml	600 mg	6,7 ml	
13 kg	325 mg à 650 mg	3,6 ml à 7,2 ml	650 mg	7,2 ml	
14 kg	350 mg à 700 mg	3,9 ml à 7,8 ml	700 mg	7,8 ml	
15 kg	375 mg à 750 mg	4,2 ml à 8,3 ml	750 mg	8,3 ml	
16 kg	400 mg à 800 mg	4,4 ml à 8,9 ml	800 mg	8,9 ml	
17 kg	425 mg à 850 mg	4,7 ml à 9,4 ml	850 mg	9,4 ml	
18 kg	450 mg à 900 mg	5 ml à 10 ml	900 mg	10 ml	
19 kg	475 mg à 950 mg	5,3 ml à 10,6 ml	950 mg	10,6 ml	
20 kg	500 mg à 1000 mg	5,6 ml à 11,1 ml	1000 mg	11,1 ml	
21 kg	525 mg à 1050 mg	5,8 ml à 11,7 ml	1050 mg	11,7 ml	
22 kg	550 mg à 1100 mg	6,1 ml à 12,2 ml	1100 mg	12,2 ml	
23 kg	575 mg à 1150 mg	6,4 ml à 12,8 ml	1150 mg	12,8 ml	
24 kg	600 mg à 1200 mg	6,7 ml à 13,3 ml	1200 mg	13,3 ml	
25 kg	625 mg à 1250 mg	6,9 ml à 13,9 ml	1250 mg	13,9 ml	
26 kg	650 mg à 1300 mg	7,2 ml à 14,4 ml	1300 mg	14,4 ml	
27 kg	675 mg à 1350 mg	7,5 ml à 15 ml	1350 mg	15 ml	
28 kg	700 mg à 1400 mg	7,8 ml à 15,6 ml	1400 mg	15,6 ml	
29 kg	725 mg à 1450 mg	8,1 ml à 16,1 ml	1450 mg	16,1 ml	
30 kg	750 mg à 1500 mg	8,3 ml à 16,7 ml	1500 mg	16,7 ml	

Cefuroxime 750 mg/fiole (dilué 220 mg/ml) injectable IM

Zinacef®

Dose usuelle 75 à 150 mg/kg/j

max. 150 mg/kg/j

Poids	mg/dose usuelle	ml/dose usuelle	mg/dose maximale	ml/dose maximale	Fréquence d'administration
2 kg	50 mg à 100 mg	0,23 ml à 0,45 ml	100 mg	0,45 ml	q 8 h max. 6 g/j
3 kg	75 mg à 150 mg	0,34 ml à 0,68 ml	150 mg	0,68 ml	
4 kg	100 mg à 200 mg	0,45 ml à 0,91 ml	200 mg	0,91 ml	
5 kg	125 mg à 250 mg	0,57 ml à 1,1 ml	250 mg	1,1 ml	
6 kg	150 mg à 300 mg	0,68 ml à 1,4 ml	300 mg	1,4 ml	
7 kg	175 mg à 350 mg	0,8 ml à 1,6 ml	350 mg	1,6 ml	
8 kg	200 mg à 400 mg	0,91 ml à 1,8 ml	400 mg	1,8 ml	
9 kg	225 mg à 450 mg	1 ml à 2 ml	450 mg	2 ml	
10 kg	250 mg à 500 mg	1,1 ml à 2,3 ml	500 mg	2,3 ml	
11 kg	275 mg à 550 mg	1,3 ml à 2,5 ml	550 mg	2,5 ml	
12 kg	300 mg à 600 mg	1,4 ml à 2,7 ml	600 mg	2,7 ml	
13 kg	325 mg à 650 mg	1,5 ml à 3 ml	650 mg	3 ml	
14 kg	350 mg à 700 mg	1,6 ml à 3,2 ml	700 mg	3,2 ml	
15 kg	375 mg à 750 mg	1,7 ml à 3,4 ml	750 mg	3,4 ml	
16 kg	400 mg à 800 mg	1,8 ml à 3,6 ml	800 mg	3,6 ml	
17 kg	425 mg à 850 mg	1,9 ml à 3,9 ml	850 mg	3,9 ml	
18 kg	450 mg à 900 mg	2 ml à 4,1 ml	900 mg	4,1 ml	
19 kg	475 mg à 950 mg	2,2 ml à 4,3 ml	950 mg	4,3 ml	
20 kg	500 mg à 1000 mg	2,3 ml à 4,5 ml	1000 mg	4,5 ml	
21 kg	525 mg à 1050 mg	2,4 ml à 4,8 ml	1050 mg	4,8 ml	
22 kg	550 mg à 1100 mg	2,5 ml à 5 ml	1100 mg	5 ml	
23 kg	575 mg à 1150 mg	2,6 ml à 5,2 ml	1150 mg	5,2 ml	
24 kg	600 mg à 1200 mg	2,7 ml à 5,5 ml	1200 mg	5,5 ml	
25 kg	625 mg à 1250 mg	2,8 ml à 5,7 ml	1250 mg	5,7 ml	
26 kg	650 mg à 1300 mg	3 ml à 5,9 ml	1300 mg	5,9 ml	
27 kg	675 mg à 1350 mg	3,1 ml à 6,1 ml	1350 mg	6,1 ml	
28 kg	700 mg à 1400 mg	3,2 ml à 6,4 ml	1400 mg	6,4 ml	
29 kg	725 mg à 1450 mg	3,3 ml à 6,6 ml	1450 mg	6,6 ml	
30 kg	750 mg à 1500 mg	3,4 ml à 6,8 ml	1500 mg	6,8 ml	

Cephalexine 50 mg/ml PO

Keflex®

Dose usuelle 25 à 75 mg/kg/j

max. 100 mg/kg/j

Poids	mg/dose usuelle	ml/dose usuelle	mg/dose maximale	ml/dose maximale	Fréquence d'administration
2 kg	13 mg à 38 mg	0,3 ml à 0,8 ml	50 mg	1 ml	qid max. 4 000 mg/j
3 kg	19 mg à 56 mg	0,4 ml à 1,1 ml	75 mg	1,5 ml	
4 kg	25 mg à 75 mg	0,5 ml à 1,5 ml	100 mg	2 ml	
5 kg	31 mg à 94 mg	0,6 ml à 1,9 ml	125 mg	2,5 ml	
6 kg	38 mg à 113 mg	0,8 ml à 2,3 ml	150 mg	3 ml	
7 kg	44 mg à 131 mg	0,9 ml à 2,6 ml	175 mg	3,5 ml	
8 kg	50 mg à 150 mg	1 ml à 3 ml	200 mg	4 ml	
9 kg	56 mg à 169 mg	1,1 ml à 3,4 ml	225 mg	4,5 ml	
10 kg	63 mg à 188 mg	1,3 ml à 3,8 ml	250 mg	5 ml	
11 kg	69 mg à 206 mg	1,4 ml à 4,1 ml	275 mg	5,5 ml	
12 kg	75 mg à 225 mg	1,5 ml à 4,5 ml	300 mg	6 ml	
13 kg	81 mg à 244 mg	1,6 ml à 4,9 ml	325 mg	6,5 ml	
14 kg	88 mg à 263 mg	1,8 ml à 5,3 ml	350 mg	7 ml	
15 kg	94 mg à 281 mg	1,9 ml à 5,6 ml	375 mg	7,5 ml	
16 kg	100 mg à 300 mg	2 ml à 6 ml	400 mg	8 ml	
17 kg	106 mg à 319 mg	2,1 ml à 6,4 ml	425 mg	8,5 ml	
18 kg	113 mg à 338 mg	2,3 ml à 6,8 ml	450 mg	9 ml	
19 kg	119 mg à 356 mg	2,4 ml à 7,1 ml	475 mg	9,5 ml	
20 kg	125 mg à 375 mg	2,5 ml à 7,5 ml	500 mg	10 ml	
21 kg	131 mg à 394 mg	2,6 ml à 7,9 ml	525 mg	10,5 ml	
22 kg	138 mg à 413 mg	2,8 ml à 8,3 ml	550 mg	11 ml	
23 kg	144 mg à 431 mg	2,9 ml à 8,6 ml	575 mg	11,5 ml	
24 kg	150 mg à 450 mg	3 ml à 9 ml	600 mg	12 ml	
25 kg	156 mg à 469 mg	3,1 ml à 9,4 ml	625 mg	12,5 ml	
26 kg	163 mg à 488 mg	3,3 ml à 9,8 ml	650 mg	13 ml	
27 kg	169 mg à 506 mg	3,4 ml à 10,1 ml	675 mg	13,5 ml	
28 kg	175 mg à 525 mg	3,5 ml à 10,5 ml	700 mg	14 ml	
29 kg	181 mg à 544 mg	3,6 ml à 10,9 ml	725 mg	14,5 ml	
30 kg	188 mg à 563 mg	3,8 ml à 11,3 ml	750 mg	15 ml	

Clarithromycine 25 mg/ml PO

Biaxin[®]

Dose usuelle 15 mg/kg/j

max. 15 mg/kg/j

Poids	mg/dose usuelle	ml/dose usuelle	mg/dose maximale	ml/dose maximale	Fréquence d'administration
2 kg	15 mg	0,6 ml	15 mg	0,6 ml	q 12 h max. 1 000 mg/j
3 kg	23 mg	0,9 ml	23 mg	0,9 ml	
4 kg	30 mg	1,2 ml	30 mg	1,2 ml	
5 kg	38 mg	1,5 ml	38 mg	1,5 ml	
6 kg	45 mg	1,8 ml	45 mg	1,8 ml	
7 kg	53 mg	2,1 ml	53 mg	2,1 ml	
8 kg	60 mg	2,4 ml	60 mg	2,4 ml	
9 kg	68 mg	2,7 ml	68 mg	2,7 ml	
10 kg	75 mg	3 ml	75 mg	3 ml	
11 kg	83 mg	3,3 ml	83 mg	3,3 ml	
12 kg	90 mg	3,6 ml	90 mg	3,6 ml	
13 kg	98 mg	3,9 ml	98 mg	3,9 ml	
14 kg	105 mg	4,2 ml	105 mg	4,2 ml	
15 kg	113 mg	4,5 ml	113 mg	4,5 ml	
16 kg	120 mg	4,8 ml	120 mg	4,8 ml	
17 kg	128 mg	5,1 ml	128 mg	5,1 ml	
18 kg	135 mg	5,4 ml	135 mg	5,4 ml	
19 kg	143 mg	5,7 ml	143 mg	5,7 ml	
20 kg	150 mg	6 ml	150 mg	6 ml	
21 kg	158 mg	6,3 ml	158 mg	6,3 ml	
22 kg	165 mg	6,6 ml	165 mg	6,6 ml	
23 kg	173 mg	6,9 ml	173 mg	6,9 ml	
24 kg	180 mg	7,2 ml	180 mg	7,2 ml	
25 kg	188 mg	7,5 ml	188 mg	7,5 ml	
26 kg	195 mg	7,8 ml	195 mg	7,8 ml	
27 kg	203 mg	8,1 ml	203 mg	8,1 ml	
28 kg	210 mg	8,4 ml	210 mg	8,4 ml	
29 kg	218 mg	8,7 ml	218 mg	8,7 ml	
30 kg	225 mg	9 ml	225 mg	9 ml	

Clindamycine 15 mg/ml PO

Dalacin®

Dose usuelle 10 à 30 mg/kg/j

max. 40 mg/kg/j

Poids	mg/dose usuelle	ml/dose usuelle	mg/dose maximale	ml/dose maximale	Fréquence d'administration
2 kg	5 mg à 15 mg	0,3 ml à 1 ml	20 mg	1,3 ml	qid max. 1.8 g/j
3 kg	8 mg à 23 mg	0,5 ml à 1,5 ml	30 mg	2 ml	
4 kg	10 mg à 30 mg	0,7 ml à 2 ml	40 mg	2,7 ml	
5 kg	13 mg à 38 mg	0,8 ml à 2,5 ml	50 mg	3,3 ml	
6 kg	15 mg à 45 mg	1 ml à 3 ml	60 mg	4 ml	
7 kg	18 mg à 53 mg	1,2 ml à 3,5 ml	70 mg	4,7 ml	
8 kg	20 mg à 60 mg	1,3 ml à 4 ml	80 mg	5,3 ml	
9 kg	23 mg à 68 mg	1,5 ml à 4,5 ml	90 mg	6 ml	
10 kg	25 mg à 75 mg	1,7 ml à 5 ml	100 mg	6,7 ml	
11 kg	28 mg à 83 mg	1,8 ml à 5,5 ml	110 mg	7,3 ml	
12 kg	30 mg à 90 mg	2 ml à 6 ml	120 mg	8 ml	
13 kg	33 mg à 98 mg	2,2 ml à 6,5 ml	130 mg	8,7 ml	
14 kg	35 mg à 105 mg	2,3 ml à 7 ml	140 mg	9,3 ml	
15 kg	38 mg à 113 mg	2,5 ml à 7,5 ml	150 mg	10 ml	
16 kg	40 mg à 120 mg	2,7 ml à 8 ml	160 mg	10,7 ml	
17 kg	43 mg à 128 mg	2,8 ml à 8,5 ml	170 mg	11,3 ml	
18 kg	45 mg à 135 mg	3 ml à 9 ml	180 mg	12 ml	
19 kg	48 mg à 143 mg	3,2 ml à 9,5 ml	190 mg	12,7 ml	
20 kg	50 mg à 150 mg	3,3 ml à 10 ml	200 mg	13,3 ml	
21 kg	53 mg à 158 mg	3,5 ml à 10,5 ml	210 mg	14 ml	
22 kg	55 mg à 165 mg	3,7 ml à 11 ml	220 mg	14,7 ml	
23 kg	58 mg à 173 mg	3,8 ml à 11,5 ml	230 mg	15,3 ml	
24 kg	60 mg à 180 mg	4 ml à 12 ml	240 mg	16 ml	
25 kg	63 mg à 188 mg	4,2 ml à 12,5 ml	250 mg	16,7 ml	
26 kg	65 mg à 195 mg	4,3 ml à 13 ml	260 mg	17,3 ml	
27 kg	68 mg à 203 mg	4,5 ml à 13,5 ml	270 mg	18 ml	
28 kg	70 mg à 210 mg	4,7 ml à 14 ml	280 mg	18,7 ml	
29 kg	73 mg à 218 mg	4,8 ml à 14,5 ml	290 mg	19,3 ml	
30 kg	75 mg à 225 mg	5 ml à 15 ml	300 mg	20 ml	

Clindamycine 600 mg/4 ml et 900 mg/6ml fioles (150 mg/ml) IV

Dalacin[®]

Dose usuelle 15 à 30 mg/kg/j

max. 40 mg/kg/j

Poids	mg/dose usuelle	ml/dose usuelle	mg/dose maximale	ml/dose maximale	Fréquence d'administration
2 kg	10 mg à 20 mg	0,07 ml à 0,13 ml	27 mg	0,18 ml	q 8 h
3 kg	15 mg à 30 mg	0,1 ml à 0,2 ml	40 mg	0,27 ml	
4 kg	20 mg à 40 mg	0,13 ml à 0,27 ml	53 mg	0,36 ml	
5 kg	25 mg à 50 mg	0,17 ml à 0,33 ml	67 mg	0,44 ml	
6 kg	30 mg à 60 mg	0,2 ml à 0,40 ml	80 mg	0,53 ml	
7 kg	35 mg à 70 mg	0,23 ml à 0,47 ml	93 mg	0,62 ml	
8 kg	40 mg à 80 mg	0,27 ml à 0,53 ml	107 mg	0,71 ml	
9 kg	45 mg à 90 mg	0,3 ml à 0,6 ml	120 mg	0,80 ml	
10 kg	50 mg à 100 mg	0,33 ml à 0,67 ml	133 mg	0,89 ml	
11 kg	55 mg à 110 mg	0,37 ml à 0,73 ml	147 mg	0,98 ml	
12 kg	60 mg à 120 mg	0,4 ml à 0,80 ml	160 mg	1,07 ml	
13 kg	65 mg à 130 mg	0,43 ml à 0,87 ml	173 mg	1,16 ml	
14 kg	70 mg à 140 mg	0,47 ml à 0,93 ml	187 mg	1,24 ml	
15 kg	75 mg à 150 mg	0,5 ml à 1 ml	200 mg	1,33 ml	
16 kg	80 mg à 160 mg	0,53 ml à 1,07 ml	213 mg	1,42 ml	
17 kg	85 mg à 170 mg	0,57 ml à 1,13 ml	227 mg	1,51 ml	
18 kg	90 mg à 180 mg	0,6 ml à 1,20 ml	240 mg	1,60 ml	
19 kg	95 mg à 190 mg	0,63 ml à 1,27 ml	253 mg	1,69 ml	
20 kg	100 mg à 200 mg	0,67 ml à 1,33 ml	267 mg	1,78 ml	
21 kg	105 mg à 210 mg	0,7 ml à 1,40 ml	280 mg	1,87 ml	
22 kg	110 mg à 220 mg	0,73 ml à 1,47 ml	293 mg	1,96 ml	
23 kg	115 mg à 230 mg	0,77 ml à 1,53 ml	307 mg	2,04 ml	
24 kg	120 mg à 240 mg	0,8 ml à 1,6 ml	320 mg	2,13 ml	
25 kg	125 mg à 250 mg	0,83 ml à 1,67 ml	333 mg	2,22 ml	
26 kg	130 mg à 260 mg	0,87 ml à 1,73 ml	347 mg	2,31 ml	
27 kg	135 mg à 270 mg	0,9 ml à 1,8 ml	360 mg	2,40 ml	
28 kg	140 mg à 280 mg	0,93 ml à 1,87 ml	373 mg	2,49 ml	
29 kg	145 mg à 290 mg	0,97 ml à 1,93 ml	387 mg	2,58 ml	
30 kg	150 mg à 300 mg	1 ml à 2 ml	400 mg	2,67 ml	

Clindamycine 600 mg/50 ml D5% (12 mg/ml) soluté (si fioles BO) IV

Dalacin[®]

Dose usuelle 15 à 30 mg/kg/j

max. 40 mg/kg/j

Poids	mg/dose usuelle	ml/dose usuelle	mg/dose maximale	ml/dose maximale	Fréquence d'administration
2 kg	10 mg à 20 mg	0,8 ml à 1,7 ml	27 mg	2,2 ml	q 8 h
3 kg	15 mg à 30 mg	1,3 ml à 2,5 ml	40 mg	3,3 ml	
4 kg	20 mg à 40 mg	1,7 ml à 3,3 ml	53 mg	4,4 ml	
5 kg	25 mg à 50 mg	2,1 ml à 4,2 ml	67 mg	5,6 ml	
6 kg	30 mg à 60 mg	2,5 ml à 5 ml	80 mg	6,7 ml	
7 kg	35 mg à 70 mg	2,9 ml à 5,8 ml	93 mg	7,8 ml	
8 kg	40 mg à 80 mg	3,3 ml à 6,7 ml	107 mg	8,9 ml	
9 kg	45 mg à 90 mg	3,8 ml à 7,5 ml	120 mg	10 ml	
10 kg	50 mg à 100 mg	4,2 ml à 8,3 ml	133 mg	11,1 ml	
11 kg	55 mg à 110 mg	4,6 ml à 9,2 ml	147 mg	12,2 ml	
12 kg	60 mg à 120 mg	5 ml à 10 ml	160 mg	13,3 ml	
13 kg	65 mg à 130 mg	5,4 ml à 10,8 ml	173 mg	14,4 ml	
14 kg	70 mg à 140 mg	5,8 ml à 11,7 ml	187 mg	15,6 ml	
15 kg	75 mg à 150 mg	6,3 ml à 12,5 ml	200 mg	16,7 ml	
16 kg	80 mg à 160 mg	6,7 ml à 13,3 ml	213 mg	17,8 ml	
17 kg	85 mg à 170 mg	7,1 ml à 14,2 ml	227 mg	18,9 ml	
18 kg	90 mg à 180 mg	7,5 ml à 15 ml	240 mg	20 ml	
19 kg	95 mg à 190 mg	7,9 ml à 15,8 ml	253 mg	21,1 ml	
20 kg	100 mg à 200 mg	8,3 ml à 16,7 ml	267 mg	22,2 ml	
21 kg	105 mg à 210 mg	8,8 ml à 17,5 ml	280 mg	23,3 ml	
22 kg	110 mg à 220 mg	9,2 ml à 18,3 ml	293 mg	24,4 ml	
23 kg	115 mg à 230 mg	9,6 ml à 19,2 ml	307 mg	25,6 ml	
24 kg	120 mg à 240 mg	10 ml à 20 ml	320 mg	26,7 ml	
25 kg	125 mg à 250 mg	10,4 ml à 20,8 ml	333 mg	27,8 ml	
26 kg	130 mg à 260 mg	10,8 ml à 21,7 ml	347 mg	28,9 ml	
27 kg	135 mg à 270 mg	11,3 ml à 22,5 ml	360 mg	30 ml	
28 kg	140 mg à 280 mg	11,7 ml à 23,3 ml	373 mg	31,1 ml	
29 kg	145 mg à 290 mg	12,1 ml à 24,2 ml	387 mg	32,2 ml	
30 kg	150 mg à 300 mg	12,5 ml à 25 ml	400 mg	33,3 ml	

*Attention existe 2 formats de sacs 600mg par 50ml (12mg/ml) et 900mg par 50ml (18mg/ml)

Clindamycine 900 mg/50 ml D5% (18 mg/ml) soluté (si fioles BO) IV

Dalacin[®]

Dose usuelle 15 à 30 mg/kg/j

max. 40 mg/kg/j

Poids	mg/dose usuelle	ml/dose usuelle	mg/dose maximale	ml/dose maximale	Fréquence d'administration
2 kg	10 mg à 20 mg	0,56 ml à 1,1 ml	27 mg	1,5 ml	q 8 h
3 kg	15 mg à 30 mg	0,83 ml à 1,7 ml	40 mg	2,2 ml	
4 kg	20 mg à 40 mg	1,1 ml à 2,2 ml	53 mg	3 ml	
5 kg	25 mg à 50 mg	1,4 ml à 2,8 ml	67 mg	3,7 ml	
6 kg	30 mg à 60 mg	1,7 ml à 3,3 ml	80 mg	4,4 ml	
7 kg	35 mg à 70 mg	1,9 ml à 3,9 ml	93 mg	5,2 ml	
8 kg	40 mg à 80 mg	2,2 ml à 4,4 ml	107 mg	5,9 ml	
9 kg	45 mg à 90 mg	2,5 ml à 5 ml	120 mg	6,7 ml	
10 kg	50 mg à 100 mg	2,8 ml à 5,6 ml	133 mg	7,4 ml	
11 kg	55 mg à 110 mg	3,1 ml à 6,1 ml	147 mg	8,1 ml	
12 kg	60 mg à 120 mg	3,3 ml à 6,7 ml	160 mg	8,9 ml	
13 kg	65 mg à 130 mg	3,6 ml à 7,2 ml	173 mg	9,6 ml	
14 kg	70 mg à 140 mg	3,9 ml à 7,8 ml	187 mg	10,4 ml	
15 kg	75 mg à 150 mg	4,2 ml à 8,3 ml	200 mg	11,1 ml	
16 kg	80 mg à 160 mg	4,4 ml à 8,9 ml	213 mg	11,9 ml	
17 kg	85 mg à 170 mg	4,7 ml à 9,4 ml	227 mg	12,6 ml	
18 kg	90 mg à 180 mg	5 ml à 10 ml	240 mg	13,3 ml	
19 kg	95 mg à 190 mg	5,3 ml à 10,6 ml	253 mg	14,1 ml	
20 kg	100 mg à 200 mg	5,6 ml à 11,1 ml	267 mg	14,8 ml	
21 kg	105 mg à 210 mg	5,8 ml à 11,7 ml	280 mg	15,6 ml	
22 kg	110 mg à 220 mg	6,1 ml à 12,2 ml	293 mg	16,3 ml	
23 kg	115 mg à 230 mg	6,4 ml à 12,8 ml	307 mg	17 ml	
24 kg	120 mg à 240 mg	6,7 ml à 13,3 ml	320 mg	17,8 ml	
25 kg	125 mg à 250 mg	6,9 ml à 13,9 ml	333 mg	18,5 ml	
26 kg	130 mg à 260 mg	7,2 ml à 14,4 ml	347 mg	19,3 ml	
27 kg	135 mg à 270 mg	7,5 ml à 15 ml	360 mg	20 ml	
28 kg	140 mg à 280 mg	7,8 ml à 15,6 ml	373 mg	20,7 ml	
29 kg	145 mg à 290 mg	8,1 ml à 16,1 ml	387 mg	21,5 ml	
30 kg	150 mg à 300 mg	8,3 ml à 16,7 ml	400 mg	22,2 ml	

*Attention existe 2 formats de sacs 600mg par 50ml (12mg/ml) et 900mg par 50ml (18mg/ml)

Cloxacilline 25 mg/ml PO

Orbenin®

Dose usuelle 50 à 100 mg/kg/j

max. 100 mg/kg/j

Poids	mg/dose usuelle	ml/dose usuelle	mg/dose maximale	ml/dose maximale	Fréquence d'administration
2 kg	25 mg à 50 mg	1 ml à 2 ml	50 mg	2 ml	qid max. 4 g/j
3 kg	38 mg à 75 mg	1,5 ml à 3 ml	75 mg	3 ml	
4 kg	50 mg à 100 mg	2 ml à 4 ml	100 mg	4 ml	
5 kg	63 mg à 125 mg	2,5 ml à 5 ml	125 mg	5 ml	
6 kg	75 mg à 150 mg	3 ml à 6 ml	150 mg	6 ml	
7 kg	88 mg à 175 mg	3,5 ml à 7 ml	175 mg	7 ml	
8 kg	100 mg à 200 mg	4 ml à 8 ml	200 mg	8 ml	
9 kg	113 mg à 225 mg	4,5 ml à 9 ml	225 mg	9 ml	
10 kg	125 mg à 250 mg	5 ml à 10 ml	250 mg	10 ml	
11 kg	138 mg à 275 mg	5,5 ml à 11 ml	275 mg	11 ml	
12 kg	150 mg à 300 mg	6 ml à 12 ml	300 mg	12 ml	
13 kg	163 mg à 325 mg	6,5 ml à 13 ml	325 mg	13 ml	
14 kg	175 mg à 350 mg	7 ml à 14 ml	350 mg	14 ml	
15 kg	188 mg à 375 mg	7,5 ml à 15 ml	375 mg	15 ml	
16 kg	200 mg à 400 mg	8 ml à 16 ml	400 mg	16 ml	
17 kg	213 mg à 425 mg	8,5 ml à 17 ml	425 mg	17 ml	
18 kg	225 mg à 450 mg	9 ml à 18 ml	450 mg	18 ml	
19 kg	238 mg à 475 mg	9,5 ml à 19 ml	475 mg	19 ml	
20 kg	250 mg à 500 mg	10 ml à 20 ml	500 mg	20 ml	
21 kg	263 mg à 525 mg	10,5 ml à 21 ml	525 mg	21 ml	
22 kg	275 mg à 550 mg	11 ml à 22 ml	550 mg	22 ml	
23 kg	288 mg à 575 mg	11,5 ml à 23 ml	575 mg	23 ml	
24 kg	300 mg à 600 mg	12 ml à 24 ml	600 mg	24 ml	
25 kg	313 mg à 625 mg	12,5 ml à 25 ml	625 mg	25 ml	
26 kg	325 mg à 650 mg	13 ml à 26 ml	650 mg	26 ml	
27 kg	338 mg à 675 mg	13,5 ml à 27 ml	675 mg	27 ml	
28 kg	350 mg à 700 mg	14 ml à 28 ml	700 mg	28 ml	
29 kg	363 mg à 725 mg	14,5 ml à 29 ml	725 mg	29 ml	
30 kg	375 mg à 750 mg	15 ml à 30 ml	750 mg	30 ml	

Cloxacilline 2000 mg/fiole (100 mg/ml) injectable IV

Orbenin[®]

Dose usuelle 100 à 200 mg/kg/j

max. 200 mg/kg/j

Poids	mg/dose usuelle	ml/dose usuelle	mg/dose maximale	ml/dose maximale	Fréquence d'administration
2 kg	50 mg à 100 mg	0,5 ml à 1 ml	100 mg	1 ml	q 6 h max. 12 g/j
3 kg	75 mg à 150 mg	0,8 ml à 1,5 ml	150 mg	1,5 ml	
4 kg	100 mg à 200 mg	1 ml à 2 ml	200 mg	2 ml	
5 kg	125 mg à 250 mg	1,3 ml à 2,5 ml	250 mg	2,5 ml	
6 kg	150 mg à 300 mg	1,5 ml à 3 ml	300 mg	3 ml	
7 kg	175 mg à 350 mg	1,8 ml à 3,5 ml	350 mg	3,5 ml	
8 kg	200 mg à 400 mg	2 ml à 4 ml	400 mg	4 ml	
9 kg	225 mg à 450 mg	2,3 ml à 4,5 ml	450 mg	4,5 ml	
10 kg	250 mg à 500 mg	2,5 ml à 5 ml	500 mg	5 ml	
11 kg	275 mg à 550 mg	2,8 ml à 5,5 ml	550 mg	5,5 ml	
12 kg	300 mg à 600 mg	3 ml à 6 ml	600 mg	6 ml	
13 kg	325 mg à 650 mg	3,3 ml à 6,5 ml	650 mg	6,5 ml	
14 kg	350 mg à 700 mg	3,5 ml à 7 ml	700 mg	7 ml	
15 kg	375 mg à 750 mg	3,8 ml à 7,5 ml	750 mg	7,5 ml	
16 kg	400 mg à 800 mg	4 ml à 8 ml	800 mg	8 ml	
17 kg	425 mg à 850 mg	4,3 ml à 8,5 ml	850 mg	8,5 ml	
18 kg	450 mg à 900 mg	4,5 ml à 9 ml	900 mg	9 ml	
19 kg	475 mg à 950 mg	4,8 ml à 9,5 ml	950 mg	9,5 ml	
20 kg	500 mg à 1000 mg	5 ml à 10 ml	1000 mg	10 ml	
21 kg	525 mg à 1050 mg	5,3 ml à 10,5 ml	1050 mg	10,5 ml	
22 kg	550 mg à 1100 mg	5,5 ml à 11 ml	1100 mg	11 ml	
23 kg	575 mg à 1150 mg	5,8 ml à 11,5 ml	1150 mg	11,5 ml	
24 kg	600 mg à 1200 mg	6 ml à 12 ml	1200 mg	12 ml	
25 kg	625 mg à 1250 mg	6,3 ml à 12,5 ml	1250 mg	12,5 ml	
26 kg	650 mg à 1300 mg	6,5 ml à 13 ml	1300 mg	13 ml	
27 kg	675 mg à 1350 mg	6,8 ml à 13,5 ml	1350 mg	13,5 ml	
28 kg	700 mg à 1400 mg	7 ml à 14 ml	1400 mg	14 ml	
29 kg	725 mg à 1450 mg	7,3 ml à 14,5 ml	1450 mg	14,5 ml	
30 kg	750 mg à 1500 mg	7,5 ml à 15 ml	1500 mg	15 ml	

Cloxacilline 2000 mg/ fiole (250 mg/ml) injectable IM

Orbenin®

Dose usuelle 100 à 200 mg/kg/j

max. 200 mg/kg/j

Poids	mg/dose usuelle	ml/dose usuelle	mg/dose maximale	ml/dose maximale	Fréquence d'administration
2 kg	50 mg à 100 mg	0,2 ml à 0,4 ml	100 mg	0,4 ml	q 6 h max. 12 g/j
3 kg	75 mg à 150 mg	0,3 ml à 0,6 ml	150 mg	0,6 ml	
4 kg	100 mg à 200 mg	0,4 ml à 0,8 ml	200 mg	0,8 ml	
5 kg	125 mg à 250 mg	0,5 ml à 1 ml	250 mg	1 ml	
6 kg	150 mg à 300 mg	0,6 ml à 1,2 ml	300 mg	1,2 ml	
7 kg	175 mg à 350 mg	0,7 ml à 1,4 ml	350 mg	1,4 ml	
8 kg	200 mg à 400 mg	0,8 ml à 1,6 ml	400 mg	1,6 ml	
9 kg	225 mg à 450 mg	0,9 ml à 1,8 ml	450 mg	1,8 ml	
10 kg	250 mg à 500 mg	1 ml à 2 ml	500 mg	2 ml	
11 kg	275 mg à 550 mg	1,1 ml à 2,2 ml	550 mg	2,2 ml	
12 kg	300 mg à 600 mg	1,2 ml à 2,4 ml	600 mg	2,4 ml	
13 kg	325 mg à 650 mg	1,3 ml à 2,6 ml	650 mg	2,6 ml	
14 kg	350 mg à 700 mg	1,4 ml à 2,8 ml	700 mg	2,8 ml	
15 kg	375 mg à 750 mg	1,5 ml à 3 ml	750 mg	3 ml	
16 kg	400 mg à 800 mg	1,6 ml à 3,2 ml	800 mg	3,2 ml	
17 kg	425 mg à 850 mg	1,7 ml à 3,4 ml	850 mg	3,4 ml	
18 kg	450 mg à 900 mg	1,8 ml à 3,6 ml	900 mg	3,6 ml	
19 kg	475 mg à 950 mg	1,9 ml à 3,8 ml	950 mg	3,8 ml	
20 kg	500 mg à 1000 mg	2 ml à 4 ml	1000 mg	4 ml	
21 kg	525 mg à 1050 mg	2,1 ml à 4,2 ml	1050 mg	4,2 ml	
22 kg	550 mg à 1100 mg	2,2 ml à 4,4 ml	1100 mg	4,4 ml	
23 kg	575 mg à 1150 mg	2,3 ml à 4,6 ml	1150 mg	4,6 ml	
24 kg	600 mg à 1200 mg	2,4 ml à 4,8 ml	1200 mg	4,8 ml	
25 kg	625 mg à 1250 mg	2,5 ml à 5 ml	1250 mg	5 ml	
26 kg	650 mg à 1300 mg	2,6 ml à 5,2 ml	1300 mg	5,2 ml	
27 kg	675 mg à 1350 mg	2,7 ml à 5,4 ml	1350 mg	5,4 ml	
28 kg	700 mg à 1400 mg	2,8 ml à 5,6 ml	1400 mg	5,6 ml	
29 kg	725 mg à 1450 mg	2,9 ml à 5,8 ml	1450 mg	5,8 ml	
30 kg	750 mg à 1500 mg	3 ml à 6 ml	1500 mg	6 ml	

Codéine sirop 5 mg/ml PO*

***Non recommandé pour les moins de 12 ans: voir avis Santé Canada**

Dose usuelle 0,5 à 1 mg/kg/dose

max. 1 mg/kg/dose

Poids	mg/dose usuelle	ml/dose usuelle	mg/dose maximale	ml/dose maximale	Fréquence d'administration
2 kg	1 mg à 2 mg	0,2 ml à 0,4 ml	2 mg	0,4 ml	q 4 à 6 h
3 kg	1,5 mg à 3 mg	0,3 ml à 0,6 ml	3 mg	0,6 ml	
4 kg	2 mg à 4 mg	0,4 ml à 0,8 ml	4 mg	0,8 ml	
5 kg	2,5 mg à 5 mg	0,5 ml à 1 ml	5 mg	1 ml	
6 kg	3 mg à 6 mg	0,6 ml à 1,2 ml	6 mg	1,2 ml	
7 kg	3,5 mg à 7 mg	0,7 ml à 1,4 ml	7 mg	1,4 ml	
8 kg	4 mg à 8 mg	0,8 ml à 1,6 ml	8 mg	1,6 ml	
9 kg	4,5 mg à 9 mg	0,9 ml à 1,8 ml	9 mg	1,8 ml	
10 kg	5 mg à 10 mg	1 ml à 2 ml	10 mg	2 ml	
11 kg	5,5 mg à 11 mg	1,1 ml à 2,2 ml	11 mg	2,2 ml	
12 kg	6 mg à 12 mg	1,2 ml à 2,4 ml	12 mg	2,4 ml	<u>ATTENTION NON RECOMMANDÉ POUR LES MOINS DE 12 ANS</u>
13 kg	6,5 mg à 13 mg	1,3 ml à 2,6 ml	13 mg	2,6 ml	
14 kg	7 mg à 14 mg	1,4 ml à 2,8 ml	14 mg	2,8 ml	
15 kg	7,5 mg à 15 mg	1,5 ml à 3 ml	15 mg	3 ml	
16 kg	8 mg à 16 mg	1,6 ml à 3,2 ml	16 mg	3,2 ml	
17 kg	8,5 mg à 17 mg	1,7 ml à 3,4 ml	17 mg	3,4 ml	
18 kg	9 mg à 18 mg	1,8 ml à 3,6 ml	18 mg	3,6 ml	max. 60 mg/dose
19 kg	9,5 mg à 19 mg	1,9 ml à 3,8 ml	19 mg	3,8 ml	
20 kg	10 mg à 20 mg	2 ml à 4 ml	20 mg	4 ml	
21 kg	10,5 mg à 21 mg	2,1 ml à 4,2 ml	21 mg	4,2 ml	
22 kg	11 mg à 22 mg	2,2 ml à 4,4 ml	22 mg	4,4 ml	
23 kg	11,5 mg à 23 mg	2,3 ml à 4,6 ml	23 mg	4,6 ml	
24 kg	12 mg à 24 mg	2,4 ml à 4,8 ml	24 mg	4,8 ml	
25 kg	12,5 mg à 25 mg	2,5 ml à 5 ml	25 mg	5 ml	
26 kg	13 mg à 26 mg	2,6 ml à 5,2 ml	26 mg	5,2 ml	
27 kg	13,5 mg à 27 mg	2,7 ml à 5,4 ml	27 mg	5,4 ml	
28 kg	14 mg à 28 mg	2,8 ml à 5,6 ml	28 mg	5,6 ml	
29 kg	14,5 mg à 29 mg	2,9 ml à 5,8 ml	29 mg	5,8 ml	
30 kg	15 mg à 30 mg	3 ml à 6 ml	30 mg	6 ml	

Dexamethasone 1 mg/ml solution orale PO

Decadron[®]

Dose usuelle 0,15 mg à 0.6 mg/kg/dose

max.: 2mg/kg/dose

Poids	mg/dose usuelle	ml/dose usuelle	mg/dose maximale	ml/dose maximale	Fréquence d'administration
2 kg	0,3 mg à 1,2 mg	0,3 ml à 1,2 ml	4 mg	4 ml	X 1 dose
3 kg	0,45 mg à 1,8 mg	0,45 ml à 1,8 ml	6 mg	6 ml	
4 kg	0,6 mg à 2,4 mg	0,6 ml à 2,4 ml	8 mg	8 ml	
5 kg	0,75 mg à 3 mg	0,75 ml à 3 ml	10 mg	10 ml	
6 kg	0,9 mg à 3,6 mg	0,9 ml à 3,6 ml	12 mg	12 ml	
7 kg	1,1 mg à 4,2 mg	1,1 ml à 4,2 ml	14 mg	14 ml	
8 kg	1,2 mg à 4,8 mg	1,2 ml à 4,8 ml	16 mg	16 ml	
9 kg	1,4 mg à 5,4 mg	1,4 ml à 5,4 ml	18 mg	18 ml	
10 kg	1,5 mg à 6 mg	1,5 ml à 6 ml	20 mg	20 ml	
11 kg	1,7 mg à 6,6 mg	1,7 ml à 6,6 ml	20 mg	20 ml	
12 kg	1,8 mg à 7,2 mg	1,8 ml à 7,2 ml	20 mg	20 ml	
13 kg	2 mg à 7,8 mg	2 ml à 7,8 ml	20 mg	20 ml	
14 kg	2,1 mg à 8,4 mg	2,1 ml à 8,4 ml	20 mg	20 ml	
15 kg	2,3 mg à 9 mg	2,3 ml à 9 ml	20 mg	20 ml	
16 kg	2,4 mg à 9,6 mg	2,4 ml à 9,6 ml	20 mg	20 ml	
17 kg	2,6 mg à 10,2 mg	2,6 ml à 10,2 ml	20 mg	20 ml	
18 kg	2,7 mg à 10,8 mg	2,7 ml à 10,8 ml	20 mg	20 ml	
19 kg	2,9 mg à 11,4 mg	2,9 ml à 11,4 ml	20 mg	20 ml	
20 kg	3 mg à 12 mg	3 ml à 12 ml	20 mg	20 ml	
21 kg	3,2 mg à 12,6 mg	3,2 ml à 12,6 ml	20 mg	20 ml	
22 kg	3,3 mg à 13,2 mg	3,3 ml à 13,2 ml	20 mg	20 ml	
23 kg	3,5 mg à 13,8 mg	3,5 ml à 13,8 ml	20 mg	20 ml	
24 kg	3,6 mg à 14,4 mg	3,6 ml à 14,4 ml	20 mg	20 ml	
25 kg	3,8 mg à 15 mg	3,8 ml à 15 ml	20 mg	20 ml	
26 kg	3,9 mg à 15,6 mg	3,9 ml à 15,6 ml	20 mg	20 ml	
27 kg	4,1 mg à 16,2 mg	4,1 ml à 16,2 ml	20 mg	20 ml	
28 kg	4,2 mg à 16,8 mg	4,2 ml à 16,8 ml	20 mg	20 ml	
29 kg	4,4 mg à 17,4 mg	4,4 ml à 17,4 ml	20 mg	20 ml	
30 kg	4,5 mg à 18 mg	4,5 ml à 18 ml	20 mg	20 ml	

Laryngite/asthme
max: 15 mg/dose

OEdème cérébral
max: 10 mg/dose

Anti-émétique
max: 20 mg/dose

Dexamethasone 4 mg/ml fiole injectable pour usage PO

Decadron[®]

Dose usuelle 0,15 mg à 0.6 mg/kg/dose

max.: 2mg/kg/dose

Poids	mg/dose usuelle	ml/dose usuelle	mg/dose maximale	ml/dose maximale	Fréquence d'administration
2 kg	0,3 mg à 1,2 mg	0,08 ml à 0,3 ml	4 mg	1 ml	X 1 dose
3 kg	0,45 mg à 1,8 mg	0,11 ml à 0,45 ml	6 mg	1,5 ml	
4 kg	0,6 mg à 2,4 mg	0,15 ml à 0,6 ml	8 mg	2 ml	
5 kg	0,75 mg à 3 mg	0,19 ml à 0,75 ml	10 mg	2,5 ml	
6 kg	0,9 mg à 3,6 mg	0,23 ml à 0,9 ml	12 mg	3 ml	
7 kg	1,1 mg à 4,2 mg	0,26 ml à 1,1 ml	14 mg	3,5 ml	
8 kg	1,2 mg à 4,8 mg	0,3 ml à 1,2 ml	16 mg	4 ml	
9 kg	1,4 mg à 5,4 mg	0,34 ml à 1,4 ml	18 mg	4,5 ml	
10 kg	1,5 mg à 6 mg	0,38 ml à 1,5 ml	20 mg	5 ml	
11 kg	1,7 mg à 6,6 mg	0,41 ml à 1,7 ml	20 mg	5 ml	
12 kg	1,8 mg à 7,2 mg	0,45 ml à 1,8 ml	20 mg	5 ml	Laryngite/asthme max: 15 mg/dose
13 kg	2 mg à 7,8 mg	0,49 ml à 2 ml	20 mg	5 ml	
14 kg	2,1 mg à 8,4 mg	0,53 ml à 2,1 ml	20 mg	5 ml	
15 kg	2,3 mg à 9 mg	0,56 ml à 2,3 ml	20 mg	5 ml	
16 kg	2,4 mg à 9,6 mg	0,6 ml à 2,4 ml	20 mg	5 ml	
17 kg	2,6 mg à 10,2 mg	0,64 ml à 2,6 ml	20 mg	5 ml	
18 kg	2,7 mg à 10,8 mg	0,68 ml à 2,7 ml	20 mg	5 ml	
19 kg	2,9 mg à 11,4 mg	0,71 ml à 2,9 ml	20 mg	5 ml	
20 kg	3 mg à 12 mg	0,75 ml à 3 ml	20 mg	5 ml	
21 kg	3,2 mg à 12,6 mg	0,79 ml à 3,2 ml	20 mg	5 ml	
22 kg	3,3 mg à 13,2 mg	0,83 ml à 3,3 ml	20 mg	5 ml	OEdème cérébral max: 10 mg/dose
23 kg	3,5 mg à 13,8 mg	0,86 ml à 3,5 ml	20 mg	5 ml	
24 kg	3,6 mg à 14,4 mg	0,9 ml à 3,6 ml	20 mg	5 ml	
25 kg	3,8 mg à 15 mg	0,94 ml à 3,8 ml	20 mg	5 ml	
26 kg	3,9 mg à 15,6 mg	0,98 ml à 3,9 ml	20 mg	5 ml	
27 kg	4,1 mg à 16,2 mg	1 ml à 4,1 ml	20 mg	5 ml	
28 kg	4,2 mg à 16,8 mg	1,1 ml à 4,2 ml	20 mg	5 ml	
29 kg	4,4 mg à 17,4 mg	1,1 ml à 4,4 ml	20 mg	5 ml	
30 kg	4,5 mg à 18 mg	1,1 ml à 4,5 ml	20 mg	5 ml	

Donner sans rediluer ou rediluer avec un volume égal de de sirop simple pour améliorer le goût

Dimenhydrinate 50 mg/co
Dimenhydrinate 25 mg/supp. intrarectal
Gravol®

Dose usuelle 1,25 mg/kg/dose

max.: 1,25 mg/kg/dose

Poids	mg/dose usuelle	ml/dose usuelle	mg/dose maximale	ml/dose maximale	Fréquence d'administration
2 kg	* Formulations ne permettent pas usage de dose < 12,5 mg *				q 6 h max. 300 mg/j ou 5 mg/kg/j
3 kg					
4 kg					
5 kg					
6 kg					
7 kg					
8 kg					
9 kg					
10 kg					
11 kg	12,5 mg	½ supp. ou ¼ co.	12,5 mg	½ supp. ou ¼ co.	
12 kg	12,5 mg	½ supp. ou ¼ co.	12,5 mg	½ supp. ou ¼ co.	
13 kg	12,5 mg	½ supp. ou ¼ co.	12,5 mg	½ supp. ou ¼ co.	
14 kg	12,5 mg	½ supp. ou ¼ co.	12,5 mg	½ supp. ou ¼ co.	
15 kg	12,5 mg	½ supp. ou ¼ co.	12,5 mg	½ supp. ou ¼ co.	
16 kg	12,5 mg	½ supp. ou ¼ co.	12,5 mg	½ supp. ou ¼ co.	
17 kg	12,5 mg	½ supp. ou ¼ co.	12,5 mg	½ supp. ou ¼ co.	
18 kg	12,5 mg	½ supp. ou ¼ co.	12,5 mg	½ supp. ou ¼ co.	
19 kg	12,5 mg	½ supp. ou ¼ co.	12,5 mg	½ supp. ou ¼ co.	
20 kg	25 mg	1 supp. ou ½ co.	25 mg	1 supp. ou ½ co.	
21 kg	25 mg	1 supp. ou ½ co.	25 mg	1 supp. ou ½ co.	
22 kg	25 mg	1 supp. ou ½ co.	25 mg	1 supp. ou ½ co.	
23 kg	25 mg	1 supp. ou ½ co.	25 mg	1 supp. ou ½ co.	
24 kg	25 mg	1 supp. ou ½ co.	25 mg	1 supp. ou ½ co.	
25 kg	25 mg	1 supp. ou ½ co.	25 mg	1 supp. ou ½ co.	
26 kg	25 mg	1 supp. ou ½ co.	25 mg	1 supp. ou ½ co.	
27 kg	25 mg	1 supp. ou ½ co.	25 mg	1 supp. ou ½ co.	
28 kg	25 mg	1 supp. ou ½ co.	25 mg	1 supp. ou ½ co.	
29 kg	25 mg	1 supp. ou ½ co.	25 mg	1 supp. ou ½ co.	
30 kg	37,5 mg	1½ supp. ou ¾ co.	37,5 mg	1½ supp. ou ¾ co.	

Dimenhydrinate 50 mg/ml injectable IV/IM

Gravol®

Dose usuelle 1,25 mg/kg/dose

max. 1,25 mg/kg/dose

Poids	mg/dose usuelle	ml/dose usuelle	mg/dose maximale	ml/dose maximale	Fréquence d'administration
2 kg	2,5 mg	0,05 ml	2,5 mg	0,05 ml	q 6 h max. 300 mg/j ou 5 mg/kg/j
3 kg	3,8 mg	0,08 ml	3,8 mg	0,08 ml	
4 kg	5 mg	0,1 ml	5 mg	0,1 ml	
5 kg	6,3 mg	0,13 ml	6,3 mg	0,13 ml	
6 kg	7,5 mg	0,15 ml	7,5 mg	0,15 ml	
7 kg	8,8 mg	0,18 ml	8,8 mg	0,18 ml	
8 kg	10 mg	0,2 ml	10 mg	0,2 ml	
9 kg	11,3 mg	0,23 ml	11,3 mg	0,23 ml	
10 kg	12,5 mg	0,25 ml	12,5 mg	0,25 ml	
11 kg	13,8 mg	0,28 ml	13,8 mg	0,28 ml	
12 kg	15 mg	0,3 ml	15 mg	0,3 ml	
13 kg	16,3 mg	0,33 ml	16,3 mg	0,33 ml	
14 kg	17,5 mg	0,35 ml	17,5 mg	0,35 ml	
15 kg	18,8 mg	0,38 ml	18,8 mg	0,38 ml	
16 kg	20 mg	0,4 ml	20 mg	0,4 ml	
17 kg	21,3 mg	0,43 ml	21,3 mg	0,43 ml	
18 kg	22,5 mg	0,45 ml	22,5 mg	0,45 ml	
19 kg	23,8 mg	0,48 ml	23,8 mg	0,48 ml	
20 kg	25 mg	0,5 ml	25 mg	0,5 ml	
21 kg	26,3 mg	0,53 ml	26,3 mg	0,53 ml	
22 kg	27,5 mg	0,55 ml	27,5 mg	0,55 ml	
23 kg	28,8 mg	0,58 ml	28,8 mg	0,58 ml	
24 kg	30 mg	0,6 ml	30 mg	0,6 ml	
25 kg	31,3 mg	0,63 ml	31,3 mg	0,63 ml	
26 kg	32,5 mg	0,65 ml	32,5 mg	0,65 ml	
27 kg	33,8 mg	0,68 ml	33,8 mg	0,68 ml	
28 kg	35 mg	0,7 ml	35 mg	0,7 ml	
29 kg	36,3 mg	0,73 ml	36,3 mg	0,73 ml	
30 kg	37,5 mg	0,75 ml	37,5 mg	0,75 ml	

Diphenhydramine 1,25 mg/ml PO

Benadryl[®] sirop

Dose usuelle 1 à 1,25 mg/kg/dose

max. 1,5 mg/kg/dose

Poids	mg/dose usuelle	ml/dose usuelle	mg/dose maximale	ml/dose maximale	Fréquence d'administration
2 kg	2 mg à 2,5 mg	1,6 ml à 2 ml	3 mg	2,4 ml	q 6 h max. 5 mg/kg/j
3 kg	3 mg à 3,75 mg	2,4 ml à 3 ml	4,5 mg	3,6 ml	
4 kg	4 mg à 5 mg	3,2 ml à 4 ml	6 mg	4,8 ml	
5 kg	5 mg à 6,25 mg	4 ml à 5 ml	7,5 mg	6 ml	
6 kg	6 mg à 7,5 mg	4,8 ml à 6 ml	9 mg	7,2 ml	
7 kg	7 mg à 8,75 mg	5,6 ml à 7 ml	10,5 mg	8,4 ml	
8 kg	8 mg à 10 mg	6,4 ml à 8 ml	12 mg	9,6 ml	
9 kg	9 mg à 11,3 mg	7,2 ml à 9 ml	13,5 mg	10,8 ml	
10 kg	10 mg à 12,5 mg	8 ml à 10 ml	15 mg	12 ml	
11 kg	11 mg à 13,8 mg	8,8 ml à 11 ml	16,5 mg	13,2 ml	
12 kg	12 mg à 15 mg	9,6 ml à 12 ml	18 mg	14,4 ml	
13 kg	13 mg à 16,3 mg	10,4 ml à 13 ml	19,5 mg	15,6 ml	
14 kg	14 mg à 17,5 mg	11,2 ml à 14 ml	21 mg	16,8 ml	
15 kg	15 mg à 18,8 mg	12 ml à 15 ml	22,5 mg	18 ml	
16 kg	16 mg à 20 mg	12,8 ml à 16 ml	24 mg	19,2 ml	
17 kg	17 mg à 21,3 mg	13,6 ml à 17 ml	25,5 mg	20,4 ml	
18 kg	18 mg à 22,5 mg	14,4 ml à 18 ml	27 mg	21,6 ml	
19 kg	19 mg à 23,8 mg	15,2 ml à 19 ml	28,5 mg	22,8 ml	
20 kg	20 mg à 25 mg	16 ml à 20 ml	30 mg	24 ml	
21 kg	21 mg à 26,3 mg	16,8 ml à 21 ml	31,5 mg	25,2 ml	
22 kg	22 mg à 27,5 mg	17,6 ml à 22 ml	33 mg	26,4 ml	
23 kg	23 mg à 28,8 mg	18,4 ml à 23 ml	34,5 mg	27,6 ml	
24 kg	24 mg à 30 mg	19,2 ml à 24 ml	36 mg	28,8 ml	
25 kg	25 mg à 31,3 mg	20 ml à 25 ml	37,5 mg	30 ml	
26 kg	26 mg à 32,5 mg	20,8 ml à 26 ml	39 mg	31,2 ml	
27 kg	27 mg à 33,8 mg	21,6 ml à 27 ml	40,5 mg	32,4 ml	
28 kg	28 mg à 35 mg	22,4 ml à 28 ml	42 mg	33,6 ml	
29 kg	29 mg à 36,3 mg	23,2 ml à 29 ml	43,5 mg	34,8 ml	
30 kg	30 mg à 37,5 mg	24 ml à 30 ml	45 mg	36 ml	

Diphenhydramine 50 mg/ml injectable IV/IM

Benadryl®

Dose usuelle 0,5 à 1,25 mg/kg/dose

max. 2 mg/kg/dose

Poids	mg/dose usuelle	ml/dose usuelle	mg/dose maximale	ml/dose maximale	Fréquence d'administration
2 kg	1 mg à 2,5 mg	0,02 ml à 0,05 ml	4 mg	0,08 ml	q 6 h max. 50 mg/dose ou 5 mg/kg/j
3 kg	1,5 mg à 3,8 mg	0,03 ml à 0,08 ml	6 mg	0,12 ml	
4 kg	2 mg à 5 mg	0,04 ml à 0,1 ml	8 mg	0,16 ml	
5 kg	2,5 mg à 6,3 mg	0,05 ml à 0,13 ml	10 mg	0,2 ml	
6 kg	3 mg à 7,5 mg	0,06 ml à 0,15 ml	12 mg	0,24 ml	
7 kg	3,5 mg à 8,8 mg	0,07 ml à 0,18 ml	14 mg	0,28 ml	
8 kg	4 mg à 10 mg	0,08 ml à 0,2 ml	16 mg	0,32 ml	
9 kg	4,5 mg à 11,3 mg	0,09 ml à 0,23 ml	18 mg	0,36 ml	
10 kg	5 mg à 12,5 mg	0,1 ml à 0,25 ml	20 mg	0,4 ml	
11 kg	5,5 mg à 13,8 mg	0,11 ml à 0,28 ml	22 mg	0,44 ml	
12 kg	6 mg à 15 mg	0,12 ml à 0,3 ml	24 mg	0,48 ml	
13 kg	6,5 mg à 16,3 mg	0,13 ml à 0,33 ml	26 mg	0,52 ml	
14 kg	7 mg à 17,5 mg	0,14 ml à 0,35 ml	28 mg	0,56 ml	
15 kg	7,5 mg à 18,8 mg	0,15 ml à 0,38 ml	30 mg	0,6 ml	
16 kg	8 mg à 20 mg	0,16 ml à 0,4 ml	32 mg	0,64 ml	
17 kg	8,5 mg à 21,3 mg	0,17 ml à 0,43 ml	34 mg	0,68 ml	
18 kg	9 mg à 22,5 mg	0,18 ml à 0,45 ml	36 mg	0,72 ml	
19 kg	9,5 mg à 23,8 mg	0,19 ml à 0,48 ml	38 mg	0,76 ml	
20 kg	10 mg à 25 mg	0,2 ml à 0,5 ml	40 mg	0,8 ml	
21 kg	10,5 mg à 26,3 mg	0,21 ml à 0,53 ml	42 mg	0,84 ml	
22 kg	11 mg à 27,5 mg	0,22 ml à 0,55 ml	44 mg	0,88 ml	
23 kg	11,5 mg à 28,8 mg	0,23 ml à 0,58 ml	46 mg	0,92 ml	
24 kg	12 mg à 30 mg	0,24 ml à 0,6 ml	48 mg	0,96 ml	
25 kg	12,5 mg à 31,3 mg	0,25 ml à 0,63 ml	50 mg	1 ml	
26 kg	13 mg à 32,5 mg	0,26 ml à 0,65 ml	50 mg	1 ml	
27 kg	13,5 mg à 33,8 mg	0,27 ml à 0,68 ml	50 mg	1 ml	
28 kg	14 mg à 35 mg	0,28 ml à 0,7 ml	50 mg	1 ml	
29 kg	14,5 mg à 36,3 mg	0,29 ml à 0,73 ml	50 mg	1 ml	
30 kg	15 mg à 37,5 mg	0,3 ml à 0,75 ml	50 mg	1 ml	

Ertapenem 1000mg (dilué à 100 mg/ml) injectable IV

Invanz®

Dose usuelle 15 mg/kg/dose Dose max 15 mg/kg/dose

Poids	mg/dose usuelle	ml/dose usuelle	mg/dose maximale	ml/dose maximale	Fréquence d'administration
2 kg	30 mg	0,3 ml	30 mg	0,3 ml	Nourrisson >3 mois et enfant: q12h Dose max: 1000 mg par jour
3 kg	45 mg	0,45 ml	45 mg	0,45 ml	
4 kg	60 mg	0,6 ml	60 mg	0,6 ml	
5 kg	75 mg	0,75 ml	75 mg	0,75 ml	
6 kg	90 mg	0,9 ml	90 mg	0,9 ml	
7 kg	105 mg	1,1 ml	105 mg	1,1 ml	
8 kg	120 mg	1,2 ml	120 mg	1,2 ml	
9 kg	135 mg	1,4 ml	135 mg	1,4 ml	
10 kg	150 mg	1,5 ml	150 mg	1,5 ml	
11 kg	165 mg	1,7 ml	165 mg	1,7 ml	
12 kg	180 mg	1,8 ml	180 mg	1,8 ml	
13 kg	195 mg	2 ml	195 mg	2 ml	
14 kg	210 mg	2,1 ml	210 mg	2,1 ml	
15 kg	225 mg	2,3 ml	225 mg	2,3 ml	
16 kg	240 mg	2,4 ml	240 mg	2,4 ml	
17 kg	255 mg	2,6 ml	255 mg	2,6 ml	
18 kg	270 mg	2,7 ml	270 mg	2,7 ml	
19 kg	285 mg	2,9 ml	285 mg	2,9 ml	
20 kg	300 mg	3 ml	300 mg	3 ml	
21 kg	315 mg	3,2 ml	315 mg	3,2 ml	
22 kg	330 mg	3,3 ml	330 mg	3,3 ml	
23 kg	345 mg	3,5 ml	345 mg	3,5 ml	
24 kg	360 mg	3,6 ml	360 mg	3,6 ml	
25 kg	375 mg	3,8 ml	375 mg	3,8 ml	
26 kg	390 mg	3,9 ml	390 mg	3,9 ml	
27 kg	405 mg	4,1 ml	405 mg	4,1 ml	
28 kg	420 mg	4,2 ml	420 mg	4,2 ml	
29 kg	435 mg	4,4 ml	435 mg	4,4 ml	
30 kg	450 mg	4,5 ml	450 mg	4,5 ml	

Ertapenem 1000mg (dilué à 280 mg/ml) injectable IM

Invanz®

Dose usuelle 15 mg/kg/dose Dose max 15 mg/kg/dose

Poids	mg/dose usuelle	ml/dose usuelle	mg/dose maximale	ml/dose maximale	Fréquence d'administration
2 kg	30 mg	0,11 ml	30 mg	0,11 ml	Nourrisson >3 mois et enfant: q12h Dose max: 1000 mg par jour
3 kg	45 mg	0,16 ml	45 mg	0,16 ml	
4 kg	60 mg	0,21 ml	60 mg	0,21 ml	
5 kg	75 mg	0,27 ml	75 mg	0,27 ml	
6 kg	90 mg	0,32 ml	90 mg	0,32 ml	
7 kg	105 mg	0,38 ml	105 mg	0,38 ml	
8 kg	120 mg	0,43 ml	120 mg	0,43 ml	
9 kg	135 mg	0,48 ml	135 mg	0,48 ml	
10 kg	150 mg	0,54 ml	150 mg	0,54 ml	
11 kg	165 mg	0,59 ml	165 mg	0,59 ml	
12 kg	180 mg	0,64 ml	180 mg	0,64 ml	
13 kg	195 mg	0,7 ml	195 mg	0,7 ml	
14 kg	210 mg	0,75 ml	210 mg	0,75 ml	
15 kg	225 mg	0,8 ml	225 mg	0,8 ml	
16 kg	240 mg	0,86 ml	240 mg	0,86 ml	
17 kg	255 mg	0,91 ml	255 mg	0,91 ml	
18 kg	270 mg	0,96 ml	270 mg	0,96 ml	
19 kg	285 mg	1 ml	285 mg	1 ml	
20 kg	300 mg	1,1 ml	300 mg	1,1 ml	
21 kg	315 mg	1,1 ml	315 mg	1,1 ml	
22 kg	330 mg	1,2 ml	330 mg	1,2 ml	
23 kg	345 mg	1,2 ml	345 mg	1,2 ml	
24 kg	360 mg	1,3 ml	360 mg	1,3 ml	
25 kg	375 mg	1,3 ml	375 mg	1,3 ml	
26 kg	390 mg	1,4 ml	390 mg	1,4 ml	
27 kg	405 mg	1,4 ml	405 mg	1,4 ml	
28 kg	420 mg	1,5 ml	420 mg	1,5 ml	
29 kg	435 mg	1,6 ml	435 mg	1,6 ml	
30 kg	450 mg	1,6 ml	450 mg	1,6 ml	

Famotidine 10 mg/ml injectable IV

Pepcid®

Dose usuelle 0,25 à 0,5 mg/kg/dose

max. 0,5 mg/kg/dose

Poids	mg/dose usuelle	ml/dose usuelle	mg/dose maximale	ml/dose maximale	Fréquence d'administration
2 kg	0,5 mg à 1 mg	0,05 ml à 0,1 ml	1 mg	0,1 ml	q8-12h (sauf <3mois : 0,25mg/kg q24h) max 20mg/dose Rediluer ad 10ml de NaCl 0,9% (max 4mg/ml)
3 kg	0,8 mg à 1,5 mg	0,08 ml à 0,15 ml	1,5 mg	0,15 ml	
4 kg	1 mg à 2 mg	0,1 ml à 0,2 ml	2 mg	0,2 ml	
5 kg	1,3 mg à 2,5 mg	0,13 ml à 0,25 ml	2,5 mg	0,25 ml	
6 kg	1,5 mg à 3 mg	0,15 ml à 0,3 ml	3 mg	0,3 ml	
7 kg	1,8 mg à 3,5 mg	0,18 ml à 0,35 ml	3,5 mg	0,35 ml	
8 kg	2 mg à 4 mg	0,2 ml à 0,4 ml	4 mg	0,4 ml	
9 kg	2,3 mg à 4,5 mg	0,23 ml à 0,45 ml	4,5 mg	0,45 ml	
10 kg	2,5 mg à 5 mg	0,25 ml à 0,5 ml	5 mg	0,5 ml	
11 kg	2,8 mg à 5,5 mg	0,28 ml à 0,55 ml	5,5 mg	0,55 ml	
12 kg	3 mg à 6 mg	0,3 ml à 0,6 ml	6 mg	0,6 ml	
13 kg	3,3 mg à 6,5 mg	0,33 ml à 0,65 ml	6,5 mg	0,65 ml	
14 kg	3,5 mg à 7 mg	0,35 ml à 0,7 ml	7 mg	0,7 ml	
15 kg	3,8 mg à 7,5 mg	0,38 ml à 0,75 ml	7,5 mg	0,75 ml	
16 kg	4 mg à 8 mg	0,4 ml à 0,8 ml	8 mg	0,8 ml	
17 kg	4,3 mg à 8,5 mg	0,43 ml à 0,85 ml	8,5 mg	0,85 ml	
18 kg	4,5 mg à 9 mg	0,45 ml à 0,9 ml	9 mg	0,9 ml	
19 kg	4,8 mg à 9,5 mg	0,48 ml à 0,95 ml	9,5 mg	0,95 ml	
20 kg	5 mg à 10 mg	0,5 ml à 1 ml	10 mg	1 ml	
21 kg	5,3 mg à 10,5 mg	0,53 ml à 1,05 ml	10,5 mg	1,05 ml	
22 kg	5,5 mg à 11 mg	0,55 ml à 1,1 ml	11 mg	1,1 ml	
23 kg	5,8 mg à 11,5 mg	0,58 ml à 1,15 ml	11,5 mg	1,15 ml	
24 kg	6 mg à 12 mg	0,6 ml à 1,2 ml	12 mg	1,2 ml	
25 kg	6,3 mg à 12,5 mg	0,63 ml à 1,25 ml	12,5 mg	1,25 ml	
26 kg	6,5 mg à 13 mg	0,65 ml à 1,3 ml	13 mg	1,3 ml	
27 kg	6,8 mg à 13,5 mg	0,68 ml à 1,35 ml	13,5 mg	1,35 ml	
28 kg	7 mg à 14 mg	0,7 ml à 1,4 ml	14 mg	1,4 ml	
29 kg	7,3 mg à 14,5 mg	0,73 ml à 1,45 ml	14,5 mg	1,45 ml	
30 kg	7,5 mg à 15 mg	0,8 ml à 1,5 ml	15 mg	1,5 ml	

Utiliser la solution diluée à 0,2mg/ml pour les doses de 0-0,5mg (voir PandaWebRx)

Département de pharmacie

Révisé novembre 2023

Gentamicine 40 mg/ml injectable IV/IM Garamycine[™]

Attention : Se référer au tableau des doses néonatales (de tobramycine) si âge post conceptionnel inférieur à 45 semaines

Dose usuelle 1,7 mg à 2,5 mg/kg/dose

max. 7,5 mg/kg/dose
(dose unique quotidienne)

Poids	mg/dose usuelle	ml/dose usuelle	Fréquence d'administration	mg/dose maximale	ml/dose maximale	Fréquence d'administration
2 kg	3,4 mg à 5 mg	0,09 ml à 0,13 ml	q 8 h	15 mg	0,4 ml	q 24 h
3 kg	5,1 mg à 8 mg	0,13 ml à 0,19 ml		23 mg	0,6 ml	
4 kg	6,8 mg à 10 mg	0,17 ml à 0,25 ml		30 mg	0,8 ml	
5 kg	8,5 mg à 13 mg	0,21 ml à 0,31 ml		38 mg	0,9 ml	
6 kg	10 mg à 15 mg	0,26 ml à 0,38 ml		45 mg	1,1 ml	
7 kg	12 mg à 18 mg	0,3 ml à 0,44 ml		53 mg	1,3 ml	
8 kg	14 mg à 20 mg	0,34 ml à 0,5 ml		60 mg	1,5 ml	
9 kg	15 mg à 23 mg	0,38 ml à 0,56 ml		68 mg	1,7 ml	
10 kg	17 mg à 25 mg	0,43 ml à 0,63 ml		75 mg	1,9 ml	
11 kg	19 mg à 28 mg	0,47 ml à 0,69 ml		83 mg	2,1 ml	
12 kg	20 mg à 30 mg	0,51 ml à 0,75 ml		90 mg	2,3 ml	
13 kg	22 mg à 33 mg	0,55 ml à 0,81 ml		98 mg	2,4 ml	
14 kg	24 mg à 35 mg	0,6 ml à 0,88 ml		105 mg	2,6 ml	
15 kg	26 mg à 38 mg	0,64 ml à 0,94 ml		113 mg	2,8 ml	
16 kg	27 mg à 40 mg	0,68 ml à 1 ml		120 mg	3 ml	
17 kg	29 mg à 43 mg	0,72 ml à 1,1 ml		128 mg	3,2 ml	
18 kg	31 mg à 45 mg	0,77 ml à 1,1 ml		135 mg	3,4 ml	
19 kg	32 mg à 48 mg	0,81 ml à 1,2 ml		143 mg	3,6 ml	
20 kg	34 mg à 50 mg	0,85 ml à 1,3 ml		150 mg	3,8 ml	
21 kg	36 mg à 53 mg	0,89 ml à 1,3 ml		158 mg	3,9 ml	
22 kg	37 mg à 55 mg	0,94 ml à 1,4 ml		165 mg	4,1 ml	
23 kg	39 mg à 58 mg	0,98 ml à 1,4 ml		173 mg	4,3 ml	
24 kg	41 mg à 60 mg	1,02 ml à 1,5 ml		180 mg	4,5 ml	
25 kg	43 mg à 63 mg	1,06 ml à 1,6 ml		188 mg	4,7 ml	
26 kg	44 mg à 65 mg	1,11 ml à 1,6 ml		195 mg	4,9 ml	
27 kg	46 mg à 68 mg	1,15 ml à 1,7 ml		203 mg	5,1 ml	
28 kg	48 mg à 70 mg	1,19 ml à 1,8 ml		210 mg	5,3 ml	
29 kg	49 mg à 73 mg	1,23 ml à 1,8 ml		218 mg	5,4 ml	
30 kg	51 mg à 75 mg	1,3 ml à 1,9 ml		225 mg	5,6 ml	

Hydrate de Chloral 100 mg/ml PO

Noctec®

Dose usuelle 25 à 75 mg/kg/dose

max. 75 mg/kg/dose

Poids	mg/dose usuelle	ml/dose usuelle	mg/dose maximale	ml/dose maximale	Fréquence d'administration
2 kg	50 mg à 150 mg	0,5 ml à 1,5 ml	150 mg	1,5 ml	1 dose pré-procédure Dose maximale cumulative : 100 mg/kg ou 2 000 mg
3 kg	75 mg à 225 mg	0,8 ml à 2,3 ml	225 mg	2,3 ml	
4 kg	100 mg à 300 mg	1 ml à 3 ml	300 mg	3 ml	
5 kg	125 mg à 375 mg	1,3 ml à 3,8 ml	375 mg	3,8 ml	
6 kg	150 mg à 450 mg	1,5 ml à 4,5 ml	450 mg	4,5 ml	
7 kg	175 mg à 525 mg	1,8 ml à 5,3 ml	525 mg	5,3 ml	
8 kg	200 mg à 600 mg	2 ml à 6 ml	600 mg	6 ml	
9 kg	225 mg à 675 mg	2,3 ml à 6,8 ml	675 mg	6,8 ml	
10 kg	250 mg à 750 mg	2,5 ml à 7,5 ml	750 mg	7,5 ml	
11 kg	275 mg à 825 mg	2,8 ml à 8,3 ml	825 mg	8,3 ml	
12 kg	300 mg à 900 mg	3 ml à 9 ml	900 mg	9 ml	
13 kg	325 mg à 975 mg	3,3 ml à 9,8 ml	975 mg	9,8 ml	
14 kg	350 mg à 1050 mg	3,5 ml à 10,5 ml	1050 mg	10,5 ml	
15 kg	375 mg à 1125 mg	3,8 ml à 11,3 ml	1125 mg	11,3 ml	
16 kg	400 mg à 1200 mg	4 ml à 12 ml	1200 mg	12 ml	
17 kg	425 mg à 1275 mg	4,3 ml à 12,8 ml	1275 mg	12,8 ml	
18 kg	450 mg à 1350 mg	4,5 ml à 13,5 ml	1350 mg	13,5 ml	
19 kg	475 mg à 1425 mg	4,8 ml à 14,3 ml	1425 mg	14,3 ml	
20 kg	500 mg à 1500 mg	5 ml à 15 ml	1500 mg	15 ml	
21 kg	525 mg à 1575 mg	5,3 ml à 15,8 ml	1575 mg	15,8 ml	
22 kg	550 mg à 1650 mg	5,5 ml à 16,5 ml	1650 mg	16,5 ml	
23 kg	575 mg à 1725 mg	5,8 ml à 17,3 ml	1725 mg	17,3 ml	
24 kg	600 mg à 1800 mg	6 ml à 18 ml	1800 mg	18 ml	
25 kg	625 mg à 1875 mg	6,3 ml à 18,8 ml	1875 mg	18,8 ml	
26 kg	650 mg à 1950 mg	6,5 ml à 19,5 ml	1950 mg	19,5 ml	
27 kg	675 mg à 2000 mg	6,8 ml à 20 ml	2000 mg	20 ml	
28 kg	700 mg à 2000 mg	7 ml à 20 ml	2000 mg	20 ml	
29 kg	725 mg à 2000 mg	7,3 ml à 20 ml	2000 mg	20 ml	
30 kg	750 mg à 2000 mg	7,5 ml à 20 ml	2000 mg	20 ml	

Hydrocortisone 100 mg/fiole (dilué à 50 mg/ml) injectable IV

Solucortef®

Dose usuelle 0,5-5 mg/kg/dose

max 5 mg/kg

Poids	mg/dose usuelle	ml/dose usuelle	mg/dose maximale	ml/dose maximale	Fréquence d'administration
2 kg	1 mg à 10 mg	0,02 ml à 0,2 ml	10 mg	0,2 ml	q 12 à 24h variable selon indication
3 kg	1,5 mg à 15 mg	0,03 ml à 0,3 ml	15 mg	0,3 ml	
4 kg	2 mg à 20 mg	0,04 ml à 0,4 ml	20 mg	0,4 ml	
5 kg	2,5 mg à 25 mg	0,05 ml à 1 ml	25 mg	0,5 ml	
6 kg	3 mg à 30 mg	0,06 ml à 0,6 ml	30 mg	0,6 ml	
7 kg	3,5 mg à 35 mg	0,07 ml à 0,7 ml	35 mg	0,7 ml	
8 kg	4 mg à 40 mg	0,08 ml à 0,8 ml	40 mg	0,8 ml	
9 kg	4,5 mg à 45 mg	0,09 ml à 0,9 ml	45 mg	0,9 ml	
10 kg	5 mg à 50 mg	0,10 ml à 1 ml	50 mg	1 ml	
11 kg	5,5 mg à 55 mg	0,11 ml à 1,1 ml	55 mg	1,1 ml	
12 kg	6 mg à 60 mg	0,12 ml à 1,2 ml	60 mg	1,2 ml	
13 kg	6,5 mg à 65 mg	0,13 ml à 1,3 ml	65 mg	1,3 ml	
14 kg	7 mg à 70 mg	0,14 ml à 1,4 ml	70 mg	1,4 ml	
15 kg	7,5 mg à 75 mg	0,15 ml à 2 ml	75 mg	1,5 ml	
16 kg	8 mg à 80 mg	0,16 ml à 1,6 ml	80 mg	1,6 ml	
17 kg	8,5 mg à 85 mg	0,17 ml à 1,7 ml	85 mg	1,7 ml	
18 kg	9 mg à 90 mg	0,18 ml à 1,8 ml	90 mg	1,8 ml	
19 kg	9,5 mg à 95 mg	0,19 ml à 1,9 ml	95 mg	1,9 ml	
20 kg	10 mg à 100 mg	0,20 ml à 2 ml	100 mg	2 ml	
21 kg	10,5 mg à 105 mg	0,21 ml à 2,1 ml	105 mg	2,1 ml	
22 kg	11 mg à 110 mg	0,22 ml à 2,2 ml	110 mg	2,2 ml	
23 kg	11,5 mg à 115 mg	0,23 ml à 2,3 ml	115 mg	2,3 ml	
24 kg	12 mg à 120 mg	0,24 ml à 2,4 ml	120 mg	2,4 ml	
25 kg	12,5 mg à 125 mg	0,25 ml à 3 ml	125 mg	2,5 ml	
26 kg	13 mg à 130 mg	0,26 ml à 2,6 ml	130 mg	2,6 ml	
27 kg	13,5 mg à 135 mg	0,27 ml à 2,7 ml	135 mg	2,7 ml	
28 kg	14 mg à 140 mg	0,28 ml à 2,8 ml	140 mg	2,8 ml	
29 kg	14,5 mg à 145 mg	0,29 ml à 2,9 ml	145 mg	2,9 ml	
30 kg	15 mg à 150 mg	0,30 ml à 3 ml	150 mg	3 ml	

Utiliser la solution diluée à 10 mg/ml pour les doses de 0-2,5 mg (voir PandaWebRx)

Département de pharmacie

Révisé mars 2024

Hydrocortisone 250 mg/fiole (dilué à 125 mg/ml) injectable IV

Solucortef®

Dose usuelle 0,5-5 mg/kg/dose

max 5 mg/kg

Poids	mg/dose usuelle	ml/dose usuelle	mg/dose maximale	ml/dose maximale	Fréquence d'administration
2 kg	1 mg à 10 mg	0,01 ml à 0,08 ml	10 mg	0,08 ml	q 12 à 24h variable selon indication
3 kg	1,5 mg à 15 mg	0,01 ml à 0,12 ml	15 mg	0,12 ml	
4 kg	2 mg à 20 mg	0,02 ml à 0,16 ml	20 mg	0,16 ml	
5 kg	2,5 mg à 25 mg	0,02 ml à 0,2 ml	25 mg	0,2 ml	
6 kg	3 mg à 30 mg	0,02 ml à 0,24 ml	30 mg	0,24 ml	
7 kg	3,5 mg à 35 mg	0,03 ml à 0,28 ml	35 mg	0,28 ml	
8 kg	4 mg à 40 mg	0,03 ml à 0,32 ml	40 mg	0,32 ml	
9 kg	4,5 mg à 45 mg	0,04 ml à 0,36 ml	45 mg	0,36 ml	
10 kg	5 mg à 50 mg	0,04 ml à 0,4 ml	50 mg	0,4 ml	
11 kg	5,5 mg à 55 mg	0,04 ml à 0,44 ml	55 mg	0,44 ml	
12 kg	6 mg à 60 mg	0,05 ml à 0,48 ml	60 mg	0,48 ml	
13 kg	6,5 mg à 65 mg	0,05 ml à 0,52 ml	65 mg	0,52 ml	
14 kg	7 mg à 70 mg	0,06 ml à 0,56 ml	70 mg	0,56 ml	
15 kg	7,5 mg à 75 mg	0,06 ml à 0,6 ml	75 mg	0,6 ml	
16 kg	8 mg à 80 mg	0,06 ml à 0,64 ml	80 mg	0,64 ml	
17 kg	8,5 mg à 85 mg	0,07 ml à 0,68 ml	85 mg	0,68 ml	
18 kg	9 mg à 90 mg	0,07 ml à 0,72 ml	90 mg	0,72 ml	
19 kg	9,5 mg à 95 mg	0,08 ml à 0,76 ml	95 mg	0,76 ml	
20 kg	10 mg à 100 mg	0,08 ml à 0,8 ml	100 mg	0,8 ml	
21 kg	10,5 mg à 105 mg	0,08 ml à 0,84 ml	105 mg	0,84 ml	
22 kg	11 mg à 110 mg	0,09 ml à 0,88 ml	110 mg	0,88 ml	
23 kg	11,5 mg à 115 mg	0,09 ml à 0,92 ml	115 mg	0,92 ml	
24 kg	12 mg à 120 mg	0,10 ml à 0,96 ml	120 mg	0,96 ml	
25 kg	12,5 mg à 125 mg	0,10 ml à 1 ml	125 mg	1 ml	
26 kg	13 mg à 130 mg	0,10 ml à 1 ml	130 mg	1 ml	
27 kg	13,5 mg à 135 mg	0,11 ml à 1,1 ml	135 mg	1,1 ml	
28 kg	14 mg à 140 mg	0,11 ml à 1,1 ml	140 mg	1,1 ml	
29 kg	14,5 mg à 145 mg	0,12 ml à 1,2 ml	145 mg	1,2 ml	
30 kg	15 mg à 150 mg	0,12 ml à 1,2 ml	150 mg	1,2 ml	

Utiliser la solution diluée à 10 mg/ml pour les doses de 0-2,5 mg (voir PandaWebRx)

Département de pharmacie

Révisé mars 2024

Hydroxyzine 2 mg/ml PO

Atarax® sirop

Dose usuelle 2 mg/kg/j

max. 4 mg/kg/j

Poids	mg/dose usuelle	ml/dose usuelle	mg/dose maximale	ml/dose maximale	Fréquence d'administration
2 kg	1 mg	0,5 ml	2 mg	1 ml	q 6 h
3 kg	1,5 mg	0,8 ml	3 mg	1,5 ml	
4 kg	2 mg	1 ml	4 mg	2 ml	
5 kg	2,5 mg	1,3 ml	5 mg	2,5 ml	
6 kg	3 mg	1,5 ml	6 mg	3 ml	
7 kg	3,5 mg	1,8 ml	7 mg	3,5 ml	
8 kg	4 mg	2 ml	8 mg	4 ml	
9 kg	4,5 mg	2,3 ml	9 mg	4,5 ml	
10 kg	5 mg	2,5 ml	10 mg	5 ml	
11 kg	5,5 mg	2,8 ml	11 mg	5,5 ml	
12 kg	6 mg	3 ml	12 mg	6 ml	
13 kg	6,5 mg	3,3 ml	13 mg	6,5 ml	
14 kg	7 mg	3,5 ml	14 mg	7 ml	
15 kg	7,5 mg	3,8 ml	15 mg	7,5 ml	
16 kg	8 mg	4 ml	16 mg	8 ml	
17 kg	8,5 mg	4,3 ml	17 mg	8,5 ml	
18 kg	9 mg	4,5 ml	18 mg	9 ml	
19 kg	9,5 mg	4,8 ml	19 mg	9,5 ml	
20 kg	10 mg	5 ml	20 mg	10 ml	
21 kg	10,5 mg	5,3 ml	21 mg	10,5 ml	
22 kg	11 mg	5,5 ml	22 mg	11 ml	
23 kg	11,5 mg	5,8 ml	23 mg	11,5 ml	
24 kg	12 mg	6 ml	24 mg	12 ml	
25 kg	12,5 mg	6,3 ml	25 mg	12,5 ml	
26 kg	13 mg	6,5 ml	26 mg	13 ml	
27 kg	13,5 mg	6,8 ml	27 mg	13,5 ml	
28 kg	14 mg	7 ml	28 mg	14 ml	
29 kg	14,5 mg	7,3 ml	29 mg	14,5 ml	
30 kg	15 mg	7,5 ml	30 mg	15 ml	

Ibuprofen 20 mg/ml PO

Motrin[®], Advil[®]

Dose usuelle 5 à 10 mg/kg/dose

max. 12,5 mg/kg/dose

(arthrite juvénile)

Poids	mg/dose usuelle	ml/dose usuelle	mg/dose maximale	ml/dose maximale	Fréquence d'administration
2 kg	10 mg à 20 mg	0,5 ml à 1 ml	25 mg	1,3 ml	q 6 - 8 h
3 kg	15 mg à 30 mg	0,8 ml à 1,5 ml	38 mg	1,9 ml	
4 kg	20 mg à 40 mg	1 ml à 2 ml	50 mg	2,5 ml	
5 kg	25 mg à 50 mg	1,3 ml à 2,5 ml	63 mg	3,1 ml	
6 kg	30 mg à 60 mg	1,5 ml à 3 ml	75 mg	3,8 ml	
7 kg	35 mg à 70 mg	1,8 ml à 3,5 ml	88 mg	4,4 ml	
8 kg	40 mg à 80 mg	2 ml à 4 ml	100 mg	5 ml	
9 kg	45 mg à 90 mg	2,3 ml à 4,5 ml	113 mg	5,6 ml	
10 kg	50 mg à 100 mg	2,5 ml à 5 ml	125 mg	6,3 ml	
11 kg	55 mg à 110 mg	2,8 ml à 5,5 ml	138 mg	6,9 ml	
12 kg	60 mg à 120 mg	3 ml à 6 ml	150 mg	7,5 ml	
13 kg	65 mg à 130 mg	3,3 ml à 6,5 ml	163 mg	8,1 ml	
14 kg	70 mg à 140 mg	3,5 ml à 7 ml	175 mg	8,8 ml	
15 kg	75 mg à 150 mg	3,8 ml à 7,5 ml	188 mg	9,4 ml	
16 kg	80 mg à 160 mg	4 ml à 8 ml	200 mg	10 ml	
17 kg	85 mg à 170 mg	4,3 ml à 8,5 ml	213 mg	10,6 ml	
18 kg	90 mg à 180 mg	4,5 ml à 9 ml	225 mg	11,3 ml	
19 kg	95 mg à 190 mg	4,8 ml à 9,5 ml	238 mg	11,9 ml	
20 kg	100 mg à 200 mg	5 ml à 10 ml	250 mg	12,5 ml	
21 kg	105 mg à 210 mg	5,3 ml à 10,5 ml	263 mg	13,1 ml	
22 kg	110 mg à 220 mg	5,5 ml à 11 ml	275 mg	13,8 ml	
23 kg	115 mg à 230 mg	5,8 ml à 11,5 ml	288 mg	14,4 ml	
24 kg	120 mg à 240 mg	6 ml à 12 ml	300 mg	15 ml	
25 kg	125 mg à 250 mg	6,3 ml à 12,5 ml	313 mg	15,6 ml	
26 kg	130 mg à 260 mg	6,5 ml à 13 ml	325 mg	16,3 ml	
27 kg	135 mg à 270 mg	6,8 ml à 13,5 ml	338 mg	16,9 ml	
28 kg	140 mg à 280 mg	7 ml à 14 ml	350 mg	17,5 ml	
29 kg	145 mg à 290 mg	7,3 ml à 14,5 ml	363 mg	18,1 ml	
30 kg	150 mg à 300 mg	7,5 ml à 15 ml	375 mg	18,8 ml	

****ATTENTION, bien vérifier la teneur, il existe aussi un format de 40mg/ml**

Ibuprofen 40 mg/ml PO

Motrin[®], Advil[®]

Dose usuelle 5 à 10 mg/kg/dose

max. 12,5 mg/kg/dose

(arthrite juvénile)

Poids	mg/dose usuelle	ml/dose usuelle	mg/dose maximale	ml/dose maximale	Fréquence d'administration
2 kg	10 mg à 20 mg	0,3 ml à 0,5 ml	25 mg	0,6 ml	q 6 - 8 h
3 kg	15 mg à 30 mg	0,4 ml à 0,8 ml	38 mg	0,9 ml	
4 kg	20 mg à 40 mg	0,5 ml à 1 ml	50 mg	1,3 ml	
5 kg	25 mg à 50 mg	0,6 ml à 1,3 ml	63 mg	1,6 ml	
6 kg	30 mg à 60 mg	0,8 ml à 1,5 ml	75 mg	1,9 ml	
7 kg	35 mg à 70 mg	0,9 ml à 1,8 ml	88 mg	2,2 ml	
8 kg	40 mg à 80 mg	1 ml à 2 ml	100 mg	2,5 ml	
9 kg	45 mg à 90 mg	1,1 ml à 2,3 ml	113 mg	2,8 ml	
10 kg	50 mg à 100 mg	1,3 ml à 2,5 ml	125 mg	3,1 ml	
11 kg	55 mg à 110 mg	1,4 ml à 2,8 ml	138 mg	3,4 ml	
12 kg	60 mg à 120 mg	1,5 ml à 3 ml	150 mg	3,8 ml	
13 kg	65 mg à 130 mg	1,6 ml à 3,3 ml	163 mg	4,1 ml	
14 kg	70 mg à 140 mg	1,8 ml à 3,5 ml	175 mg	4,4 ml	
15 kg	75 mg à 150 mg	1,9 ml à 3,8 ml	188 mg	4,7 ml	
16 kg	80 mg à 160 mg	2 ml à 4 ml	200 mg	5 ml	
17 kg	85 mg à 170 mg	2,1 ml à 4,3 ml	213 mg	5,3 ml	
18 kg	90 mg à 180 mg	2,3 ml à 4,5 ml	225 mg	5,6 ml	
19 kg	95 mg à 190 mg	2,4 ml à 4,8 ml	238 mg	5,9 ml	
20 kg	100 mg à 200 mg	2,5 ml à 5 ml	250 mg	6,3 ml	
21 kg	105 mg à 210 mg	2,6 ml à 5,3 ml	263 mg	6,6 ml	
22 kg	110 mg à 220 mg	2,8 ml à 5,5 ml	275 mg	6,9 ml	
23 kg	115 mg à 230 mg	2,9 ml à 5,8 ml	288 mg	7,2 ml	
24 kg	120 mg à 240 mg	3 ml à 6 ml	300 mg	7,5 ml	
25 kg	125 mg à 250 mg	3,1 ml à 6,3 ml	313 mg	7,8 ml	
26 kg	130 mg à 260 mg	3,3 ml à 6,5 ml	325 mg	8,1 ml	
27 kg	135 mg à 270 mg	3,4 ml à 6,8 ml	338 mg	8,4 ml	
28 kg	140 mg à 280 mg	3,5 ml à 7 ml	350 mg	8,8 ml	
29 kg	145 mg à 290 mg	3,6 ml à 7,3 ml	363 mg	9,1 ml	
30 kg	150 mg à 300 mg	3,8 ml à 7,5 ml	375 mg	9,4 ml	

****ATTENTION, bien vérifier la teneur, il existe aussi un format de 20mg/ml**

Imipenem-cilastatine 500 mg/fiole (dilué 50 mg/ml) injectable IV

Primaxin®

Dose usuelle 40 à 100 mg/kg/j

max. 100 mg/kg/j

Poids	mg/dose usuelle	ml/dose usuelle	mg/dose maximale	ml/dose maximale	Fréquence d'administration
2 kg	20 mg à 50 mg	0,4 ml à 1 ml	50 mg	1 ml	q 6 h max. 4 g/j
3 kg	30 mg à 75 mg	0,6 ml à 1,5 ml	75 mg	1,5 ml	
4 kg	40 mg à 100 mg	0,8 ml à 2 ml	100 mg	2 ml	
5 kg	50 mg à 125 mg	1 ml à 2,5 ml	125 mg	2,5 ml	
6 kg	60 mg à 150 mg	1,2 ml à 3 ml	150 mg	3 ml	
7 kg	70 mg à 175 mg	1,4 ml à 3,5 ml	175 mg	3,5 ml	
8 kg	80 mg à 200 mg	1,6 ml à 4 ml	200 mg	4 ml	
9 kg	90 mg à 225 mg	1,8 ml à 4,5 ml	225 mg	4,5 ml	
10 kg	100 mg à 250 mg	2 ml à 5 ml	250 mg	5 ml	
11 kg	110 mg à 275 mg	2,2 ml à 5,5 ml	275 mg	5,5 ml	
12 kg	120 mg à 300 mg	2,4 ml à 6 ml	300 mg	6 ml	
13 kg	130 mg à 325 mg	2,6 ml à 6,5 ml	325 mg	6,5 ml	
14 kg	140 mg à 350 mg	2,8 ml à 7 ml	350 mg	7 ml	
15 kg	150 mg à 375 mg	3 ml à 7,5 ml	375 mg	7,5 ml	
16 kg	160 mg à 400 mg	3,2 ml à 8 ml	400 mg	8 ml	
17 kg	170 mg à 425 mg	3,4 ml à 8,5 ml	425 mg	8,5 ml	
18 kg	180 mg à 450 mg	3,6 ml à 9 ml	450 mg	9 ml	
19 kg	190 mg à 475 mg	3,8 ml à 9,5 ml	475 mg	9,5 ml	
20 kg	200 mg à 500 mg	4 ml à 10 ml	500 mg	10 ml	
21 kg	210 mg à 525 mg	4,2 ml à 10,5 ml	525 mg	10,5 ml	
22 kg	220 mg à 550 mg	4,4 ml à 11 ml	550 mg	11 ml	
23 kg	230 mg à 575 mg	4,6 ml à 11,5 ml	575 mg	11,5 ml	
24 kg	240 mg à 600 mg	4,8 ml à 12 ml	600 mg	12 ml	
25 kg	250 mg à 625 mg	5 ml à 12,5 ml	625 mg	12,5 ml	
26 kg	260 mg à 650 mg	5,2 ml à 13 ml	650 mg	13 ml	
27 kg	270 mg à 675 mg	5,4 ml à 13,5 ml	675 mg	13,5 ml	
28 kg	280 mg à 700 mg	5,6 ml à 14 ml	700 mg	14 ml	
29 kg	290 mg à 725 mg	5,8 ml à 14,5 ml	725 mg	14,5 ml	
30 kg	300 mg à 750 mg	6 ml à 15 ml	750 mg	15 ml	

Ketamine 50 mg/ml fiole injectable pour administration PO

Ketalar[®]

Dose usuelle 4 à 10 mg/kg/dose

max. 10 mg/kg/dose

Poids	mg/dose usuelle	ml/dose usuelle	mg/dose maximale	ml/dose maximale	Fréquence d'administration
2 kg	8 mg à 20 mg	0,16 ml à 0,4 ml	20 mg	0,4 ml	1 dose 30 min. avant procédure
3 kg	12 mg à 30 mg	0,24 ml à 0,6 ml	30 mg	0,6 ml	
4 kg	16 mg à 40 mg	0,32 ml à 0,8 ml	40 mg	0,8 ml	
5 kg	20 mg à 50 mg	0,4 ml à 1 ml	50 mg	1 ml	
6 kg	24 mg à 60 mg	0,48 ml à 1,2 ml	60 mg	1,2 ml	
7 kg	28 mg à 70 mg	0,56 ml à 1,4 ml	70 mg	1,4 ml	
8 kg	32 mg à 80 mg	0,64 ml à 1,6 ml	80 mg	1,6 ml	
9 kg	36 mg à 90 mg	0,72 ml à 1,8 ml	90 mg	1,8 ml	
10 kg	40 mg à 100 mg	0,8 ml à 2 ml	100 mg	2 ml	
11 kg	44 mg à 110 mg	0,88 ml à 2,2 ml	110 mg	2,2 ml	
12 kg	48 mg à 120 mg	0,96 ml à 2,4 ml	120 mg	2,4 ml	
13 kg	52 mg à 130 mg	1 ml à 2,6 ml	130 mg	2,6 ml	
14 kg	56 mg à 140 mg	1,1 ml à 2,8 ml	140 mg	2,8 ml	
15 kg	60 mg à 150 mg	1,2 ml à 3 ml	150 mg	3 ml	
16 kg	64 mg à 160 mg	1,3 ml à 3,2 ml	160 mg	3,2 ml	
17 kg	68 mg à 170 mg	1,4 ml à 3,4 ml	170 mg	3,4 ml	
18 kg	72 mg à 180 mg	1,4 ml à 3,6 ml	180 mg	3,6 ml	
19 kg	76 mg à 190 mg	1,5 ml à 3,8 ml	190 mg	3,8 ml	
20 kg	80 mg à 200 mg	1,6 ml à 4 ml	200 mg	4 ml	
21 kg	84 mg à 210 mg	1,7 ml à 4,2 ml	210 mg	4,2 ml	
22 kg	88 mg à 220 mg	1,8 ml à 4,4 ml	220 mg	4,4 ml	
23 kg	92 mg à 230 mg	1,8 ml à 4,6 ml	230 mg	4,6 ml	
24 kg	96 mg à 240 mg	1,9 ml à 4,8 ml	240 mg	4,8 ml	
25 kg	100 mg à 250 mg	2 ml à 5 ml	250 mg	5 ml	
26 kg	104 mg à 260 mg	2,1 ml à 5,2 ml	260 mg	5,2 ml	
27 kg	108 mg à 270 mg	2,2 ml à 5,4 ml	270 mg	5,4 ml	
28 kg	112 mg à 280 mg	2,2 ml à 5,6 ml	280 mg	5,6 ml	
29 kg	116 mg à 290 mg	2,3 ml à 5,8 ml	290 mg	5,8 ml	
30 kg	120 mg à 300 mg	2,4 ml à 6 ml	300 mg	6 ml	

Ketamine 10 mg/ml injectable IV

Ketalar®

Dose usuelle 0,5 à 1 mg/kg/dose

max. 2 mg/kg/dose

Poids	mg/dose usuelle	ml/dose usuelle	mg/dose maximale	ml/dose maximale	Fréquence d'administration
2 kg	1 mg à 2 mg	0,1 ml à 0,2 ml	4 mg	0,4 ml	1 dose avant procédure
3 kg	1,5 mg à 3 mg	0,15 ml à 0,3 ml	6 mg	0,6 ml	
4 kg	2 mg à 4 mg	0,2 ml à 0,4 ml	8 mg	0,8 ml	
5 kg	2,5 mg à 5 mg	0,25 ml à 0,5 ml	10 mg	1 ml	
6 kg	3 mg à 6 mg	0,3 ml à 0,6 ml	12 mg	1,2 ml	
7 kg	3,5 mg à 7 mg	0,35 ml à 0,7 ml	14 mg	1,4 ml	
8 kg	4 mg à 8 mg	0,4 ml à 0,8 ml	16 mg	1,6 ml	
9 kg	4,5 mg à 9 mg	0,45 ml à 0,9 ml	18 mg	1,8 ml	
10 kg	5 mg à 10 mg	0,5 ml à 1 ml	20 mg	2 ml	
11 kg	5,5 mg à 11 mg	0,55 ml à 1,1 ml	22 mg	2,2 ml	
12 kg	6 mg à 12 mg	0,6 ml à 1,2 ml	24 mg	2,4 ml	
13 kg	6,5 mg à 13 mg	0,65 ml à 1,3 ml	26 mg	2,6 ml	
14 kg	7 mg à 14 mg	0,7 ml à 1,4 ml	28 mg	2,8 ml	
15 kg	7,5 mg à 15 mg	0,75 ml à 1,5 ml	30 mg	3 ml	
16 kg	8 mg à 16 mg	0,8 ml à 1,6 ml	32 mg	3,2 ml	
17 kg	8,5 mg à 17 mg	0,85 ml à 1,7 ml	34 mg	3,4 ml	
18 kg	9 mg à 18 mg	0,9 ml à 1,8 ml	36 mg	3,6 ml	
19 kg	9,5 mg à 19 mg	0,95 ml à 1,9 ml	38 mg	3,8 ml	
20 kg	10 mg à 20 mg	1 ml à 2 ml	40 mg	4 ml	
21 kg	10,5 mg à 21 mg	1,05 ml à 2,1 ml	42 mg	4,2 ml	
22 kg	11 mg à 22 mg	1,1 ml à 2,2 ml	44 mg	4,4 ml	
23 kg	11,5 mg à 23 mg	1,15 ml à 2,3 ml	46 mg	4,6 ml	
24 kg	12 mg à 24 mg	1,2 ml à 2,4 ml	48 mg	4,8 ml	
25 kg	12,5 mg à 25 mg	1,25 ml à 2,5 ml	50 mg	5 ml	
26 kg	13 mg à 26 mg	1,3 ml à 2,6 ml	52 mg	5,2 ml	
27 kg	13,5 mg à 27 mg	1,35 ml à 2,7 ml	54 mg	5,4 ml	
28 kg	14 mg à 28 mg	1,4 ml à 2,8 ml	56 mg	5,6 ml	
29 kg	14,5 mg à 29 mg	1,45 ml à 2,9 ml	58 mg	5,8 ml	
30 kg	15 mg à 30 mg	1,5 ml à 3 ml	60 mg	6 ml	

Ketamine 50 mg/ml injectable IM/SC

Ketalar[®]

Dose usuelle 0,5 à 1 mg/kg/dose

max. 2 mg/kg/dose

Poids	mg/dose usuelle	ml/dose usuelle	mg/dose maximale	ml/dose maximale	Fréquence d'administration
2 kg	1 mg à 2 mg	0,02 ml à 0,04 ml	4 mg	0,08 ml	x 1 dose
3 kg	1,5 mg à 3 mg	0,03 ml à 0,06 ml	6 mg	0,12 ml	
4 kg	2 mg à 4 mg	0,04 ml à 0,08 ml	8 mg	0,16 ml	
5 kg	2,5 mg à 5 mg	0,05 ml à 0,1 ml	10 mg	0,2 ml	
6 kg	3 mg à 6 mg	0,06 ml à 0,12 ml	12 mg	0,24 ml	
7 kg	3,5 mg à 7 mg	0,07 ml à 0,14 ml	14 mg	0,28 ml	
8 kg	4 mg à 8 mg	0,08 ml à 0,16 ml	16 mg	0,32 ml	
9 kg	4,5 mg à 9 mg	0,09 ml à 0,18 ml	18 mg	0,36 ml	
10 kg	5 mg à 10 mg	0,1 ml à 0,2 ml	20 mg	0,4 ml	
11 kg	5,5 mg à 11 mg	0,11 ml à 0,22 ml	22 mg	0,44 ml	
12 kg	6 mg à 12 mg	0,12 ml à 0,24 ml	24 mg	0,48 ml	
13 kg	6,5 mg à 13 mg	0,13 ml à 0,26 ml	26 mg	0,52 ml	
14 kg	7 mg à 14 mg	0,14 ml à 0,28 ml	28 mg	0,56 ml	
15 kg	7,5 mg à 15 mg	0,15 ml à 0,3 ml	30 mg	0,6 ml	
16 kg	8 mg à 16 mg	0,16 ml à 0,32 ml	32 mg	0,64 ml	
17 kg	8,5 mg à 17 mg	0,17 ml à 0,34 ml	34 mg	0,68 ml	
18 kg	9 mg à 18 mg	0,18 ml à 0,36 ml	36 mg	0,72 ml	
19 kg	9,5 mg à 19 mg	0,19 ml à 0,38 ml	38 mg	0,76 ml	
20 kg	10 mg à 20 mg	0,2 ml à 0,4 ml	40 mg	0,8 ml	
21 kg	10,5 mg à 21 mg	0,21 ml à 0,42 ml	42 mg	0,84 ml	
22 kg	11 mg à 22 mg	0,22 ml à 0,44 ml	44 mg	0,88 ml	
23 kg	11,5 mg à 23 mg	0,23 ml à 0,46 ml	46 mg	0,92 ml	
24 kg	12 mg à 24 mg	0,24 ml à 0,48 ml	48 mg	0,96 ml	
25 kg	12,5 mg à 25 mg	0,25 ml à 0,5 ml	50 mg	1 ml	
26 kg	13 mg à 26 mg	0,26 ml à 0,52 ml	52 mg	1 ml	
27 kg	13,5 mg à 27 mg	0,27 ml à 0,54 ml	54 mg	1,1 ml	
28 kg	14 mg à 28 mg	0,28 ml à 0,56 ml	56 mg	1,1 ml	
29 kg	14,5 mg à 29 mg	0,29 ml à 0,58 ml	58 mg	1,2 ml	
30 kg	15 mg à 30 mg	0,3 ml à 0,6 ml	60 mg	1,2 ml	

Lorazepam 4 mg/ml injectable IV

Ativan®

Dose usuelle 0,02 à 0,1 mg/kg/dose max. 0,1 mg/kg/dose

Poids	mg/dose usuelle	ml/dose usuelle	mg/dose maximale	ml/dose maximale	Fréquence d'administration
2 kg	0,04 mg à 0,2 mg	0,01 ml à 0,05 ml	0,2 mg	0,05 ml	max. 4 mg/dose
3 kg	0,06 mg à 0,3 mg	0,02 ml à 0,08 ml	0,3 mg	0,08 ml	
4 kg	0,08 mg à 0,4 mg	0,02 ml à 0,1 ml	0,4 mg	0,1 ml	
5 kg	0,1 mg à 0,5 mg	0,03 ml à 0,13 ml	0,5 mg	0,13 ml	
6 kg	0,12 mg à 0,6 mg	0,03 ml à 0,15 ml	0,6 mg	0,15 ml	
7 kg	0,14 mg à 0,7 mg	0,04 ml à 0,18 ml	0,7 mg	0,18 ml	
8 kg	0,16 mg à 0,8 mg	0,04 ml à 0,2 ml	0,8 mg	0,2 ml	
9 kg	0,18 mg à 0,9 mg	0,05 ml à 0,23 ml	0,9 mg	0,23 ml	
10 kg	0,2 mg à 1 mg	0,05 ml à 0,25 ml	1 mg	0,25 ml	
11 kg	0,22 mg à 1,1 mg	0,06 ml à 0,28 ml	1,1 mg	0,28 ml	
12 kg	0,24 mg à 1,2 mg	0,06 ml à 0,3 ml	1,2 mg	0,3 ml	
13 kg	0,26 mg à 1,3 mg	0,07 ml à 0,33 ml	1,3 mg	0,33 ml	
14 kg	0,28 mg à 1,4 mg	0,07 ml à 0,35 ml	1,4 mg	0,35 ml	
15 kg	0,3 mg à 1,5 mg	0,08 ml à 0,38 ml	1,5 mg	0,38 ml	
16 kg	0,32 mg à 1,6 mg	0,08 ml à 0,4 ml	1,6 mg	0,4 ml	
17 kg	0,34 mg à 1,7 mg	0,09 ml à 0,43 ml	1,7 mg	0,43 ml	
18 kg	0,36 mg à 1,8 mg	0,09 ml à 0,45 ml	1,8 mg	0,45 ml	
19 kg	0,38 mg à 1,9 mg	0,10 ml à 0,48 ml	1,9 mg	0,48 ml	
20 kg	0,4 mg à 2 mg	0,10 ml à 0,5 ml	2 mg	0,5 ml	
21 kg	0,42 mg à 2,1 mg	0,11 ml à 0,53 ml	2,1 mg	0,53 ml	
22 kg	0,44 mg à 2,2 mg	0,11 ml à 0,55 ml	2,2 mg	0,55 ml	
23 kg	0,46 mg à 2,3 mg	0,12 ml à 0,58 ml	2,3 mg	0,58 ml	
24 kg	0,48 mg à 2,4 mg	0,12 ml à 0,6 ml	2,4 mg	0,6 ml	
25 kg	0,5 mg à 2,5 mg	0,13 ml à 0,63 ml	2,5 mg	0,63 ml	
26 kg	0,52 mg à 2,6 mg	0,13 ml à 0,65 ml	2,6 mg	0,65 ml	
27 kg	0,54 mg à 2,7 mg	0,14 ml à 0,68 ml	2,7 mg	0,68 ml	
28 kg	0,56 mg à 2,8 mg	0,14 ml à 0,7 ml	2,8 mg	0,7 ml	
29 kg	0,58 mg à 2,9 mg	0,15 ml à 0,73 ml	2,9 mg	0,73 ml	
30 kg	0,6 mg à 3 mg	0,15 ml à 0,75 ml	3 mg	0,75 ml	

Utiliser la solution diluée à 1mg/ml pour les doses de 0-0,2mg (voir PandaWebRx)

Département de pharmacie

Révisé mars 2024

Meropenem 500 mg et 1000 mg/fiole (dilué 50 mg/ml) injectable IV

Merrem®

Dose usuelle 30 à 120 mg/kg/j

max. 120 mg/kg/j

Poids	mg/dose usuelle	ml/dose usuelle	mg/dose maximale	ml/dose maximale	Fréquence d'administration
2 kg	20 mg à 80 mg	0,4 ml à 1,6 ml	80 mg	1,6 ml	q 8 h max. 6 g/j
3 kg	30 mg à 120 mg	0,6 ml à 2,4 ml	120 mg	2,4 ml	
4 kg	40 mg à 160 mg	0,8 ml à 3,2 ml	160 mg	3,2 ml	
5 kg	50 mg à 200 mg	1 ml à 4 ml	200 mg	4 ml	
6 kg	60 mg à 240 mg	1,2 ml à 4,8 ml	240 mg	4,8 ml	
7 kg	70 mg à 280 mg	1,4 ml à 5,6 ml	280 mg	5,6 ml	
8 kg	80 mg à 320 mg	1,6 ml à 6,4 ml	320 mg	6,4 ml	
9 kg	90 mg à 360 mg	1,8 ml à 7,2 ml	360 mg	7,2 ml	
10 kg	100 mg à 400 mg	2 ml à 8 ml	400 mg	8 ml	
11 kg	110 mg à 440 mg	2,2 ml à 8,8 ml	440 mg	8,8 ml	
12 kg	120 mg à 480 mg	2,4 ml à 9,6 ml	480 mg	9,6 ml	
13 kg	130 mg à 520 mg	2,6 ml à 10,4 ml	520 mg	10,4 ml	
14 kg	140 mg à 560 mg	2,8 ml à 11,2 ml	560 mg	11,2 ml	
15 kg	150 mg à 600 mg	3 ml à 12 ml	600 mg	12 ml	
16 kg	160 mg à 640 mg	3,2 ml à 12,8 ml	640 mg	12,8 ml	
17 kg	170 mg à 680 mg	3,4 ml à 13,6 ml	680 mg	13,6 ml	
18 kg	180 mg à 720 mg	3,6 ml à 14,4 ml	720 mg	14,4 ml	
19 kg	190 mg à 760 mg	3,8 ml à 15,2 ml	760 mg	15,2 ml	
20 kg	200 mg à 800 mg	4 ml à 16 ml	800 mg	16 ml	
21 kg	210 mg à 840 mg	4,2 ml à 16,8 ml	840 mg	16,8 ml	
22 kg	220 mg à 880 mg	4,4 ml à 17,6 ml	880 mg	17,6 ml	
23 kg	230 mg à 920 mg	4,6 ml à 18,4 ml	920 mg	18,4 ml	
24 kg	240 mg à 960 mg	4,8 ml à 19,2 ml	960 mg	19,2 ml	
25 kg	250 mg à 1000 mg	5 ml à 20 ml	1000 mg	20 ml	
26 kg	260 mg à 1040 mg	5,2 ml à 20,8 ml	1040 mg	20,8 ml	
27 kg	270 mg à 1080 mg	5,4 ml à 21,6 ml	1080 mg	21,6 ml	
28 kg	280 mg à 1120 mg	5,6 ml à 22,4 ml	1120 mg	22,4 ml	
29 kg	290 mg à 1160 mg	5,8 ml à 23,2 ml	1160 mg	23,2 ml	
30 kg	300 mg à 1200 mg	6 ml à 24 ml	1200 mg	24 ml	

Methylprednisolone-succinate-sodique 40 mg/fiole (dilué 40 mg/ml) injectable IV

Solu-Medrol Act-O-Vial®

Dose usuelle 0,5 à 2 mg/kg/dose

max. 2mg/kg/dose

ou 1 à 2 mg/kg/j donné en 1 à 4 prises par jour

Poids	mg/dose usuelle	ml/dose usuelle	mg/dose maximale	ml/dose maximale	Fréquence d'administration
2 kg	1 mg à 4 mg	0,03 ml à 0,1 ml	4 mg	0,1 ml	dose max usuelle 60mg/j (max 125mg/dose si anaphylaxie) Une dose de 30mg/kg/dose peut être prescrite dans certaines indications rares ad dose max de 1000mg/dose
3 kg	1,5 mg à 6 mg	0,04 ml à 0,15 ml	6 mg	0,15 ml	
4 kg	2 mg à 8 mg	0,05 ml à 0,2 ml	8 mg	0,2 ml	
5 kg	2,5 mg à 10 mg	0,06 ml à 0,25 ml	10 mg	0,25 ml	
6 kg	3 mg à 12 mg	0,08 ml à 0,3 ml	12 mg	0,3 ml	
7 kg	3,5 mg à 14 mg	0,09 ml à 0,35 ml	14 mg	0,35 ml	
8 kg	4 mg à 16 mg	0,1 ml à 0,4 ml	16 mg	0,4 ml	
9 kg	4,5 mg à 18 mg	0,11 ml à 0,45 ml	18 mg	0,45 ml	
10 kg	5 mg à 20 mg	0,13 ml à 0,5 ml	20 mg	0,5 ml	
11 kg	5,5 mg à 22 mg	0,14 ml à 0,55 ml	22 mg	0,55 ml	
12 kg	6 mg à 24 mg	0,15 ml à 0,6 ml	24 mg	0,6 ml	
13 kg	6,5 mg à 26 mg	0,16 ml à 0,65 ml	26 mg	0,65 ml	
14 kg	7 mg à 28 mg	0,18 ml à 0,7 ml	28 mg	0,7 ml	
15 kg	7,5 mg à 30 mg	0,19 ml à 0,75 ml	30 mg	0,75 ml	
16 kg	8 mg à 32 mg	0,2 ml à 0,8 ml	32 mg	0,8 ml	
17 kg	8,5 mg à 34 mg	0,21 ml à 0,85 ml	34 mg	0,85 ml	
18 kg	9 mg à 36 mg	0,23 ml à 0,9 ml	36 mg	0,9 ml	
19 kg	9,5 mg à 38 mg	0,24 ml à 0,95 ml	38 mg	0,95 ml	
20 kg	10 mg à 40 mg	0,25 ml à 1 ml	40 mg	1 ml	
21 kg	10,5 mg à 42 mg	0,26 ml à 1,05 ml	42 mg	1,05 ml	
22 kg	11 mg à 44 mg	0,28 ml à 1,1 ml	44 mg	1,1 ml	
23 kg	11,5 mg à 46 mg	0,29 ml à 1,15 ml	46 mg	1,15 ml	
24 kg	12 mg à 48 mg	0,3 ml à 1,2 ml	48 mg	1,2 ml	
25 kg	12,5 mg à 50 mg	0,31 ml à 1,25 ml	50 mg	1,25 ml	
26 kg	13 mg à 52 mg	0,33 ml à 1,3 ml	52 mg	1,3 ml	
27 kg	13,5 mg à 54 mg	0,34 ml à 1,35 ml	54 mg	1,35 ml	
28 kg	14 mg à 56 mg	0,35 ml à 1,4 ml	56 mg	1,4 ml	
29 kg	14,5 mg à 58 mg	0,36 ml à 1,45 ml	58 mg	1,45 ml	
30 kg	15 mg à 60 mg	0,38 ml à 1,5 ml	60 mg	1,5 ml	

NB Seul le Methylprednisolone-succinate-sodique peut s'injecter par voie IV

Contient du lactose produit à partir de lait de vache. Contre-indiqué si hypersensibilité connue au lait de vache.

Methylprednisolone-succinate-sodique 125 mg/fiole (dilué 62,5 mg/ml) injectable IV

Solu-Medrol Act-O-Vial®

Dose usuelle 0,5 à 2 mg/kg/dose

max. 2mg/kg/dose

ou 1 à 2 mg/kg/j donné en 1 à 4 prises par jour

Poids	mg/dose usuelle	ml/dose usuelle	mg/dose maximale	ml/dose maximale	Fréquence d'administration
2 kg	1 mg à 4 mg	0,02 ml à 0,06 ml	4 mg	0,06 ml	dose max usuelle 60mg/j (max 125mg/dose si anaphylaxie) Une dose de 30mg/kg/dose peut être prescrite dans certaines indications rares ad dose max de 1000mg/dose
3 kg	1,5 mg à 6 mg	0,02 ml à 0,1 ml	6 mg	0,1 ml	
4 kg	2 mg à 8 mg	0,03 ml à 0,13 ml	8 mg	0,13 ml	
5 kg	2,5 mg à 10 mg	0,04 ml à 0,16 ml	10 mg	0,16 ml	
6 kg	3 mg à 12 mg	0,05 ml à 0,19 ml	12 mg	0,19 ml	
7 kg	3,5 mg à 14 mg	0,06 ml à 0,22 ml	14 mg	0,22 ml	
8 kg	4 mg à 16 mg	0,06 ml à 0,26 ml	16 mg	0,26 ml	
9 kg	4,5 mg à 18 mg	0,07 ml à 0,29 ml	18 mg	0,29 ml	
10 kg	5 mg à 20 mg	0,08 ml à 0,32 ml	20 mg	0,32 ml	
11 kg	5,5 mg à 22 mg	0,09 ml à 0,35 ml	22 mg	0,35 ml	
12 kg	6 mg à 24 mg	0,1 ml à 0,38 ml	24 mg	0,38 ml	
13 kg	6,5 mg à 26 mg	0,1 ml à 0,42 ml	26 mg	0,42 ml	
14 kg	7 mg à 28 mg	0,11 ml à 0,45 ml	28 mg	0,45 ml	
15 kg	7,5 mg à 30 mg	0,12 ml à 0,48 ml	30 mg	0,48 ml	
16 kg	8 mg à 32 mg	0,13 ml à 0,51 ml	32 mg	0,51 ml	
17 kg	8,5 mg à 34 mg	0,14 ml à 0,54 ml	34 mg	0,54 ml	
18 kg	9 mg à 36 mg	0,14 ml à 0,58 ml	36 mg	0,58 ml	
19 kg	9,5 mg à 38 mg	0,15 ml à 0,61 ml	38 mg	0,61 ml	
20 kg	10 mg à 40 mg	0,16 ml à 0,64 ml	40 mg	0,64 ml	
21 kg	10,5 mg à 42 mg	0,17 ml à 0,67 ml	42 mg	0,67 ml	
22 kg	11 mg à 44 mg	0,18 ml à 0,7 ml	44 mg	0,7 ml	
23 kg	11,5 mg à 46 mg	0,18 ml à 0,74 ml	46 mg	0,74 ml	
24 kg	12 mg à 48 mg	0,19 ml à 0,77 ml	48 mg	0,77 ml	
25 kg	12,5 mg à 50 mg	0,20 ml à 0,8 ml	50 mg	0,8 ml	
26 kg	13 mg à 52 mg	0,21 ml à 0,83 ml	52 mg	0,83 ml	
27 kg	13,5 mg à 54 mg	0,22 ml à 0,86 ml	54 mg	0,86 ml	
28 kg	14 mg à 56 mg	0,22 ml à 0,9 ml	56 mg	0,9 ml	
29 kg	14,5 mg à 58 mg	0,23 ml à 0,93 ml	58 mg	0,93 ml	
30 kg	15 mg à 60 mg	0,24 ml à 0,96 ml	60 mg	0,96 ml	

NB Seul le Methylprednisolone-succinate-sodique peut s'injecter par voie IV

Methylprednisolone-succinate-sodique 500 et 1000 mg/ fiole (dilué 125 mg/ml) injectable IV

Solu-Medrol Act-O-Vial®

Dose usuelle 0,5 à 2 mg/kg/dose

max. 2mg/kg/dose

ou 1 à 2 mg/kg/j donné en 1 à 4 prises par jour

Poids	mg/dose usuelle	ml/dose usuelle	mg/dose maximale	ml/dose maximale	Fréquence d'administration
2 kg	1 mg à 4 mg	0,08 ml à 0,03 ml	4 mg	0,03 ml	dose max usuelle 60mg/j (max 125mg/dose si anaphylaxie) Une dose de 30mg/kg/dose peut être prescrite dans certaines indications rares ad dose max de 1000mg/dose
3 kg	1,5 mg à 6 mg	0,01 ml à 0,05 ml	6 mg	0,05 ml	
4 kg	2 mg à 8 mg	0,02 ml à 0,06 ml	8 mg	0,06 ml	
5 kg	2,5 mg à 10 mg	0,02 ml à 0,08 ml	10 mg	0,08 ml	
6 kg	3 mg à 12 mg	0,02 ml à 0,1 ml	12 mg	0,1 ml	
7 kg	3,5 mg à 14 mg	0,03 ml à 0,11 ml	14 mg	0,11 ml	
8 kg	4 mg à 16 mg	0,03 ml à 0,13 ml	16 mg	0,13 ml	
9 kg	4,5 mg à 18 mg	0,04 ml à 0,14 ml	18 mg	0,14 ml	
10 kg	5 mg à 20 mg	0,04 ml à 0,16 ml	20 mg	0,16 ml	
11 kg	5,5 mg à 22 mg	0,04 ml à 0,18 ml	22 mg	0,18 ml	
12 kg	6 mg à 24 mg	0,05 ml à 0,19 ml	24 mg	0,19 ml	
13 kg	6,5 mg à 26 mg	0,05 ml à 0,21 ml	26 mg	0,21 ml	
14 kg	7 mg à 28 mg	0,06 ml à 0,22 ml	28 mg	0,22 ml	
15 kg	7,5 mg à 30 mg	0,06 ml à 0,24 ml	30 mg	0,24 ml	
16 kg	8 mg à 32 mg	0,06 ml à 0,26 ml	32 mg	0,26 ml	
17 kg	8,5 mg à 34 mg	0,07 ml à 0,27 ml	34 mg	0,27 ml	
18 kg	9 mg à 36 mg	0,07 ml à 0,29 ml	36 mg	0,29 ml	
19 kg	9,5 mg à 38 mg	0,08 ml à 0,3 ml	38 mg	0,3 ml	
20 kg	10 mg à 40 mg	0,08 ml à 0,32 ml	40 mg	0,32 ml	
21 kg	10,5 mg à 42 mg	0,08 ml à 0,34 ml	42 mg	0,34 ml	
22 kg	11 mg à 44 mg	0,09 ml à 0,35 ml	44 mg	0,35 ml	
23 kg	11,5 mg à 46 mg	0,09 ml à 0,37 ml	46 mg	0,37 ml	
24 kg	12 mg à 48 mg	0,10 ml à 0,38 ml	48 mg	0,38 ml	
25 kg	12,5 mg à 50 mg	0,10 ml à 0,4 ml	50 mg	0,4 ml	
26 kg	13 mg à 52 mg	0,10 ml à 0,42 ml	52 mg	0,42 ml	
27 kg	13,5 mg à 54 mg	0,11 ml à 0,43 ml	54 mg	0,43 ml	
28 kg	14 mg à 56 mg	0,11 ml à 0,45 ml	56 mg	0,45 ml	
29 kg	14,5 mg à 58 mg	0,12 ml à 0,46 ml	58 mg	0,46 ml	
30 kg	15 mg à 60 mg	0,12 ml à 0,48 ml	60 mg	0,48 ml	

NB Seul le Methylprednisolone-succinate-sodique peut s'injecter par voie IV

Midazolam 5 mg/ml fiole injectable pour usage PO

Versed®

Dose usuelle 0,25 à 0,5 mg/kg/dose

max. 1 mg/kg/dose

Poids	mg/dose usuelle	ml/dose usuelle	mg/dose maximale	ml/dose maximale	Fréquence d'administration
2 kg	0,5 mg à 1 mg	0,1 ml à 0,2 ml	2 mg	0,4 ml	Dose max 20 mg en 1 dose Diluer dans petite quantité de jus (pour masquer le goût)
3 kg	0,75 mg à 1,5 mg	0,15 ml à 0,3 ml	3 mg	0,6 ml	
4 kg	1 mg à 2 mg	0,2 ml à 0,4 ml	4 mg	0,8 ml	
5 kg	1,25 mg à 2,5 mg	0,25 ml à 0,5 ml	5 mg	1 ml	
6 kg	1,5 mg à 3 mg	0,3 ml à 0,6 ml	6 mg	1,2 ml	
7 kg	1,75 mg à 3,5 mg	0,35 ml à 0,7 ml	7 mg	1,4 ml	
8 kg	2 mg à 4 mg	0,4 ml à 0,8 ml	8 mg	1,6 ml	
9 kg	2,25 mg à 4,5 mg	0,45 ml à 0,9 ml	9 mg	1,8 ml	
10 kg	2,5 mg à 5 mg	0,5 ml à 1 ml	10 mg	2 ml	
11 kg	2,75 mg à 5,5 mg	0,55 ml à 1,1 ml	11 mg	2,2 ml	
12 kg	3 mg à 6 mg	0,6 ml à 1,2 ml	12 mg	2,4 ml	
13 kg	3,25 mg à 6,5 mg	0,65 ml à 1,3 ml	13 mg	2,6 ml	
14 kg	3,5 mg à 7 mg	0,7 ml à 1,4 ml	14 mg	2,8 ml	
15 kg	3,75 mg à 7,5 mg	0,75 ml à 1,5 ml	15 mg	3 ml	
16 kg	4 mg à 8 mg	0,8 ml à 1,6 ml	16 mg	3,2 ml	
17 kg	4,25 mg à 8,5 mg	0,85 ml à 1,7 ml	17 mg	3,4 ml	
18 kg	4,5 mg à 9 mg	0,9 ml à 1,8 ml	18 mg	3,6 ml	
19 kg	4,75 mg à 9,5 mg	0,95 ml à 1,9 ml	19 mg	3,8 ml	
20 kg	5 mg à 10 mg	1 ml à 2 ml	20 mg	4 ml	
21 kg	5,25 mg à 10,5 mg	1,1 ml à 2,1 ml	20 mg	4 ml	
22 kg	5,5 mg à 11 mg	1,1 ml à 2,2 ml	20 mg	4 ml	
23 kg	5,75 mg à 11,5 mg	1,2 ml à 2,3 ml	20 mg	4 ml	
24 kg	6 mg à 12 mg	1,2 ml à 2,4 ml	20 mg	4 ml	
25 kg	6,25 mg à 12,5 mg	1,3 ml à 2,5 ml	20 mg	4 ml	
26 kg	6,5 mg à 13 mg	1,3 ml à 2,6 ml	20 mg	4 ml	
27 kg	6,75 mg à 13,5 mg	1,4 ml à 2,7 ml	20 mg	4 ml	
28 kg	7 mg à 14 mg	1,4 ml à 2,8 ml	20 mg	4 ml	
29 kg	7,25 mg à 14,5 mg	1,5 ml à 2,9 ml	20 mg	4 ml	
30 kg	7,5 mg à 15 mg	1,5 ml à 3 ml	20 mg	4 ml	

Midazolam 1 mg/ml injectable IV/IM/SC

Versed®

Dose usuelle 0,025 à 0,1 mg/kg/dose max. 0,2 mg/kg/dose

Poids	mg/dose usuelle	ml/dose usuelle	mg/dose maximale	ml/dose maximale	Fréquence d'administration
2 kg	0,05 mg à 0,2 mg	0,05 ml à 0,2 ml	0,4 mg	0,4 ml	Dose maximale cumulative = 15 mg
3 kg	0,08 mg à 0,3 mg	0,08 ml à 0,3 ml	0,6 mg	0,6 ml	
4 kg	0,1 mg à 0,4 mg	0,1 ml à 0,4 ml	0,8 mg	0,8 ml	
5 kg	0,13 mg à 0,5 mg	0,13 ml à 0,5 ml	1 mg	1 ml	
6 kg	0,15 mg à 0,6 mg	0,15 ml à 0,6 ml	1,2 mg	1,2 ml	
7 kg	0,18 mg à 0,7 mg	0,18 ml à 0,7 ml	1,4 mg	1,4 ml	
8 kg	0,2 mg à 0,8 mg	0,2 ml à 0,8 ml	1,6 mg	1,6 ml	
9 kg	0,23 mg à 0,9 mg	0,23 ml à 0,9 ml	1,8 mg	1,8 ml	
10 kg	0,25 mg à 1 mg	0,25 ml à 1 ml	2 mg	2 ml	
11 kg	0,28 mg à 1,1 mg	0,28 ml à 1,1 ml	2,2 mg	2,2 ml	
12 kg	0,3 mg à 1,2 mg	0,3 ml à 1,2 ml	2,4 mg	2,4 ml	
13 kg	0,33 mg à 1,3 mg	0,33 ml à 1,3 ml	2,6 mg	2,6 ml	
14 kg	0,35 mg à 1,4 mg	0,35 ml à 1,4 ml	2,8 mg	2,8 ml	
15 kg	0,38 mg à 1,5 mg	0,38 ml à 1,5 ml	3 mg	3 ml	
16 kg	0,4 mg à 1,6 mg	0,4 ml à 1,6 ml	3,2 mg	3,2 ml	
17 kg	0,43 mg à 1,7 mg	0,43 ml à 1,7 ml	3,4 mg	3,4 ml	
18 kg	0,45 mg à 1,8 mg	0,45 ml à 1,8 ml	3,6 mg	3,6 ml	
19 kg	0,48 mg à 1,9 mg	0,48 ml à 1,9 ml	3,8 mg	3,8 ml	
20 kg	0,5 mg à 2 mg	0,5 ml à 2 ml	4 mg	4 ml	
21 kg	0,53 mg à 2,1 mg	0,53 ml à 2,1 ml	4,2 mg	4,2 ml	
22 kg	0,55 mg à 2,2 mg	0,55 ml à 2,2 ml	4,4 mg	4,4 ml	
23 kg	0,58 mg à 2,3 mg	0,58 ml à 2,3 ml	4,6 mg	4,6 ml	
24 kg	0,6 mg à 2,4 mg	0,6 ml à 2,4 ml	4,8 mg	4,8 ml	
25 kg	0,63 mg à 2,5 mg	0,63 ml à 2,5 ml	5 mg	5 ml	
26 kg	0,65 mg à 2,6 mg	0,65 ml à 2,6 ml	5,2 mg	5,2 ml	
27 kg	0,68 mg à 2,7 mg	0,68 ml à 2,7 ml	5,4 mg	5,4 ml	
28 kg	0,7 mg à 2,8 mg	0,7 ml à 2,8 ml	5,6 mg	5,6 ml	
29 kg	0,73 mg à 2,9 mg	0,73 ml à 2,9 ml	5,8 mg	5,8 ml	
30 kg	0,75 mg à 3 mg	0,75 ml à 3 ml	6 mg	6 ml	

Midazolam 5 mg/ml injectable IM/SC

Versed®

Dose usuelle 0,025 à 0,1 mg/kg/dose max. 0,2 mg/kg/dose

Poids	mg/dose usuelle	ml/dose usuelle	mg/dose maximale	ml/dose maximale	Fréquence d'administration
2 kg	0,05 mg à 0,2 mg	0,01 ml à 0,04 ml	0,4 mg	0,08 ml	Dose maximale cumulative = 15 mg
3 kg	0,08 mg à 0,3 mg	0,02 ml à 0,06 ml	0,6 mg	0,12 ml	
4 kg	0,1 mg à 0,4 mg	0,02 ml à 0,08 ml	0,8 mg	0,16 ml	
5 kg	0,13 mg à 0,5 mg	0,03 ml à 0,1 ml	1 mg	0,2 ml	
6 kg	0,15 mg à 0,6 mg	0,03 ml à 0,12 ml	1,2 mg	0,24 ml	
7 kg	0,18 mg à 0,7 mg	0,04 ml à 0,14 ml	1,4 mg	0,28 ml	
8 kg	0,2 mg à 0,8 mg	0,04 ml à 0,16 ml	1,6 mg	0,32 ml	
9 kg	0,23 mg à 0,9 mg	0,05 ml à 0,18 ml	1,8 mg	0,36 ml	
10 kg	0,25 mg à 1 mg	0,05 ml à 0,2 ml	2 mg	0,4 ml	
11 kg	0,28 mg à 1,1 mg	0,06 ml à 0,22 ml	2,2 mg	0,44 ml	
12 kg	0,3 mg à 1,2 mg	0,06 ml à 0,24 ml	2,4 mg	0,48 ml	
13 kg	0,33 mg à 1,3 mg	0,07 ml à 0,26 ml	2,6 mg	0,52 ml	
14 kg	0,35 mg à 1,4 mg	0,07 ml à 0,28 ml	2,8 mg	0,56 ml	
15 kg	0,38 mg à 1,5 mg	0,08 ml à 0,3 ml	3 mg	0,6 ml	
16 kg	0,4 mg à 1,6 mg	0,08 ml à 0,32 ml	3,2 mg	0,64 ml	
17 kg	0,43 mg à 1,7 mg	0,09 ml à 0,34 ml	3,4 mg	0,68 ml	
18 kg	0,45 mg à 1,8 mg	0,09 ml à 0,36 ml	3,6 mg	0,72 ml	
19 kg	0,48 mg à 1,9 mg	0,1 ml à 0,38 ml	3,8 mg	0,76 ml	
20 kg	0,5 mg à 2 mg	0,1 ml à 0,4 ml	4 mg	0,8 ml	
21 kg	0,53 mg à 2,1 mg	0,11 ml à 0,42 ml	4,2 mg	0,84 ml	
22 kg	0,55 mg à 2,2 mg	0,11 ml à 0,44 ml	4,4 mg	0,88 ml	
23 kg	0,58 mg à 2,3 mg	0,12 ml à 0,46 ml	4,6 mg	0,92 ml	
24 kg	0,6 mg à 2,4 mg	0,12 ml à 0,48 ml	4,8 mg	0,96 ml	
25 kg	0,63 mg à 2,5 mg	0,13 ml à 0,5 ml	5 mg	1 ml	
26 kg	0,65 mg à 2,6 mg	0,13 ml à 0,52 ml	5,2 mg	1 ml	
27 kg	0,68 mg à 2,7 mg	0,14 ml à 0,54 ml	5,4 mg	1,1 ml	
28 kg	0,7 mg à 2,8 mg	0,14 ml à 0,56 ml	5,6 mg	1,1 ml	
29 kg	0,73 mg à 2,9 mg	0,15 ml à 0,58 ml	5,8 mg	1,2 ml	
30 kg	0,75 mg à 3 mg	0,15 ml à 0,6 ml	6 mg	1,2 ml	

Morphine 1 mg/ml sirop PO

Morphine®

Dose usuelle 0,2 à 0,5 mg/kg/dose

max. 0,5 mg/kg/dose

Poids	mg/dose usuelle	ml/dose usuelle	mg/dose maximale	ml/dose maximale	Fréquence d'administration
2 kg	0,4 mg à 1 mg	0,4 ml à 1 ml	1 mg	1 ml	q 4 h
3 kg	0,6 mg à 1,5 mg	0,6 ml à 1,5 ml	1,5 mg	1,5 ml	
4 kg	0,8 mg à 2 mg	0,8 ml à 2 ml	2 mg	2 ml	
5 kg	1 mg à 2,5 mg	1 ml à 2,5 ml	2,5 mg	2,5 ml	
6 kg	1,2 mg à 3 mg	1,2 ml à 3 ml	3 mg	3 ml	
7 kg	1,4 mg à 3,5 mg	1,4 ml à 3,5 ml	3,5 mg	3,5 ml	
8 kg	1,6 mg à 4 mg	1,6 ml à 4 ml	4 mg	4 ml	
9 kg	1,8 mg à 4,5 mg	1,8 ml à 4,5 ml	4,5 mg	4,5 ml	
10 kg	2 mg à 5 mg	2 ml à 5 ml	5 mg	5 ml	
11 kg	2,2 mg à 5,5 mg	2,2 ml à 5,5 ml	5,5 mg	5,5 ml	
12 kg	2,4 mg à 6 mg	2,4 ml à 6 ml	6 mg	6 ml	
13 kg	2,6 mg à 6,5 mg	2,6 ml à 6,5 ml	6,5 mg	6,5 ml	
14 kg	2,8 mg à 7 mg	2,8 ml à 7 ml	7 mg	7 ml	
15 kg	3 mg à 7,5 mg	3 ml à 7,5 ml	7,5 mg	7,5 ml	
16 kg	3,2 mg à 8 mg	3,2 ml à 8 ml	8 mg	8 ml	
17 kg	3,4 mg à 8,5 mg	3,4 ml à 8,5 ml	8,5 mg	8,5 ml	
18 kg	3,6 mg à 9 mg	3,6 ml à 9 ml	9 mg	9 ml	
19 kg	3,8 mg à 9,5 mg	3,8 ml à 9,5 ml	9,5 mg	9,5 ml	
20 kg	4 mg à 10 mg	4 ml à 10 ml	10 mg	10 ml	
21 kg	4,2 mg à 10,5 mg	4,2 ml à 10,5 ml	10,5 mg	10,5 ml	
22 kg	4,4 mg à 11 mg	4,4 ml à 11 ml	11 mg	11 ml	
23 kg	4,6 mg à 11,5 mg	4,6 ml à 11,5 ml	11,5 mg	11,5 ml	
24 kg	4,8 mg à 12 mg	4,8 ml à 12 ml	12 mg	12 ml	
25 kg	5 mg à 12,5 mg	5 ml à 12,5 ml	12,5 mg	12,5 ml	
26 kg	5,2 mg à 13 mg	5,2 ml à 13 ml	13 mg	13 ml	
27 kg	5,4 mg à 13,5 mg	5,4 ml à 13,5 ml	13,5 mg	13,5 ml	
28 kg	5,6 mg à 14 mg	5,6 ml à 14 ml	14 mg	14 ml	
29 kg	5,8 mg à 14,5 mg	5,8 ml à 14,5 ml	14,5 mg	14,5 ml	
30 kg	6 mg à 15 mg	6 ml à 15 ml	15 mg	15 ml	

Morphine 10 mg/ml injectable SC/IM/IV

Morphine[®]

Dose usuelle 0,05 à 0,2 mg/kg/dose

max. 0,2 mg/kg/dose

Poids	mg/dose usuelle	ml/dose usuelle	mg/dose maximale	ml/dose maximale	Fréquence d'administration
2 kg	0,1 mg à 0,4 mg	0,01 ml à 0,04 ml	0,4 mg	0,04 ml	q 4 h max. 15 mg/dose
3 kg	0,15 mg à 0,6 mg	0,02 ml à 0,06 ml	0,6 mg	0,06 ml	
4 kg	0,2 mg à 0,8 mg	0,02 ml à 0,08 ml	0,8 mg	0,08 ml	
5 kg	0,25 mg à 1 mg	0,03 ml à 0,1 ml	1 mg	0,1 ml	
6 kg	0,3 mg à 1,2 mg	0,03 ml à 0,12 ml	1,2 mg	0,12 ml	
7 kg	0,35 mg à 1,4 mg	0,04 ml à 0,14 ml	1,4 mg	0,14 ml	
8 kg	0,4 mg à 1,6 mg	0,04 ml à 0,16 ml	1,6 mg	0,16 ml	
9 kg	0,45 mg à 1,8 mg	0,05 ml à 0,18 ml	1,8 mg	0,18 ml	
10 kg	0,5 mg à 2 mg	0,05 ml à 0,2 ml	2 mg	0,2 ml	
11 kg	0,55 mg à 2,2 mg	0,06 ml à 0,22 ml	2,2 mg	0,22 ml	
12 kg	0,6 mg à 2,4 mg	0,06 ml à 0,24 ml	2,4 mg	0,24 ml	
13 kg	0,65 mg à 2,6 mg	0,07 ml à 0,26 ml	2,6 mg	0,26 ml	
14 kg	0,7 mg à 2,8 mg	0,07 ml à 0,28 ml	2,8 mg	0,28 ml	
15 kg	0,75 mg à 3 mg	0,08 ml à 0,3 ml	3 mg	0,3 ml	
16 kg	0,8 mg à 3,2 mg	0,08 ml à 0,32 ml	3,2 mg	0,32 ml	
17 kg	0,85 mg à 3,4 mg	0,09 ml à 0,34 ml	3,4 mg	0,34 ml	
18 kg	0,9 mg à 3,6 mg	0,09 ml à 0,36 ml	3,6 mg	0,36 ml	
19 kg	0,95 mg à 3,8 mg	0,1 ml à 0,38 ml	3,8 mg	0,38 ml	
20 kg	1 mg à 4 mg	0,1 ml à 0,4 ml	4 mg	0,4 ml	
21 kg	1,05 mg à 4,2 mg	0,11 ml à 0,42 ml	4,2 mg	0,42 ml	
22 kg	1,1 mg à 4,4 mg	0,11 ml à 0,44 ml	4,4 mg	0,44 ml	
23 kg	1,15 mg à 4,6 mg	0,12 ml à 0,46 ml	4,6 mg	0,46 ml	
24 kg	1,2 mg à 4,8 mg	0,12 ml à 0,48 ml	4,8 mg	0,48 ml	
25 kg	1,25 mg à 5 mg	0,13 ml à 0,5 ml	5 mg	0,5 ml	
26 kg	1,3 mg à 5,2 mg	0,13 ml à 0,52 ml	5,2 mg	0,52 ml	
27 kg	1,35 mg à 5,4 mg	0,14 ml à 0,54 ml	5,4 mg	0,54 ml	
28 kg	1,4 mg à 5,6 mg	0,14 ml à 0,56 ml	5,6 mg	0,56 ml	
29 kg	1,45 mg à 5,8 mg	0,15 ml à 0,58 ml	5,8 mg	0,58 ml	
30 kg	1,5 mg à 6 mg	0,15 ml à 0,6 ml	6 mg	0,6 ml	

Ondansetron 2 mg/ml fiole injectable pour usage PO

Zofran[®]

Dose usuelle 0,1 à 0,15 mg/kg/dose max. 0,15 mg/kg/dose

Poids	mg/dose usuelle	ml/dose usuelle	mg/dose maximale	ml/dose maximale	Fréquence d'administration
2 kg	0,2 mg à 0,3 mg	0,1 ml à 0,2 ml	0,3 mg	0,2 ml	Dose max : 8 mg/dose X 1 dose
3 kg	0,3 mg à 0,5 mg	0,2 ml à 0,2 ml	0,5 mg	0,2 ml	
4 kg	0,4 mg à 0,6 mg	0,2 ml à 0,3 ml	0,6 mg	0,3 ml	
5 kg	0,5 mg à 0,8 mg	0,3 ml à 0,4 ml	0,8 mg	0,4 ml	
6 kg	0,6 mg à 0,9 mg	0,3 ml à 0,5 ml	0,9 mg	0,5 ml	
7 kg	0,7 mg à 1,1 mg	0,4 ml à 0,5 ml	1,1 mg	0,5 ml	
8 kg	0,8 mg à 1,2 mg	0,4 ml à 0,6 ml	1,2 mg	0,6 ml	
9 kg	0,9 mg à 1,4 mg	0,5 ml à 0,7 ml	1,4 mg	0,7 ml	
10 kg	1 mg à 1,5 mg	0,5 ml à 0,8 ml	1,5 mg	0,8 ml	
11 kg	1,1 mg à 1,7 mg	0,6 ml à 0,8 ml	1,7 mg	0,8 ml	
12 kg	1,2 mg à 1,8 mg	0,6 ml à 0,9 ml	1,8 mg	0,9 ml	
13 kg	1,3 mg à 2 mg	0,7 ml à 1 ml	2 mg	1 ml	
14 kg	1,4 mg à 2,1 mg	0,7 ml à 1,1 ml	2,1 mg	1,1 ml	
15 kg	1,5 mg à 2,3 mg	0,8 ml à 1,1 ml	2,3 mg	1,1 ml	
16 kg	1,6 mg à 2,4 mg	0,8 ml à 1,2 ml	2,4 mg	1,2 ml	
17 kg	1,7 mg à 2,6 mg	0,9 ml à 1,3 ml	2,6 mg	1,3 ml	
18 kg	1,8 mg à 2,7 mg	0,9 ml à 1,4 ml	2,7 mg	1,4 ml	
19 kg	1,9 mg à 2,9 mg	1 ml à 1,4 ml	2,9 mg	1,4 ml	
20 kg	2 mg à 3 mg	1 ml à 1,5 ml	3 mg	1,5 ml	
21 kg	2,1 mg à 3,2 mg	1,1 ml à 1,6 ml	3,2 mg	1,6 ml	
22 kg	2,2 mg à 3,3 mg	1,1 ml à 1,7 ml	3,3 mg	1,7 ml	
23 kg	2,3 mg à 3,5 mg	1,2 ml à 1,7 ml	3,5 mg	1,7 ml	
24 kg	2,4 mg à 3,6 mg	1,2 ml à 1,8 ml	3,6 mg	1,8 ml	
25 kg	2,5 mg à 3,8 mg	1,3 ml à 1,9 ml	3,8 mg	1,9 ml	
26 kg	2,6 mg à 3,9 mg	1,3 ml à 2 ml	3,9 mg	2 ml	
27 kg	2,7 mg à 4,1 mg	1,4 ml à 2 ml	4,1 mg	2 ml	
28 kg	2,8 mg à 4,2 mg	1,4 ml à 2,1 ml	4,2 mg	2,1 ml	
29 kg	2,9 mg à 4,4 mg	1,5 ml à 2,2 ml	4,4 mg	2,2 ml	
30 kg	3 mg à 4,5 mg	1,5 ml à 2,3 ml	4,5 mg	2,3 ml	

Diluer dans un volume égal de sirop simple pour améliorer le goût

Ondansétron 2mg/ml injectable IV/IM/SC

Zofran[®]

*** A PARTIR DE 1 MOIS ***

Dose usuelle 0,1 à 0,15 mg/kg/dose max. 0,3 mg/kg/dose

Poids	mg/dose usuelle	ml/dose usuelle	mg/dose maximale	ml/dose maximale	Fréquence d'administration
2 kg	0,2 mg à 0,3 mg	0,1 ml à 0,15 ml	0,6 mg	0,3 ml	Dose maximale 8 mg/dose
3 kg	0,3 mg à 0,5 mg	0,15 ml à 0,23 ml	0,9 mg	0,45 ml	
4 kg	0,4 mg à 0,6 mg	0,2 ml à 0,3 ml	1,2 mg	0,6 ml	
5 kg	0,5 mg à 0,8 mg	0,25 ml à 0,38 ml	1,5 mg	0,75 ml	
6 kg	0,6 mg à 0,9 mg	0,3 ml à 0,45 ml	1,8 mg	0,9 ml	
7 kg	0,7 mg à 1,1 mg	0,35 ml à 0,53 ml	2,1 mg	1,1 ml	
8 kg	0,8 mg à 1,2 mg	0,4 ml à 0,6 ml	2,4 mg	1,2 ml	
9 kg	0,9 mg à 1,4 mg	0,45 ml à 0,68 ml	2,7 mg	1,4 ml	
10 kg	1 mg à 1,5 mg	0,5 ml à 0,75 ml	3 mg	1,5 ml	
11 kg	1,1 mg à 1,7 mg	0,55 ml à 0,83 ml	3,3 mg	1,7 ml	
12 kg	1,2 mg à 1,8 mg	0,6 ml à 0,9 ml	3,6 mg	1,8 ml	
13 kg	1,3 mg à 2 mg	0,65 ml à 1 ml	3,9 mg	2 ml	
14 kg	1,4 mg à 2,1 mg	0,7 ml à 1,1 ml	4,2 mg	2,1 ml	
15 kg	1,5 mg à 2,3 mg	0,75 ml à 1,1 ml	4,5 mg	2,3 ml	
16 kg	1,6 mg à 2,4 mg	0,8 ml à 1,2 ml	4,8 mg	2,4 ml	
17 kg	1,7 mg à 2,6 mg	0,85 ml à 1,3 ml	5,1 mg	2,6 ml	
18 kg	1,8 mg à 2,7 mg	0,9 ml à 1,4 ml	5,4 mg	2,7 ml	
19 kg	1,9 mg à 2,9 mg	1 ml à 1,4 ml	5,7 mg	2,9 ml	
20 kg	2 mg à 3 mg	1 ml à 1,5 ml	6 mg	3 ml	
21 kg	2,1 mg à 3,2 mg	1,1 ml à 1,6 ml	6,3 mg	3,2 ml	
22 kg	2,2 mg à 3,3 mg	1,1 ml à 1,7 ml	6,6 mg	3,3 ml	
23 kg	2,3 mg à 3,5 mg	1,2 ml à 1,7 ml	6,9 mg	3,5 ml	
24 kg	2,4 mg à 3,6 mg	1,2 ml à 1,8 ml	7,2 mg	3,6 ml	
25 kg	2,5 mg à 3,8 mg	1,3 ml à 1,9 ml	7,5 mg	3,8 ml	
26 kg	2,6 mg à 3,9 mg	1,3 ml à 2 ml	7,8 mg	3,9 ml	
27 kg	2,7 mg à 4,1 mg	1,4 ml à 2 ml	8 mg	4 ml	
28 kg	2,8 mg à 4,2 mg	1,4 ml à 2,1 ml	8 mg	4 ml	
29 kg	2,9 mg à 4,4 mg	1,5 ml à 2,2 ml	8 mg	4 ml	
30 kg	3 mg à 4,5 mg	1,5 ml à 2,3 ml	8 mg	4 ml	

Dose usuelle au département urgence - Tx Gastroentérite : 0,15 mg/kg/dose IV

Oseltamivir 6 mg/ml PO

Tamiflu®

Dose usuelle 3 mg/kg/dose

max. 3,5 mg/kg/dose

Poids	mg/dose usuelle	ml/dose usuelle	mg/dose maximale	ml/dose maximale	Fréquence d'administration
2 kg	6 mg	1 ml	7 mg	1 ml	bid Traitement X 5 jours
3 kg	9 mg	1,5 ml	10,5 mg	1,8 ml	
4 kg	12 mg	2 ml	14 mg	2 ml	
5 kg	15 mg	2,5 ml	17,5 mg	2,9 ml	
6 kg	18 mg	3 ml	21 mg	3,5 ml	
7 kg	21 mg	3,5 ml	24,5 mg	4,1 ml	
8 kg	24 mg	4 ml	28 mg	4,7 ml	
9 kg	27 mg	5 ml	32 mg	5,3 ml	
De 10 kg à 15 kg	30 mg	5,0 ml	30 mg BID	5 ml	
De 15,1 kg à 23 kg	45,3 mg	8 ml	45 mg BID	7,5 ml	
De 23,1 kg à 40 kg	60 mg	10 ml	60 mg BID	10 ml	
Plus grand que 40kg	75 mg	13 ml	75 mg BID	12,5 ml	

Département de pharmacie
21 mars 2016

Phenobarbital *30* mg/ml injectable IV

Phenobarbital®

DOSE DE CHARGE

Dose usuelle 15 à 20 mg/kg/dose

max. 20 mg/kg/dose

Poids	mg/dose usuelle	ml/dose usuelle	mg/dose maximale	ml/dose maximale	Fréquence d'administration
2 kg	30 mg à 40 mg	1 ml à 1,3 ml	40 mg	1,3 ml	max. 1 000 mg/dose et dose maximale cumulative : 30 mg/kg
3 kg	45 mg à 60 mg	1,5 ml à 2 ml	60 mg	2 ml	
4 kg	60 mg à 80 mg	2 ml à 2,7 ml	80 mg	2,7 ml	
5 kg	75 mg à 100 mg	2,5 ml à 3,3 ml	100 mg	3,3 ml	
6 kg	90 mg à 120 mg	3 ml à 4 ml	120 mg	4 ml	
7 kg	105 mg à 140 mg	3,5 ml à 4,7 ml	140 mg	4,7 ml	
8 kg	120 mg à 160 mg	4 ml à 5,3 ml	160 mg	5,3 ml	
9 kg	135 mg à 180 mg	4,5 ml à 6 ml	180 mg	6 ml	
10 kg	150 mg à 200 mg	5 ml à 6,7 ml	200 mg	6,7 ml	
11 kg	165 mg à 220 mg	5,5 ml à 7,3 ml	220 mg	7,3 ml	
12 kg	180 mg à 240 mg	6 ml à 8 ml	240 mg	8 ml	
13 kg	195 mg à 260 mg	6,5 ml à 8,7 ml	260 mg	8,7 ml	
14 kg	210 mg à 280 mg	7 ml à 9,3 ml	280 mg	9,3 ml	
15 kg	225 mg à 300 mg	7,5 ml à 10 ml	300 mg	10 ml	
16 kg	240 mg à 320 mg	8 ml à 10,7 ml	320 mg	10,7 ml	
17 kg	255 mg à 340 mg	8,5 ml à 11,3 ml	340 mg	11,3 ml	
18 kg	270 mg à 360 mg	9 ml à 12 ml	360 mg	12 ml	
19 kg	285 mg à 380 mg	9,5 ml à 12,7 ml	380 mg	12,7 ml	
20 kg	300 mg à 400 mg	10 ml à 13,3 ml	400 mg	13,3 ml	
21 kg	315 mg à 420 mg	10,5 ml à 14 ml	420 mg	14 ml	
22 kg	330 mg à 440 mg	11 ml à 14,7 ml	440 mg	14,7 ml	
23 kg	345 mg à 460 mg	11,5 ml à 15,3 ml	460 mg	15,3 ml	
24 kg	360 mg à 480 mg	12 ml à 16 ml	480 mg	16 ml	
25 kg	375 mg à 500 mg	12,5 ml à 16,7 ml	500 mg	16,7 ml	
26 kg	390 mg à 520 mg	13 ml à 17,3 ml	520 mg	17,3 ml	
27 kg	405 mg à 540 mg	13,5 ml à 18 ml	540 mg	18 ml	
28 kg	420 mg à 560 mg	14 ml à 18,7 ml	560 mg	18,7 ml	
29 kg	435 mg à 580 mg	14,5 ml à 19,3 ml	580 mg	19,3 ml	
30 kg	450 mg à 600 mg	15 ml à 20 ml	600 mg	20 ml	

Pour les doses supérieures à 120 mg, utiliser les ampoules de 120 mg/ml

Voir feuille Phénobarbital 120 mg/ml

Département de pharmacie

Révisé novembre 2023

Phenobarbital *120* mg/ml injectable IV

Phenobarbital[®]

DOSE DE CHARGE

Dose usuelle 15 à 20 mg/kg/dose

max. 20 mg/kg/dose

Poids	mg/dose usuelle	ml/dose usuelle	mg/dose maximale	ml/dose maximale	Fréquence d'administration
2 kg	30 mg à 40 mg	0,25 ml à 0,33 ml	40 mg	0,3 ml	max. 1 000 mg/dose et dose maximale cumulative : max. 30 mg/kg
3 kg	45 mg à 60 mg	0,38 ml à 0,5 ml	60 mg	0,5 ml	
4 kg	60 mg à 80 mg	0,5 ml à 0,67 ml	80 mg	0,7 ml	
5 kg	75 mg à 100 mg	0,63 ml à 0,83 ml	100 mg	0,8 ml	
6 kg	90 mg à 120 mg	0,75 ml à 1 ml	120 mg	1 ml	
7 kg	105 mg à 140 mg	0,88 ml à 1,2 ml	140 mg	1,2 ml	
8 kg	120 mg à 160 mg	1 ml à 1,3 ml	160 mg	1,3 ml	
9 kg	135 mg à 180 mg	1,1 ml à 1,5 ml	180 mg	1,5 ml	
10 kg	150 mg à 200 mg	1,3 ml à 1,7 ml	200 mg	1,7 ml	
11 kg	165 mg à 220 mg	1,4 ml à 1,8 ml	220 mg	1,8 ml	
12 kg	180 mg à 240 mg	1,5 ml à 2 ml	240 mg	2 ml	
13 kg	195 mg à 260 mg	1,6 ml à 2,2 ml	260 mg	2,2 ml	
14 kg	210 mg à 280 mg	1,8 ml à 2,3 ml	280 mg	2,3 ml	
15 kg	225 mg à 300 mg	1,9 ml à 2,5 ml	300 mg	2,5 ml	
16 kg	240 mg à 320 mg	2 ml à 2,7 ml	320 mg	2,7 ml	
17 kg	255 mg à 340 mg	2,1 ml à 2,8 ml	340 mg	2,8 ml	
18 kg	270 mg à 360 mg	2,3 ml à 3 ml	360 mg	3 ml	
19 kg	285 mg à 380 mg	2,4 ml à 3,2 ml	380 mg	3,2 ml	
20 kg	300 mg à 400 mg	2,5 ml à 3,3 ml	400 mg	3,3 ml	
21 kg	315 mg à 420 mg	2,6 ml à 3,5 ml	420 mg	3,5 ml	
22 kg	330 mg à 440 mg	2,8 ml à 3,7 ml	440 mg	3,7 ml	
23 kg	345 mg à 460 mg	2,9 ml à 3,8 ml	460 mg	3,8 ml	
24 kg	360 mg à 480 mg	3 ml à 4 ml	480 mg	4 ml	
25 kg	375 mg à 500 mg	3,1 ml à 4,2 ml	500 mg	4,2 ml	
26 kg	390 mg à 520 mg	3,3 ml à 4,3 ml	520 mg	4,3 ml	
27 kg	405 mg à 540 mg	3,4 ml à 4,5 ml	540 mg	4,5 ml	
28 kg	420 mg à 560 mg	3,5 ml à 4,7 ml	560 mg	4,7 ml	
29 kg	435 mg à 580 mg	3,6 ml à 4,8 ml	580 mg	4,8 ml	
30 kg	450 mg à 600 mg	3,8 ml à 5 ml	600 mg	5 ml	

Phénytoïn 50 mg/ml injectable IV Dilantin®

DOSE DE CHARGE

Dose usuelle 10 à 20 mg/kg/dose

max. 20 mg/kg/dose

Poids	mg/dose usuelle	ml/dose usuelle	mg/dose maximale	ml/dose maximale	Fréquence d'administration
2 kg	20 mg à 40 mg	0,4 ml à 0,8 ml	40 mg	0,8 ml	Dose unique max. 1 000 mg/dose
3 kg	30 mg à 60 mg	0,6 ml à 1,2 ml	60 mg	1,2 ml	
4 kg	40 mg à 80 mg	0,8 ml à 1,6 ml	80 mg	1,6 ml	
5 kg	50 mg à 100 mg	1 ml à 2 ml	100 mg	2 ml	
6 kg	60 mg à 120 mg	1,2 ml à 2,4 ml	120 mg	2,4 ml	
7 kg	70 mg à 140 mg	1,4 ml à 2,8 ml	140 mg	2,8 ml	
8 kg	80 mg à 160 mg	1,6 ml à 3,2 ml	160 mg	3,2 ml	
9 kg	90 mg à 180 mg	1,8 ml à 3,6 ml	180 mg	3,6 ml	
10 kg	100 mg à 200 mg	2 ml à 4 ml	200 mg	4 ml	
11 kg	110 mg à 220 mg	2,2 ml à 4,4 ml	220 mg	4,4 ml	
12 kg	120 mg à 240 mg	2,4 ml à 4,8 ml	240 mg	4,8 ml	
13 kg	130 mg à 260 mg	2,6 ml à 5,2 ml	260 mg	5,2 ml	
14 kg	140 mg à 280 mg	2,8 ml à 5,6 ml	280 mg	5,6 ml	
15 kg	150 mg à 300 mg	3 ml à 6 ml	300 mg	6 ml	
16 kg	160 mg à 320 mg	3,2 ml à 6,4 ml	320 mg	6,4 ml	
17 kg	170 mg à 340 mg	3,4 ml à 6,8 ml	340 mg	6,8 ml	
18 kg	180 mg à 360 mg	3,6 ml à 7,2 ml	360 mg	7,2 ml	
19 kg	190 mg à 380 mg	3,8 ml à 7,6 ml	380 mg	7,6 ml	
20 kg	200 mg à 400 mg	4 ml à 8 ml	400 mg	8 ml	
21 kg	210 mg à 420 mg	4,2 ml à 8,4 ml	420 mg	8,4 ml	
22 kg	220 mg à 440 mg	4,4 ml à 8,8 ml	440 mg	8,8 ml	
23 kg	230 mg à 460 mg	4,6 ml à 9,2 ml	460 mg	9,2 ml	
24 kg	240 mg à 480 mg	4,8 ml à 9,6 ml	480 mg	9,6 ml	
25 kg	250 mg à 500 mg	5 ml à 10 ml	500 mg	10 ml	
26 kg	260 mg à 520 mg	5,2 ml à 10,4 ml	520 mg	10,4 ml	
27 kg	270 mg à 540 mg	5,4 ml à 10,8 ml	540 mg	10,8 ml	
28 kg	280 mg à 560 mg	5,6 ml à 11,2 ml	560 mg	11,2 ml	
29 kg	290 mg à 580 mg	5,8 ml à 11,6 ml	580 mg	11,6 ml	
30 kg	300 mg à 600 mg	6 ml à 12 ml	600 mg	12 ml	

Phenytoin 50 mg/ml injectable IV Dilantin®

DOSE D'ENTRETIEN

Dose usuelle 4 à 10 mg/kg/j

max. 10 mg/kg/j

Poids	mg/dose usuelle	ml/dose usuelle	mg/dose maximale	ml/dose maximale	Fréquence d'administration
2 kg	3 mg à 7 mg	0,05 ml à 0,13 ml	7 mg	0,13 ml	q 8h max. 1 000 mg/j
3 kg	4 mg à 10 mg	0,08 ml à 0,2 ml	10 mg	0,2 ml	
4 kg	5 mg à 13 mg	0,11 ml à 0,27 ml	13 mg	0,27 ml	
5 kg	7 mg à 17 mg	0,13 ml à 0,33 ml	17 mg	0,33 ml	
6 kg	8 mg à 20 mg	0,16 ml à 0,4 ml	20 mg	0,4 ml	
7 kg	9 mg à 23 mg	0,19 ml à 0,47 ml	23 mg	0,47 ml	
8 kg	11 mg à 27 mg	0,21 ml à 0,53 ml	27 mg	0,53 ml	
9 kg	12 mg à 30 mg	0,24 ml à 0,6 ml	30 mg	0,6 ml	
10 kg	13 mg à 33 mg	0,27 ml à 0,67 ml	33 mg	0,67 ml	
11 kg	15 mg à 37 mg	0,29 ml à 0,73 ml	37 mg	0,73 ml	
12 kg	16 mg à 40 mg	0,32 ml à 0,8 ml	40 mg	0,8 ml	
13 kg	17 mg à 43 mg	0,35 ml à 0,87 ml	43 mg	0,87 ml	
14 kg	19 mg à 47 mg	0,37 ml à 0,93 ml	47 mg	0,93 ml	
15 kg	20 mg à 50 mg	0,4 ml à 1 ml	50 mg	1 ml	
16 kg	21 mg à 53 mg	0,43 ml à 1,1 ml	53 mg	1,1 ml	
17 kg	23 mg à 57 mg	0,45 ml à 1,1 ml	57 mg	1,1 ml	
18 kg	24 mg à 60 mg	0,48 ml à 1,2 ml	60 mg	1,2 ml	
19 kg	25 mg à 63 mg	0,51 ml à 1,3 ml	63 mg	1,3 ml	
20 kg	27 mg à 67 mg	0,53 ml à 1,3 ml	67 mg	1,3 ml	
21 kg	28 mg à 70 mg	0,56 ml à 1,4 ml	70 mg	1,4 ml	
22 kg	29 mg à 73 mg	0,59 ml à 1,5 ml	73 mg	1,5 ml	
23 kg	31 mg à 77 mg	0,61 ml à 1,5 ml	77 mg	1,5 ml	
24 kg	32 mg à 80 mg	0,64 ml à 1,6 ml	80 mg	1,6 ml	
25 kg	33 mg à 83 mg	0,67 ml à 1,7 ml	83 mg	1,7 ml	
26 kg	35 mg à 87 mg	0,69 ml à 1,7 ml	87 mg	1,7 ml	
27 kg	36 mg à 90 mg	0,72 ml à 1,8 ml	90 mg	1,8 ml	
28 kg	37 mg à 93 mg	0,74 ml à 1,9 ml	93 mg	1,9 ml	
29 kg	39 mg à 97 mg	0,77 ml à 1,9 ml	97 mg	1,9 ml	
30 kg	40 mg à 100 mg	0,8 ml à 2 ml	100 mg	2 ml	

Piperacilline (P)-Tazobactam (T) 2000, 3000 et 4000 mg /fiOLE
(dilué 194 mg/ml soit 172mg (P) / 22mg (T) /ml) injectable IV
Tazocin®

Dose usuelle 150-300 (P) mg/kg/j

max. 450 (P) mg/kg/j

Poids	mg/dose usuelle	ml/dose usuelle	mg/dose maximale	ml/dose maximale	Fréquence d'administration
2 kg	75 mg à 200 mg	0,4 ml à 1,2 ml	225 mg	1,3 ml	q 6 à 8 h max. 18 g(P)/j
3 kg	113 mg à 300 mg	0,7 ml à 1,7 ml	338 mg	2 ml	
4 kg	150 mg à 400 mg	0,9 ml à 2,3 ml	450 mg	2,6 ml	
5 kg	188 mg à 500 mg	1,1 ml à 2,9 ml	563 mg	3,3 ml	
6 kg	225 mg à 600 mg	1,3 ml à 3,5 ml	675 mg	3,9 ml	
7 kg	263 mg à 700 mg	1,5 ml à 4,1 ml	788 mg	4,6 ml	
8 kg	300 mg à 800 mg	1,7 ml à 4,7 ml	900 mg	5,2 ml	
9 kg	338 mg à 900 mg	2 ml à 5,2 ml	1013 mg	5,9 ml	
10 kg	375 mg à 1000 mg	2,2 ml à 5,8 ml	1125 mg	6,5 ml	
11 kg	413 mg à 1100 mg	2,4 ml à 6,4 ml	1238 mg	7,2 ml	
12 kg	450 mg à 1200 mg	2,6 ml à 7 ml	1350 mg	7,8 ml	
13 kg	488 mg à 1300 mg	2,8 ml à 7,6 ml	1463 mg	8,5 ml	
14 kg	525 mg à 1400 mg	3,1 ml à 8,1 ml	1575 mg	9,2 ml	
15 kg	563 mg à 1500 mg	3,3 ml à 8,7 ml	1688 mg	9,8 ml	
16 kg	600 mg à 1600 mg	3,5 ml à 9,3 ml	1800 mg	10,5 ml	
17 kg	638 mg à 1700 mg	3,7 ml à 9,9 ml	1913 mg	11,1 ml	
18 kg	675 mg à 1800 mg	3,9 ml à 10,5 ml	2025 mg	11,8 ml	
19 kg	713 mg à 1900 mg	4,1 ml à 11 ml	2138 mg	12,4 ml	
20 kg	750 mg à 2000 mg	4,4 ml à 11,6 ml	2250 mg	13,1 ml	
21 kg	788 mg à 2100 mg	4,6 ml à 12,2 ml	2363 mg	13,7 ml	
22 kg	825 mg à 2200 mg	4,8 ml à 12,8 ml	2475 mg	14,4 ml	
23 kg	863 mg à 2300 mg	5 ml à 13,4 ml	2588 mg	15 ml	
24 kg	900 mg à 2400 mg	5,2 ml à 14 ml	2700 mg	15,7 ml	
25 kg	938 mg à 2500 mg	5,5 ml à 14,5 ml	2813 mg	16,4 ml	
26 kg	975 mg à 2600 mg	5,7 ml à 15,1 ml	2925 mg	17 ml	
27 kg	1013 mg à 2700 mg	5,9 ml à 15,7 ml	3038 mg	17,7 ml	
28 kg	1050 mg à 2800 mg	6,1 ml à 16,3 ml	3150 mg	18,3 ml	
29 kg	1088 mg à 2900 mg	6,3 ml à 16,9 ml	3263 mg	19 ml	
30 kg	1125 mg à 3000 mg	6,5 ml à 17,4 ml	3375 mg	19,6 ml	

Régime haute dose pour fibrose kystique possible à 450 à 600mg/kg/j q4 h

De façon usuelle, les médecins prescrivent en nombre de mg de pipéracilline (P)

Pipéracilline (P)-Tazobactam (T) dilué 194 mg/ml soit 172mg (P) / 22mg (T) /ml
Tazocin[®]

Étapes à respecter lors de la prescription de Pipéracilline-Tazobactam (Tazocin[®]) :

N.B. : Le médecin prescrit toujours la dose en Pipéracilline

1. Déterminer la dose de Pipéracilline en mg/dose à donner si elle n'est pas précisée sur l'ordonnance (souvent prescrit en mg/kg /jour)
2. S'assurer que la posologie de Pipéracilline prescrite est possible en consultant le tableau à la page précédente (dose et intervalle)
3. Trouver la dose de Pipéracilline en ml/dose à donner sachant que la fiole est diluée à 172mg/ml de Pipéracilline
4. Pour connaître la dose équivalente en Pipéracilline-Tazobactam, convertir le volume à donner sachant que la fiole est diluée à 194 mg/ml de Pipéracilline-Tazobactam

Exemple prescription : Tazocin 300mg/kg/jour IV aux 6 heures pour un enfant de 15 kg

1. *Dose à donner : 1125mg de Pipéracilline/dose aux 6 heures*
2. *Consultation du tableau pour s'assurer que dose dans intervalle possible*
3. *Volume à donner : $1125\text{mg} \div 172\text{mg/ml} = 6,5\text{ ml}$*
5. *Dose en Pipéracilline-Tazobactam : $194\text{ mg/ml} \times 6,5\text{ ml} = 1261\text{ mg}$ ou 1,3 g*

Prednisolone 1 mg/ml PO

Pediapred®

Dose usuelle 1 à 2 mg/kg/j

max. 1 mg/kg/dose q 6 h X 48 h

Poids	mg/dose usuelle	ml/dose usuelle	Fréquence d'administration	mg/dose maximale	ml/dose maximale	Fréquence d'administration
2 kg	2 mg à 4 mg	2 ml à 4 ml	q 24 h max. 60 mg/j	2 mg	2 ml	q 6 h X 48 h max. 60 mg/j
3 kg	3 mg à 6 mg	3 ml à 6 ml				
4 kg	4 mg à 8 mg	4 ml à 8 ml				
5 kg	5 mg à 10 mg	5 ml à 10 ml				
6 kg	6 mg à 12 mg	6 ml à 12 ml				
7 kg	7 mg à 14 mg	7 ml à 14 ml				
8 kg	8 mg à 16 mg	8 ml à 16 ml				
9 kg	9 mg à 18 mg	9 ml à 18 ml				
10 kg	10 mg à 20 mg	10 ml à 20 ml				
11 kg	11 mg à 22 mg	11 ml à 22 ml				
12 kg	12 mg à 24 mg	12 ml à 24 ml				
13 kg	13 mg à 26 mg	13 ml à 26 ml				
14 kg	14 mg à 28 mg	14 ml à 28 ml				
15 kg	15 mg à 30 mg	15 ml à 30 ml				
16 kg	16 mg à 32 mg	16 ml à 32 ml				
17 kg	17 mg à 34 mg	17 ml à 34 ml				
18 kg	18 mg à 36 mg	18 ml à 36 ml				
19 kg	19 mg à 38 mg	19 ml à 38 ml				
20 kg	20 mg à 40 mg	20 ml à 40 ml				
21 kg	21 mg à 42 mg	21 ml à 42 ml				
22 kg	22 mg à 44 mg	22 ml à 44 ml				
23 kg	23 mg à 46 mg	23 ml à 46 ml				
24 kg	24 mg à 48 mg	24 ml à 48 ml				
25 kg	25 mg à 50 mg	25 ml à 50 ml				
26 kg	26 mg à 52 mg	26 ml à 52 ml				
27 kg	27 mg à 54 mg	27 ml à 54 ml				
28 kg	28 mg à 56 mg	28 ml à 56 ml				
29 kg	29 mg à 58 mg	29 ml à 58 ml				
30 kg	30 mg à 60 mg	30 ml à 60 ml				

Ranitidine 15 mg/ml PO

Zantac®

Dose usuelle 2 à 4 mg/kg/j

max. 10 mg/kg/j

Poids	mg/dose usuelle	ml/dose usuelle	mg/dose maximale	ml/dose maximale	Fréquence d'administration
2 kg	2 mg à 4 mg	0,1 ml à 0,3 ml	10 mg	0,7 ml	q 12 h
3 kg	3 mg à 6 mg	0,2 ml à 0,4 ml	15 mg	1 ml	
4 kg	4 mg à 8 mg	0,3 ml à 0,5 ml	20 mg	1,3 ml	
5 kg	5 mg à 10 mg	0,3 ml à 0,7 ml	25 mg	1,7 ml	
6 kg	6 mg à 12 mg	0,4 ml à 0,8 ml	30 mg	2 ml	
7 kg	7 mg à 14 mg	0,5 ml à 0,9 ml	35 mg	2,3 ml	
8 kg	8 mg à 16 mg	0,5 ml à 1,1 ml	40 mg	2,7 ml	
9 kg	9 mg à 18 mg	0,6 ml à 1,2 ml	45 mg	3 ml	
10 kg	10 mg à 20 mg	0,7 ml à 1,3 ml	50 mg	3,3 ml	
11 kg	11 mg à 22 mg	0,7 ml à 1,5 ml	55 mg	3,7 ml	
12 kg	12 mg à 24 mg	0,8 ml à 1,6 ml	60 mg	4 ml	
13 kg	13 mg à 26 mg	0,9 ml à 1,7 ml	65 mg	4,3 ml	
14 kg	14 mg à 28 mg	0,9 ml à 1,9 ml	70 mg	4,7 ml	
15 kg	15 mg à 30 mg	1 ml à 2 ml	75 mg	5 ml	
16 kg	16 mg à 32 mg	1,1 ml à 2,1 ml	80 mg	5,3 ml	
17 kg	17 mg à 34 mg	1,1 ml à 2,3 ml	85 mg	5,7 ml	
18 kg	18 mg à 36 mg	1,2 ml à 2,4 ml	90 mg	6 ml	
19 kg	19 mg à 38 mg	1,3 ml à 2,5 ml	95 mg	6,3 ml	
20 kg	20 mg à 40 mg	1,3 ml à 2,7 ml	100 mg	6,7 ml	
21 kg	21 mg à 42 mg	1,4 ml à 2,8 ml	105 mg	7 ml	
22 kg	22 mg à 44 mg	1,5 ml à 2,9 ml	110 mg	7,3 ml	
23 kg	23 mg à 46 mg	1,5 ml à 3,1 ml	115 mg	7,7 ml	
24 kg	24 mg à 48 mg	1,6 ml à 3,2 ml	120 mg	8 ml	
25 kg	25 mg à 50 mg	1,7 ml à 3,3 ml	125 mg	8,3 ml	
26 kg	26 mg à 52 mg	1,7 ml à 3,5 ml	130 mg	8,7 ml	
27 kg	27 mg à 54 mg	1,8 ml à 3,6 ml	135 mg	9 ml	
28 kg	28 mg à 56 mg	1,9 ml à 3,7 ml	140 mg	9,3 ml	
29 kg	29 mg à 58 mg	1,9 ml à 3,9 ml	145 mg	9,7 ml	
30 kg	30 mg à 60 mg	2 ml à 4 ml	150 mg	10 ml	

Tobramycine 40 mg/ml injectable IV/IM

Nebcin[™]

Attention : Se référer au tableau des doses néonatales si âge post conceptionnel inférieur à 45 semaines

Dose usuelle 1,7 mg à 2,5 mg/kg/dose

max. 7,5 mg/kg/dose
(dose unique quotidienne)

Poids	mg/dose usuelle	ml/dose usuelle	Fréquence d'administration	mg/dose maximale	ml/dose maximale	Fréquence d'administration
2 kg	3,4 mg* à 5 mg*	0,09 ml à 0,13 ml	q 8 h	15 mg*	0,4 ml	q 24 h
3 kg	5,1 mg* à 8 mg*	0,13 ml à 0,19 ml		23 mg	0,6 ml	
4 kg	6,8 mg* à 10 mg*	0,17 ml à 0,25 ml		30 mg	0,8 ml	
5 kg	8,5 mg* à 13 mg*	0,21 ml à 0,31 ml		38 mg	0,9 ml	
6 kg	10 mg* à 15 mg*	0,26 ml à 0,38 ml		45 mg	1,1 ml	
7 kg	12 mg* à 18 mg*	0,3 ml à 0,44 ml		53 mg	1,3 ml	
8 kg	14 mg* à 20 mg*	0,34 ml à 0,5 ml		60 mg	1,5 ml	
9 kg	15 mg* à 23 mg	0,38 ml à 0,56 ml		68 mg	1,7 ml	
10 kg	17 mg* à 25 mg	0,43 ml à 0,63 ml		75 mg	1,9 ml	
11 kg	19 mg* à 28 mg	0,47 ml à 0,69 ml		83 mg	2,1 ml	
12 kg	20 mg* à 30 mg	0,51 ml à 0,75 ml		90 mg	2,3 ml	
13 kg	22 mg à 33 mg	0,55 ml à 0,81 ml		98 mg	2,4 ml	
14 kg	24 mg à 35 mg	0,6 ml à 0,88 ml		105 mg	2,6 ml	
15 kg	26 mg à 38 mg	0,64 ml à 0,94 ml		113 mg	2,8 ml	
16 kg	27 mg à 40 mg	0,68 ml à 1 ml		120 mg	3 ml	
17 kg	29 mg à 43 mg	0,72 ml à 1,1 ml		128 mg	3,2 ml	
18 kg	31 mg à 45 mg	0,77 ml à 1,1 ml		135 mg	3,4 ml	
19 kg	32 mg à 48 mg	0,81 ml à 1,2 ml		143 mg	3,6 ml	
20 kg	34 mg à 50 mg	0,85 ml à 1,3 ml		150 mg	3,8 ml	
21 kg	36 mg à 53 mg	0,89 ml à 1,3 ml		158 mg	3,9 ml	
22 kg	37 mg à 55 mg	0,94 ml à 1,4 ml		165 mg	4,1 ml	
23 kg	39 mg à 58 mg	0,98 ml à 1,4 ml		173 mg	4,3 ml	
24 kg	41 mg à 60 mg	1,02 ml à 1,5 ml		180 mg	4,5 ml	
25 kg	43 mg à 63 mg	1,06 ml à 1,6 ml		188 mg	4,7 ml	
26 kg	44 mg à 65 mg	1,11 ml à 1,6 ml		195 mg	4,9 ml	
27 kg	46 mg à 68 mg	1,15 ml à 1,7 ml		203 mg	5,1 ml	
28 kg	48 mg à 70 mg	1,19 ml à 1,8 ml		210 mg	5,3 ml	
29 kg	49 mg à 73 mg	1,23 ml à 1,8 ml		218 mg	5,4 ml	
30 kg	51 mg à 75 mg	1,3 ml à 1,9 ml		225 mg	5,6 ml	

Trimethoprim (T) + Sulfaméthoxazole (S) 8 mg T / 40 mg S /ml PO

Bactrim[®], Septra[®]

Dose usuelle 6 à 12 mg/T/kg/j

max. 12 mg/T/kg/j

Poids	mg/dose usuelle	ml/dose usuelle	mg/dose maximale	ml/dose maximale	Fréquence d'administration
2 kg	6 mg à 12 mg	0,8 ml à 1,5 ml	12 mg	1,5 ml	q 12 h max. 320 mg T/24h
3 kg	9 mg à 18 mg	1,1 ml à 2,3 ml	18 mg	2,3 ml	
4 kg	12 mg à 24 mg	1,5 ml à 3 ml	24 mg	3 ml	
5 kg	15 mg à 30 mg	1,9 ml à 3,8 ml	30 mg	3,8 ml	
6 kg	18 mg à 36 mg	2,3 ml à 4,5 ml	36 mg	4,5 ml	
7 kg	21 mg à 42 mg	2,6 ml à 5,3 ml	42 mg	5,3 ml	
8 kg	24 mg à 48 mg	3 ml à 6 ml	48 mg	6 ml	
9 kg	27 mg à 54 mg	3,4 ml à 6,8 ml	54 mg	6,8 ml	
10 kg	30 mg à 60 mg	3,8 ml à 7,5 ml	60 mg	7,5 ml	
11 kg	33 mg à 66 mg	4,1 ml à 8,3 ml	66 mg	8,3 ml	
12 kg	36 mg à 72 mg	4,5 ml à 9 ml	72 mg	9 ml	
13 kg	39 mg à 78 mg	4,9 ml à 9,8 ml	78 mg	9,8 ml	
14 kg	42 mg à 84 mg	5,3 ml à 10,5 ml	84 mg	10,5 ml	
15 kg	45 mg à 90 mg	5,6 ml à 11,3 ml	90 mg	11,3 ml	
16 kg	48 mg à 96 mg	6 ml à 12 ml	96 mg	12 ml	
17 kg	51 mg à 102 mg	6,4 ml à 12,8 ml	102 mg	12,8 ml	
18 kg	54 mg à 108 mg	6,8 ml à 13,5 ml	108 mg	13,5 ml	
19 kg	57 mg à 114 mg	7,1 ml à 14,3 ml	114 mg	14,3 ml	
20 kg	60 mg à 120 mg	7,5 ml à 15 ml	120 mg	15 ml	
21 kg	63 mg à 126 mg	7,9 ml à 15,8 ml	126 mg	15,8 ml	
22 kg	66 mg à 132 mg	8,3 ml à 16,5 ml	132 mg	16,5 ml	
23 kg	69 mg à 138 mg	8,6 ml à 17,3 ml	138 mg	17,3 ml	
24 kg	72 mg à 144 mg	9 ml à 18 ml	144 mg	18 ml	
25 kg	75 mg à 150 mg	9,4 ml à 18,8 ml	150 mg	18,8 ml	
26 kg	78 mg à 156 mg	9,8 ml à 19,5 ml	156 mg	19,5 ml	
27 kg	81 mg à 160 mg	10,1 ml à 20 ml	160 mg	20 ml	
28 kg	84 mg à 160 mg	10,5 ml à 20 ml	160 mg	20 ml	
29 kg	87 mg à 160 mg	10,9 ml à 20 ml	160 mg	20 ml	
30 kg	90 mg à 160 mg	11,3 ml à 20 ml	160 mg	20 ml	

Vancomycine 1000 mg/fiole (dilué 50 mg/ml) injectable IV

Vancocin[®]

Attention : Se référer au tableau des doses néonatales si âge post conceptionnel inférieur à 45 semaines

Dose usuelle 40 à 60 mg/kg/j

max. 60 mg/kg/j

Poids	mg/dose usuelle	ml/dose usuelle	mg/dose maximale	ml/dose maximale	Fréquence d'administration
2 kg	20 mg à 30 mg	0,4 ml à 0,6 ml	30 mg	0,6 ml	q 6 h max. 4 g/j
3 kg	30 mg à 45 mg	0,6 ml à 0,9 ml	45 mg	0,9 ml	
4 kg	40 mg à 60 mg	0,8 ml à 1,2 ml	60 mg	1,2 ml	
5 kg	50 mg à 75 mg	1 ml à 1,5 ml	75 mg	1,5 ml	
6 kg	60 mg à 90 mg	1,2 ml à 1,8 ml	90 mg	1,8 ml	
7 kg	70 mg à 105 mg	1,4 ml à 2,1 ml	105 mg	2,1 ml	
8 kg	80 mg à 120 mg	1,6 ml à 2,4 ml	120 mg	2,4 ml	
9 kg	90 mg à 135 mg	1,8 ml à 2,7 ml	135 mg	2,7 ml	
10 kg	100 mg à 150 mg	2 ml à 3 ml	150 mg	3 ml	
11 kg	110 mg à 165 mg	2,2 ml à 3,3 ml	165 mg	3,3 ml	
12 kg	120 mg à 180 mg	2,4 ml à 3,6 ml	180 mg	3,6 ml	
13 kg	130 mg à 195 mg	2,6 ml à 3,9 ml	195 mg	3,9 ml	
14 kg	140 mg à 210 mg	2,8 ml à 4,2 ml	210 mg	4,2 ml	
15 kg	150 mg à 225 mg	3 ml à 4,5 ml	225 mg	4,5 ml	
16 kg	160 mg à 240 mg	3,2 ml à 4,8 ml	240 mg	4,8 ml	
17 kg	170 mg à 255 mg	3,4 ml à 5,1 ml	255 mg	5,1 ml	
18 kg	180 mg à 270 mg	3,6 ml à 5,4 ml	270 mg	5,4 ml	
19 kg	190 mg à 285 mg	3,8 ml à 5,7 ml	285 mg	5,7 ml	
20 kg	200 mg à 300 mg	4 ml à 6 ml	300 mg	6 ml	
21 kg	210 mg à 315 mg	4,2 ml à 6,3 ml	315 mg	6,3 ml	
22 kg	220 mg à 330 mg	4,4 ml à 6,6 ml	330 mg	6,6 ml	
23 kg	230 mg à 345 mg	4,6 ml à 6,9 ml	345 mg	6,9 ml	
24 kg	240 mg à 360 mg	4,8 ml à 7,2 ml	360 mg	7,2 ml	
25 kg	250 mg à 375 mg	5 ml à 7,5 ml	375 mg	7,5 ml	
26 kg	260 mg à 390 mg	5,2 ml à 7,8 ml	390 mg	7,8 ml	
27 kg	270 mg à 405 mg	5,4 ml à 8,1 ml	405 mg	8,1 ml	
28 kg	280 mg à 420 mg	5,6 ml à 8,4 ml	420 mg	8,4 ml	
29 kg	290 mg à 435 mg	5,8 ml à 8,7 ml	435 mg	8,7 ml	
30 kg	300 mg à 450 mg	6 ml à 9 ml	450 mg	9 ml	